DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-265-266

НОВАЯ НАХОДКА ОСТАТКОВ ИХТИОЗАВРА KAZAKHSTANOSAURUS EFIMOVI ИЗ ТАТАРСТАНА

Ефимов Владимир Михайлович

кандидат геолого-минералогических наук, председатель Ульяновского отделения Всероссийского Палеонтологического общества, г. Ульяновск

Якупова Джамиля Болатовна

преподаватель кафедры географии Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова, г. Уральск, Казахстан

Ахмеденов Кажмурат Максутович

кандидат географических наук, профессор Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова, г. Уральск, Казахстан

Аннотация. В статье дано описание шести позвонков ихтиозавра из средневолжского подъяруса верхней юры Среднего Поволжья (Татарстан). Отнесение новой находки к недавно описанному виду Kazakhstanosaurus efimovi Akhmedenov et Yakupova из одновозрастных отложений Ульяновской области (разрез Городище) основано на схожем строении шейных и хвостовых позвонков, соотношении размеров позвонков и рёберных фасеток.

Ключевые слова: Kazakhstanosaurus efimovi, Undorosauridae, средневолжский подъярус, Татарстан.

NEW FINDING OF ICTHHYOSAUR KAZAKHSTANOSAURUS EFIMOVI FROM TATARSTAN

Efimov Vladimir Mikhailovich

Candidate of geological and mineralogical sciences, chairman of the Ulyanovsk branch of the All-Russian Paleontological Society, Ulyanovsk

Yakupova Jamilya Bolatovna

lecturer of the Geography Department of M. Utemisov West Kazakhstan University, Uralsk, Kazakhstan Akhmedenov Kazhmurat Maksutovich Candidate of geographical sciences, professor of West-Kazakhstan University. M. Utemisova, Uralsk, Kazakhstan

Abstract. The article describes six ichthyosaur vertebrae from the Middle Volgian substage of the Upper Jurassic of the Middle Volga region (Tatarstan). The assignment of the new find to the recently described species Kazakhstanosaurus efimovi Akhmedenov et Yakupova from coeval deposits of the Ulyanovsk region (Gorodishche section) is based on the similar structure of the cervical and caudal vertebrae, the ratio of the sizes of the vertebrae and costal facets.

Keywords: Kazakhstanosaurus efimovi, Undorosauridae, Middle Volgian substage, Tatarstan.

Введение. Правый берег Куйбышевского водохранилища в южных районах Татарстана и приволжских районах (Ульяновском и Сенгилеевском) Ульяновской обла-

сти является одним из крупнейших местонахождений остатков ихтиозавров в России. Один из авторов статьи (В.М. Ефимов) в 1999 г. открыл здесь новое семейство ихтиозавров Undorosauridae [1]. В коллекции В.М. Ефимова особо выделялись кости очень крупных ихтиозавров, долгое время остававшиеся без определения систематической принадлежности из-за фрагментарности скелетов. В 2019 г. российскими и казахстанскими палеонтологами при изучении находки скелета ихтиозавра из средневолжских отложений Западного Казахстана в семействе Undorosauridae был выделен новый род Kazakhstanosaurus V. Efimov, Akhmedenov et Yakupova [2]. Это открытие позволило идентифицировать ранее несравнимые крупные фрагментарные остатки из коллекции В.М. Ефимова и выделить новый вид средневолжских ихтиозавров Kazakhstanosaurus efimovi Akhmedenov et Yakupova, 2021 [3].

В 2021 г. в средневолжских отложениях Татарстана В.М. Ефимов нашел шесть позвонков, идентичных *Kazakhstanosaurus efimovi*. Изученный материал позволяет говорить о расширении ареала обитания вида *Kazakhstanosaurus efimovi*, проникновении его представителей в Русское море в средневолжское время.

Материал и методика. Материал, представленный в статье, собран В.М. Ефимовым в 2021 г. из отложений средневолжского подъяруса, на теле оползня в 1 км севернее пристани Бессоновская Тетюшского района республики Татарстан. Все позвонки происходят из вышеназванного горизонта. Образцы находятся в Ундоровской палеонтологической мастерской (д. Городищи Ульяновского района Ульяновской области). Методика, применяемая при изучении остатков, описана в работе Д.Б. Якуповой, К.М. Ахмеденова [3].

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Класс Reptilia Linnaeus, 1758

Подкласс Diapsida Osborn, 1903

Отряд Ichthyosauria de Blainville, 1835

Надсемейство Shastasauroidea Merriam, 1902

Семейство Undorosauridae V. Efimov, 1999

Род Kazakhstanosaurus V. Efimov, Akhmedenov
et Yakupova, 2019 Kazakhstanosaurus efimovi

Yakupova et Akhmedenov, 2021

Этимология – название вида дано в честь первооткрывателя семейства *Undorosauridae* Владимира Михайловича Ефимова, кандидата геолого-минера-логических наук, председателя Ульяновского отделения Всероссийского Палеонтологического общества.

Голотип – Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), экз. № ГМ КФУ КП 1724/1–ГМ КФУ КП 1724/18, позвоночный столб (атлант + эпистрофей, 2 шейных, 4 туловищных, 2 крестцовых, 3 хвостовых позвонка), фрагменты коракоидов, плечевая и локте-

Таблица 1 Размеры позвонков Kazakhstanosaurus efimovi, № 1488.

Nº	Название позвонка	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Ширина неврального канала, мм	Соотношение: высота/длина	Сохранность
1	Шейный	110	110	43	35	2,56	Хорошая
2	Шейный	112	112	54	42	2,07	Хорошая
3	Шейный	122	-	60	30	2,03	Нарушена левая часть позвонка
4	Шейный	-	123	57	30	2,15	½ часть по- звонка
5	Шейный	130	130	60	40	2,16	Хорошая
6	Передне- хвостовой	115	117	45	15	2,55	Задние края позвонка нару- шены

вая кости, фрагмент лопатки; д. Городищи, Ульяновская обл.; верхняя юра, средневолжский подъярус, зона *Dorsoplanites panderi*. Материал передан в Казанский федеральный университет Ундоровской палеонтологической мастерской В.М. Ефимова.

Новая находка шести позвонков (5 шейных, 1 переднехвостовой), экз. № 1488(1–6); с. Бессоново, республика Татарстан; верхняя юра, средневолжский подъярус, зона *Dorsoplanites panderi*. Место хранения: Ундоровская палеонтологическая мастерская (д. Городищи Ульяновского района Ульяновской области).

Диагноз дополненный. Ихтиозавры крупных размеров 7–8 метров, обладавшие мощным осевым скелетом с дифференцированной формой позвонков: шейные округло-пятиугольные, туловищные округло-квадратные, хвостовые округло-шестиугольные с нижним центральным прогибом позвонков. Все позвонки имеют почти равную высоту и ширину. Соотношение высоты и ширины к длине позвонка у шейных позвонков колеблется от 2 до 2,5, у туловищных позвонков равно 3, хвостовых от 2,5 до 2,8. Наибольшего размера позвонки достигают в крестцовом отделе 16 см. На позвонках всех отделов парапофизы и диапофизы увеличенных размеров и поднимаются над телом позвонка на 5–10 мм. Характеристики костей плечевого пояса даны в работе Д.Б. Якуповой, К.М. Ахмеденова [3].

Описание позвонков. Всего найдено 6 позвонков, из них 5 относятся к шейному отделу, 1 к переднехвостовому. Размеры позвонков приведены в таблице (табл. 1). Шейные позвонки № 1488(1–5) округло-пятиугольной формы с равными размерами высоты и ширины позвонков. Соотношение высоты и ширины позвонков к длине колеблется от 2 до 2,5, при этом, чем ближе шейный позвонок к атланту, тем больше соотношение. При удалении от атланта позвонок становится шире, а соотношение меньше.

Переднехвостовой позвонок № 1488(6) относится к хвостовому отделу, имеет округло-шестиугольную форму. В нижней части позвонка напротив неврального канала имеется прогиб поверхности к центру позвонка глубиной 5 мм, шириной 40 мм. Позвонок располагался 3-м или 4-м после крестцового позвонка, так как рёберная фасетка слилась не полностью и имеет вид восьмерки. Отношение высоты и ширины позвонка к

его длине составляет 2,5.

Рёберные фасетки на позвонках приподняты над поверхностью позвонка на 5-10 мм. Площадь парапофизов шейных позвонков 2-3 см², диапофизов 3,5 см². Площадь рёберной фасетки переднехвостового позвонка 3-3,5 см².

Сравнение. Сравнительный анализ описанных в работе позвонков показывает, что позвонки, найденные в Татарстане и Ульяновской области идентичны, что позволяет отнести их к виду *Kazakhstanozarus efimovi*. Незначительные расхождения в соотношении относятся к индивидуальным отличиям или, возможно, к половому деморфизму.

Заключение. Приведённое описание новой находки Kazakhstanosaurus efimovi из средневолжских отложений Республики Татарстан указывает на распространение этого вида на север к центру Русского моря. По наблюдениям В.М. Ефимова при осмотре позвонков из коллекции Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН, позвонок ихтиозавра № 1674/09 из средневолжской зоны panderi (находка из окрестностей Москвы) аналогичен по размерам и строению нижней части хвостового позвонка № 1488(6) Kazakhstanosaurus efimovi; другой позвонок из коллекции № 1674/01, найденный на территории Голицино в верхней волге, зона fulgens, имеет субквадратную форму, характерную для Kazakhstanosaurus efimovi. Данный факт может говорить о том, что вид Kazakhstanosaurus efimovi, появившись в средневолжском подъярусе, просуществовал до поздней волги в Русском море.

Список литературы:

- 1. Ефимов В.М. Новое семейство ихтиозавров *Undorosauridae* fam. nov. из волжского яруса Европейской части России // Палеонтол. журн. ~ 1999 . ~ 1999 .
- 2. Ефимов В.М., Ахмеденов К.М., Якупова Д.Б. Новый представитель семейства *Undorosauridae* из средневолжских отложений Республики Казахстан // Вестн. ЗКГУ. 2019. № 4. С. 512–526.
- Якупова Д.Б., Ахмеденов К.М. Новый вид Kazakhstanosaurus efimovi Yakupova et Akhmedenov sp. nov. (Ichthyosauria, Undorosauridae) из верхнеюрских отложений Среднего Поволжья России // Учёные записки Казанского университета. – 2021. – Т. 163. – Кн. 2. – С. 251–263.