DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-59-61

# ЯСМЕННИК ШЕРОХОВАТЫЙ (ASPERULA EXASPERATA V. Krecz. ex Klok.) – ИНДИКАТОРНЫЙ ВИД СТЕПНЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ ЛАНДШАФТОВ УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ

**Масленников Андрей Викторович**
кандидат биологических наук, профессор Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск;
ведущий научный сотрудник национального парка «Сенгилеевские горы»
**Масленникова Людмила Анатольевна**
кандидат биологических наук, доцент Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

**Аннотация.** В статье рассматривается современное состояние популяций уязвимого и охраняемого вида – ясменника шероховатого (Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.), как индикаторного вида кальциевых степных ландшафтов Ульяновского Предволжья и отмечается их роль как центров сохранения этого эндемичного вида.
**Ключевые слова:** ясменник шероховатый, кальцефил, кальциевые ландшафты, эндемик, биоразнообразие.

## ROUGH WOODRUFF (ASPERULA EXASPERATA V. Krecz. ex Klok.) – A INDICATOR SPECIES OF STEPPE CALCIUM LANDSCAPE OF THE ULYANOVSK REGION OF THE VOLGA UPLAND

**Maslennikov Andrey Viktorovich**
Candidate of Biological Sciences, Professor of the Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk;
Researcher of the National Park «Sengileevsky Mountains»
**Maslennikova Lyudmila Anatolevna**
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk

**Abstract.** The article discusses the current state of the populations of a vulnerable and protected species - rough woodruff (Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.), as an indicator species of the calcium steppe landscapes of the Ulyanovsk region of the Volga Upland and notes their role as centers of conservation of this endemic species.
**Keywords:** Woodruff rough, calcephilus, calcium landscapes, endemic, biodiversity.

Степные кальциевые ландшафты Приволжской возвышенности, развитые на территории Ульяновского Предволжья, в силу ярко выраженного экотонного эффекта, орографических, микроклиматических и флорогенетических причин в настоящее время служат центрами биоразнообразия и являются местом концентрации популяций редких, эндемичных, реликтовых и охраняемых видов сосудистых растений.

Волжско-донской эндемик ясменник шероховатый (*Asperula exasperata* V. Krecz. ex Klok.) – один из эталонных видов таких кальциевых ландшафтов, степной облигатный кальцефил и одновременно индикатор их малой антропогенной нарушенности и высокой природоохранной ценности [1, 6].

Это хорошо подтверждается распространением популяций этого редкого и охраняемого вида [4] в степных экотопах в зоне развития кальциевых ландшафтов на территории Ульяновского Предволжья (рис. 1).



Рис. 1. Распространение ясменника шероховатого (Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.) по территории Ульяновского Предволжья в зоне развития кальциевых ландшафтов.

На карте хорошо прослеживается приуроченность ясменника шероховатого к местам наибольшего распространения меловых каменистых разнотравных степей и обнажений, развитых на меловых и мергелистых карбонатных материнских породах на крутых склонах южной и юго-западной экспозиций.

В фитоценотическом отношении ясменник шероховатый как вид антропофоб может служить индикатором невысокой антропогенной нарушенности каменистых разнотравных, тимьянниковых и тимьянниково-разнотравных степей, распространенных в зоне развития кальциевых ландшафтов.

Именно поэтому изучение эколого-биологического состояния ценопопуляций *Asperula exasperata* V. Krecz. ex Klok. – редкого и охраняемого вида сосудистых растений позволяет оценить состояние и устойчивость его популяций и вместе с тем современное состояние вмещающих его популяции

Таблица 1
Возрастной состав ценопопуляций ясменника шероховатого у села Тушна Сенгилеевского района (2021 г.).

| № Пл. | j | | v | | g | | ss | | s | | Всего особей на кв.м (плотность) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | абс | % | абс | % | абс | % | абс | % | абс | % | абс |
| 1. | - | - | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | - | - | - | - | 3 |
| 2. | - | - | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3. | - | - | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | - | - | - | - | 4 |
| Ср. | - | - | 2,3 | 76,7 | 0,7 | 23,3 | - | - | - | - | 3 |

кальциевых ландшафтов Ульяновского Предволжья.

В 2021 г. на территории национального парка «Сенгилеевские горы» для этих целей были изучены ценопопуляции ясменника шероховатого (*Asperula exasperata* V. Krecz. ex Klok.), находящиееся в километре к востоку от с. Тушна Сенгилеевского района и занимающие склоны южной и юго-восточной экспозиций.

В Сенгилеевских горах вид произрастает в Тушнинской и Вырастайкинской степях и Шиловской лесостепи и находится на северной границе распространения [5, 6].

В большинстве мест произрастания встречаются небольшие популяции вида. В отдельных местообитаниях Сенгилеевского района, таких как степи у с. Тушна, отмечены более крупные популяции вида в каменистых тимьянниковых и тимьянниково-разнотравных степях по склонам меловых и мергелистых холмов, чаще всего южной и юго-западной экспозиций [4].

Изученные популяции ясменника шероховатого расположены в каменистых разнотравных меловых степях у с. Тушна большей частью с невысоким проективным покрытием. Их общее проективное покрытие колеблется на разных участках от 25 до 80%.

Из других видов, сопутствуюших ясменнику шероховатому (*Asperula exasperata* V. Krecz. ex Klok.) и встречающихся во вмещающих ценопопуляции ясменника сообществах, можно отметить копеечник крупноцветковый (*Hedysarum grandiflorum* Pall.), тонконог жестколистный (*Koeleria sclerophylla* P. Smirn.) [3, 4], бедренец известколюбивый (*Pimpinella titanophila* Woronow.), качим высочайший (*Gypsophyla altissima* L.), истод сибирский (*Polygala sibirica* L.) [4], тимьян клоповый (*Thymus cimicinus* Blum. ex Ledeb.) [3, 4] и другие. Всего на геоботанических площадках в 1 м$^2$, заложенных в ценопопуляциях ясменника, насчитывается от 8 до 15 видов. Тип сообществ, вмещающих ценопопуляции ясменника шероховатого, – каменистые меловые разнотравные и разнотравно-тимьянниковые степи.

Средняя плотность ценопопуляций ясменника шероховатого в 2021 г. в Тушнинских степях составила 3 особи/м$^2$.

Анализ общего проективного покрытия фитоценозов вмещающих ценопопуляции *Asperula exasperata* V. Krecz. ex Klok., а также обилия ясменника на исследуемых учетных площадках, позволяет сделать заключение, что ясменник шероховатый по своим фитоценотическим особенностям в условиях каменистых Тушнинских степей является ценофобом и ассектатором.

По результатам анализа экологических и биологических особенностей ясменника шероховатого тип эколого-фитоценотической стратегии исследованного вида в данной популяции по Л. Раменскому соответствует патиенту.

*Asperula exasperata* V. Krecz. ex Klok. – это стержнекорневой многолетник, поэтому он относится моноцентрическому типу биоморф, следовательно, за счетную единицу у проростков, ювенильных, виргинильных и генеративных растений берется отдельная особь.

Возрастная структура ценопопуляций ясменника изучалась нами по стандартным методикам [2, 7], данные представлены в таблице 1.

Полученные данные свидетельствуют, что в настоящее время ценопопуляции ясменника шероховатого на участках Тушнинских степей не подверженных постоянным антропогенным нагрузкам являются растущими, так как в них преобладают молодые виргинильные особи (76,7%). Зрелые генеративные особи в среднем составляют 23,3%. Популяции являются неполночленными, с нормальным соотношением возрастных групп. По-видимому, росту популяций способствует прекращение выпаса на данном участке степей.




Рис. 2. Возрастной состав ценопопуляций ясменника шероховатого в 2021 г.

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о нормальной (т. е. способной к самоподдержанию без внесения зачатков извне), но неполночленной популяции ясменника шероховатого (см. рис. 2).

Таким образом, следует отметить что только сохраняя степные урочища – центры развития кальциевых ландшафтов Ульяновского Предволжья мы сохраним и популяции редкого и охраняемого вида – ясменника

шероховатого, по встречаемости и плотности популяций которого легко определить степень антропогенного прессинга на растительные сообщества, для которых он является харатерным индикаторным видом-антропофобом.

***Список литературы:***


1. Благовещенский В.В., Раков Н.С., Шустов В.С. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области. – Саратов: Приволжск. кн. изд-во, 1989. – 96 с.
2. Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений. – Казань, 1989. – 146 с.
3. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). – М., 2008. – 782 с.
4. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, А.В. Масленникова, М.В. Корепова; Правительство Ульяновской области. – Москва: Издательство «Буки Веди», 2015. – 550 с.
5. Масленников А.В. Кальцефильная флора центральной части Приволжской возвышенности. – Ульяновск, 2005. – 162 с.
6. Масленников А.В. Флора кальциевых ландшафтов Приволжской возвышенности. – Ульяновск, 2008. – 136 с.
7. Ценопопуляции растений. – Л.: Наука, 1988. – 183 с.