DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-281-282

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У МЕЗОЗОЙСКИХ ТЕТРАПОД

Новиков Игорь Витальевич
доктор биологических наук, кандидат геолого-минералогических наук, доцент; Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, г. Москва
Гайдук Петр Александрович
сотрудник ООО «Пи Эс Ай», г. Санкт-Петербург

Аннотация. В статье приводится обзор случаев обнаружения онкологических патологических изменений в скелете мезозойских тетрапод. Скудность ископаемого материала с этим видом патологии часто не позволяет подвергнуть образцы микроскопическому изучению и заставляет исследователей ограничиваться неинвазивными методиками исследования, несмотря на то, что в медицине гистологическое обследование подозрительных патологических очагов является обязательным.
Ключевые слова: неоплазия, мезозой, тетраподы.

ONCOLOGICAL PATHOLOGY IN MESOZOIC TETRAPOD

Novikov Igor Vitaljevich
Doctor of Bioligical Sciences, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Associate Professor, Borissiak Paleontological Institute of RAS, Moscow
Haiduk Petr Alexandrovich...
Employee of PSI CO Ltd, St. Petersburg

Abstract. The article provides an overview of cases of detection of oncological pathological changes in the skeleton of Mesozoic tetrapods. The scarcity of fossil material with this type of pathology often does not allow specimens to be subjected to microscopic examination and forces researchers to limit themselves to non-invasive research methods, despite the fact that histological examination of suspicious pathological foci is mandatory in medicine.
Keywords: neoplasm, Mesozoic, tetrapods.

Выявление патологии у ископаемых позвоночных основано на изучении костного материала. Случаи патологических изменений костной ткани у древних (докайнозойских) позвоночных отмечались и описывались в литературе неоднократно. В большинстве случаев они являлись следствием прижизненных механических повреждений – переломов и других травматических повреждений костей, связанных с укусами и ударами, реже – были вызваны экто- или эндопаразитами, деятельностью патогенных бактерий и микобактерий, нарушением обмена веществ, в том числе старческими нарушениями и другими причинами [2].

Среди подобных изменений наибольшая часть зафиксирована у различных групп мезозойских рептилий – динозавров, ихтиоптеригий, завропторигий и мозазавров, причем эти случаи остаются недостаточно изученными, а их генезис - не ясным. Отдельная проблема связана с выяснением вопроса о прижизненном или посмертном характере подобных патологических изменений. В отношении амфибий мезозойского возраста доступные данные по скелетным аномалиям сравнительно скудны и, в основном, касаются морфологических нарушений, - например, затрагивающих топографию покровных костей черепа или развитие позвонков [5, 8, 9].

Онкологический характер патологических изменений костной ткани у мезозойских тетрапод известен по единичным случаям. Возможно, это объясняется различиями в объеме доступных для исследований ископаемых материалов и степени их сохранности у разных групп. Древнейшие известные на сегодняшний день случаи неопластических (опухолевых) новообразований выявлены у раннетриасовых темноспондильных амфибий Восточной Европы.

Первый из таких случаев относится к фрагменту черепной крыши (включающему обломанные правые надвисочную и теменную кости), который принадлежит позднеоленекскому капитозавриду *Parotosuchus* sp. из местонахождения Фёдоровка (Кировская обл., бассейн р. Кобры) [1]. Специалистами Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН (Москва) были проведены микроскопические и рентгенологические (включая компьютерную томографию) исследование этого образца. Полученные результаты позволили с достаточной степенью уверенности диагностировать злокачественное опухолевое образование по типу паростальной остеосаркомы.

Во втором случае исследованию подверглась неопластическая патология, обнаруженная на правой ветви нижней челюсти раннеоленекского бентозухида *Benthosuchus korobkovi* из местонахождения Тихвинское (Ярославская обл., бассейн р. Волги) [2]. Этот образец находится в основном фонде хранения Государственного геологического музея имени В.И. Вернадского, что исключило возможность нарушения его целостности при анализе. Из-за этого он не мог быть распилен с целью получения тонких срезов для последующего микроскопического исследования. Поэтому в качестве основного метода изучения была избрана мультиспиральная компьютерная томография, применение которой на базе медицинского диагностического центра «Рэмси Диагностика» (г. Санкт-Петербург) позволило установить наиболее вероятный диагноз — не одонтогенная остеома.

Таким образом, в обоих случаях были установлены древнейшие известные на сегодняшний день случаи неопластических новообразований у тетрапод, причем вятский материал показывает древнейшую злокачественную опухоль, а ярославский — древнейшую доброкачественную. Следует отметить, что среди материалов

по *Benthosuchus korobkovi* из местонахождения Тихвинское, хранящихся в Палеонтологическом институте им. А. А. Борисяка РАН, нами недавно была установлена еще одна правая ветвь нижней челюсти с опухолевым новообразованием. В настоящее время этот образец исследуется палеонтологами совместно с медицинскими специалистами (онкологами, патологоанатомами, рентгенологами).

Злокачественные и доброкачественные новообразования, известные, как правило, на основе макроскопических, рентгенографических и радиологических исследований, зарегистрированы и у более молодых по геологическому возрасту мезозойских тетрапод. Так, случаи остеосаркомы были недавно выявлены при исследовании бедренной кости у родственной черепахам среднетриасовой рептилии *Pappochelys rosinae* из среднего триаса Германии [6] и малой берцовой кости рогатого динозавра *Centrosaurus apertus* из верхнего мела Канады [4], причем в последнем случае диагноз был подтвержден гистологически. Повреждения с подозрением на саркому Юинга описаны при изучении двух хвостовых позвонков не определимого до рода динозавра-гадрозавра так же из позднемеловых отложений Канады [7]. У самых крупных из известных на сегодняшний день динозавров-зауропод зарегистрирован только один случай доброкачественной опухоли. При этом два различных неопластических поражения, остеома и гемангиома, были установлены макроскопическим, радиологическим и гистологическим анализами на одном хвостовом позвонке титанозавра из верхнего мела Бразилии [3].

Как известно, частота встречаемости патологических нарушений на ископаемом материале зависит от величины имеющейся выборки и степени сохранности остатков. Применительно к двум указанным выше раннетриасовым местонахождениям Европейской России (Федоровка и Тихвинское) следует отметить, что оба они хорошо изучены как в отношении разнообразия известной из них биоты, так и условий их образования. Из местонахождения Фёдоровка известно более 40 костных остатков, принадлежащих представителям рода *Parotosuchus*. В нем также встречены остатки (фрагменты черепов, нижних челюстей, отдельные кости) других темноспондильных амфибий (*Inflectosaurus* sp., *Yarengia* (?) sp., *Batrachosuchoides lacer*, *Melanopelta antiqua*), реликтовых рептилиоморфных амфибий — антракозавров (*Axitectum georgi*), а также рептилий — архозавров-текодонтов (*Tsylmosuchus* sp.), парарептилий-проколофонов (*Tichvinskia vjatkensis*), проторозавров — пролацертид (*Augustaburiania* (?) sp.) и неопределимых териодонтов. Вмещающие костные остатки отложения (песчаники и конгломераты) образовались в русле крупной реки, стекавшей со склонов молодых и высоких тогда Уральских гор.

Местонахождение Тихвинское по количеству и сохранности собранного костного материала, а также по биоразнообразию (темноспондильные амфибии, архозавры, рыбы, членистоногие, моллюски, макрофлора) не имеет аналогов в нижнем триасе Восточной Европы. Собранные здесь многочисленные остатки темноспондильных амфибий (черепа, нижние челюсти и их фрагменты, изолированные кости посткраниального скелета; всего более 600 экз.) принадлежат *Benthosuchus korobkovi*, *Thoosuchus yakovlevi* и *Wetlugasaurus angustifrons*. Редкие остатки архозавров-текодонтов (*Chasmatosuchus* sp.) представлены изолированными позвонками. Литологический анализ вмещающих отложений (глин, алевритов с мергелистыми конкрециями) указывает на их формирование в спокойных мелководных условиях солоноватоводного бассейна, что способствовало сохранению тончайших деталей строения скелетных элементов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-05-00092).

Список литературы:

1. Губин Ю.М., Петровичев Н.Н., Соловьев Ю.Н., Кочергина Н.В., Лукьянченко А.Б., Марков С.М. Новообразование покровных костей черепа раннетриасовой амфибии // Вопросы онкологии. – 2001. – Т. 47, № 4. – С. 449–455.
2. Новиков И.В., Гайдук П.А., Грибанов А.В. , Иванов А.Н., Новиков А.В., Стародубцева И.А. Наиболее древний случай неопластических изменений костной ткани у тетрапод // Палеонтологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 66–69.
3. Barbosa F. H. S., Pereira P.V. L.G., Bergqvist L. P., Rothschild B. M. Multiple neoplasms in a single sauropod dinosaur from the Upper Cretaceous of Brazil // Cretaceous Research. – 2016. – № 62. – P. 13–17. doi:10.1016/j.cretres.2016.01.010
4. Ekhtiari S., Chiba K., Popovic S., Crowther R., Wohl G., Wong A. K. O., Tanke D. H., Dufault D. M., Geen O. D., Parasu N., Crowther M. A., Evans D. C. First case of osteosarcoma in a dinosaur: a multimodal diagnosis // The Lancet Oncology. – 2020. – V. 21. – № 8. – P. 1021–1022.
5. Gubin Y.M., Novikov I.V., Morales M. A review of anomalies in the structure of the skull roof of temnospondylous labyrinthodonts // Paleontol. J. – 2000. – V. 34. – Suppl. 2. – P. 154–164.
6. Haridy Y., Witzmann F., Asbach P., Schoch R.R., Fröbisch N., Rothschild B.M. Triassic Cancer—Osteosarcoma in a 240-Million-Year-Old Stem-Turtle // JAMA Oncology. – 2019. – V. 5. – № 3. – P. 425-426. doi:10.1001/jamaoncol.2018.6766
7. Rothschild, B.M., Tanke, D., Rühli, F. et al. Suggested Case of Langerhans Cell Histiocytosis in a Cretaceous dinosaur // Scientific Reports. – 2020. – V. 10. – № 1. doi: 10.1038/s41598-020-59192-z
8. Witzmann F. A hemivertebra in a temnospondyl amphibian: the oldest record of scoliosis // Journal J. Vertebr. Paleontol. – 2007. – V. 27. – № 4. – P. 1043–1046.
9. Witzmann F., Rothschild B.M., Hampe1 O., Sobral1 G., Y. M. Gubin Y.M., Asbach P. Congenital malformations of the vertebral column in ancient amphibians // J. Veterinary Medicine. Ser. C. Anat., Histol., Embryol. – 2014. – V. 43. – № 2. – P. 90–102.