DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-16-17

КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИОНОВОЙ БАЛКИ У СЕЛА УРУСОВКА РАДИЩЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Артемьева Елена Александровна,
доктор биологических наук, профессор Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск
Селищев Максим Александрович,
студент Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. Рассматриваются показатели почвы и фауны региональной ООПТ «Пионовая балка у с. Урусовка Радищевского района Ульяновской области». Проведены наблюдения за фауной. Выявлены особенности почвенных показателей.
Ключевые слова: фауна, флора, почва, ландшафт, Ульяновская область.

INTEGRATED ECOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE PION BALKA NEAR THE VILLAGE OF URUSOVKA, RADISHCHEVSKY DISTRICT, ULYANOVSK REGION

Artemieva Elena Alexandrovna,
Doctor of Biological Sciences, Professor of Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk
Maxim Alexandrovich Selishchev,
Student of Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk

Abstract. The indicators of soil and fauna of the regional protected area “Pionovaya Balka near the village of Urusovka of Radishevsky District, of Ulyanovsk Region” are considered. Fauna observations were made. Features of soil indicators are revealed.
Keywords: fauna, flora, soil, landscape, Ulyanovsk region.

Пионовая балка находится в 2-х км к ю-з от с. Урусовка (N52°51’44”; E48°00’37”), в 4,5 км к с-в от с. Воскресеновка, 141 м н. у. м. Основные типы сообществ пионовой балки: разнотравно-кострецово-луговые степи, солончаки, перистоковыльные участки. Степная балка к ю-з от заброшенного с. Урусовка (овраг Лисятник) тянется в направлении с северо-запада на юго-восток и упирается в р. Малая Терешка, расширяясь к устью. По дну балки течет небольшой, периодически пересыхающий ручей, который впадает в р. Малая Терешка. В балке, на склоне северо-западной экспозиции произрастает крупная популяция пиона тонколистного (*Paeonia tenuifolia*) [1, 2].

Цель работы: проведение комплексных биоэкологических и геохимических исследований степных сообществ пионовой балки у с. Урусовка Радищевского района Ульяновской области.

На территории пионовой балки отмечены виды птиц (2014–2021) (редкие виды выделены жирным): большая выпь (1), **огарь** (3), чирок-трескунок (1), лысуха (пара), коростель (1), **осоед** (1), черный коршун (пара, гнездо), болотный лунь (2 пары), луговой лунь (2 пары), тетеревятник (1), **орел-карлик** (1), **могильник** (2 пары), **орлан белохвост** (1), чеглок (1), обыкновенная пустельга (пара, гнездо), вяхирь (пара), клинтух (4), кольчатая горлица (1), ушастая сова (1), черный стриж (3), золотистая щурка (2 колонии), береговушка (3 колонии), деревенская ласточка (5), полевой жаворонок (23), желтая трясогузка (2 поселения), желтолобая трясогузка (2 поселения), желтоголовая трясогузка (2 поселения), белая трясогузка (9), жулан (пара), обыкновенный скворец (поселение), сорока (4), галка (4), серая ворона (5), ворон (2), обыкновенный сверчок (1), индийская камышевка (пара), садовая камышевка (1), садовая славка (2), серая славка (1), серая мухоловка (пара), луговой чекан (6), обыкновенная каменка (пара), варакушка (пара), полевой воробей (5), садовая овсянка (4).

На территории пионовой балки зарегистрированы редкие виды насекомых, занесенные в Красные книги РФ и Ульяновской области (2015): дыбка степная *Saga pedo,* бронзовка большая зеленая *Netocia aeruginosa*, златка узкотелая медная *Agrilus mendax*, корнегрыз-крестоносец *Dorcadion equestre*, клеон ахатес *Cyphocleonus achates*, толстоголовка сида *Pyrgus sidae*, голубянка дамокл *Polyommatus (Agrodiaetus) damocles*, аммофила хвостатая *Ammophila terminate,* сколия степная *Scolia (Discolia) hirta*, тифия мрачная *Tiphia morio*, парнопес крупный *Parnopes grandior*, сфекс черноволосый *Sphex atropilosus*, шмель армянский *Bombus armeniacus*, шмель глинистый *Bombus argillaceus*.

В балке отмечена степная гадюка *Vipera renardi* (Christoph, 1861), вид занесен в Красные книги РФ и Ульяновской области [2].

На территории пионовой балки зарегистрировано 18 видов млекопитающих: еж обыкновенный *Erinaceus europaeus* (Linnaeus, 1758), крот европейский *Talpa europaea* (Linnaeus, 1758), бурозубка обыкновенная *Sorex araneus* (Linnaeus, 1758), заяц русак *Lepus europaeus* (Pallas, 1778), сурок-байбак *Marmota bobac* (Müller, 1776), обыкновенный хомяк *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758), слепыш обыкновенный *Spalax microphthalmus* (Guldenstaedt, 1770) [2], рыжая полевка *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780), обыкновенная полевка *Microtus arvalis* (Pallas, 1778), восточноевропейская полевка *Microtus levis* (Miller, 1908, (*M. rossiaemeridianalis* Ognev, 1924), полевая мышь *Apodemus agrarius* (Pallas, 1771), домовая мышь *Mus musculus* (Linnaeus, 1758), серая крыса *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769); волк *Canis lupus* (Linnaeus, 1758), обыкновенная лисица *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758), ласка *Mustela nivalis* (Linnaeus, 1758), горностай *Mustela erminea* (Linnaeus, 1758), хорь степной *Mustella eversmanni* (Lesson, 1827).

Проведено исследование пробы почвы от 25.08.2017

Таблица 1
Результаты анализа почвенных проб и степень обеспеченности (валовое содержание подвижных форм минеральных веществ) в биотопах степных сообществ пионовой балки в Радищевском районе Ульяновской области.

Пробы	pH	Орган. в-во %	P_2O_5 мг/кг	K_2O мг/кг	Ca ммоль/100 г	Mg ммоль/100 г	S мг/кг	Cu мг/кг	Zn мг/кг	Mn мг/кг	Мехсостав, частицы <0,01 мм%
Пионовая балка, р. Малая Терешка	6,2 нейтральная	10,1 очень высокая	450,0 очень высокая	650,0 очень высокая	43,8 очень высокая	3,4 высокая	8,5 средняя	7,8 высокая	1,05 низкая	35,6 высокая	75,0 глина средняя
p, вероятность	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Примечание: определение содержания фосфора (P_2O_5) и калия (K_2O) проведены по методу Чирикова (при pH<=7,0); определение содержания фосфора (P_2O_5) и калия (K_2O) проведены по методу Мачигина (при pH>7,0). Градация частиц механического состава почвы: от 5 до 10 – песок связный, от 10 до 20 – супесь; частицы физической глины – < 0,01 мм.

Таблица 2
Содержание тяжелых металлов (ТМ) (валовое содержание подвижных форм минеральных веществ) в почвах пионовой балки в Радищевском районе Ульяновской области.

Пробы	Cu, мг/кг	Zn, мг/кг	Pb, мг/кг	Cd, мг/кг	Ni, мг/кг
Пионовая балка, р. Малая Терешка	20,39	59,69	012,94	0,132	45,70
ПДК	132,0	220,0	130,0	2,0	80,0
p, вероятность	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

МЦ по определению тяжелых металлов (ТМ) в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. ЦИНАО, 1992 г. Анализ проведен в ФГБУ «САС «Ульяновская».

г., взятой в степных сообществах пионовой балки у с. Урусовка, по р. Малой Терешке. Проба взята на суходольном участке разнотравно-кострецово-луговой степи, вдоль русла р. Малая Терешка, на отмели, в биотопе колонии желтых трясогузок. Почвы глинистые, на верхнеюрских глинах, черноземовидные. Результаты анализа приведены в табл. 1, 2.

Анализ почвы показывает, что земли пионовой балки не загрязнены тяжелыми металлами и обладают высокими показателями плодородия, что обусловлено хорошей сохранностью степных ценозов и довольно высокой степенью их биоразнообразия. Данный почвенно-растительный покров характеризует присутствие в пионовой балке уникального коренного степного комплекса животных.

Антропогенное воздействие на степные сообщества пионовой балки. Весенние палы, перевыпас скота, разрушение большегрузными машинами склонов и дна балки при разведке нефтяных месторождений и прокладки кабеля приводят к повреждению почвенного и растительного покровов, способствует развитию пастбищной дегрессии, приводящей к засорению редких сообществ сорными видами и уменьшению обилия степного разнотравья и злаков, сопровождается эрозионными процессами и дефляцией почв, разрушению биотопов насекомых, земноводных и рептилий, птиц, млекопитающих, др.

Предложения по изменению статуса пионовой балки. Предлагается создать на данной территории ландшафтный памятник природы регионального (местного) значения. Данный природный объект является уникальным природным объектом Ульяновской области как рефугиум степной фауны и флоры. Несмотря на значительную антропогенную нагрузку, на территории балки продолжает сохраняться высокий уровень биологического разнообразия. Для сохранения данного природного объекта необходимо увеличение охраняемой площади (создание буферной зоны – 500 м по периметру балки) и для обеспечения охраны территории.

Список литературы:

1. Артемьева Е.А., Масленников А.В., Масленникова Л.А., Корепов М.В., Корепова Д.А., Корольков М.А., Кривошеев В.А., Бородин О.В., Смирнова С.Л. Новые и перспективные ООПТ Ульяновской области / Под ред. Е.А. Артемьевой; Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова. – Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2017. – 268 с.
2. Красная Книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, А.В. Масленникова, М.В. Корепова; Правительство Ульяновской области. – М.: Издательство «Буки Веди», 2015. – 550 с.