

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-10-13

ЭДАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ ПОПУЛЯЦИЙ ОБЫКНОВЕННОЙ СЛЕПУШОНКИ *ELLOBIUS TALPINUS* (PALLAS, 1770) К ОБИТАНИЮ В СТЕПНЫХ ЛАНДШАФТАХ

Артемьева Елена Александровна,

доктор биологических наук, профессор Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. Рассматриваются показатели изменчивости окраски меха и морфометрии обыкновенной слепушонки *Ellobius talpinus* (Pallas, 1770) (Rodentia, Cricetidae) как адаптации к эдафическому фактору обитания популяций данного вида.

Ключевые слова: обыкновенная слепушонка, землеройки, биотоп, почва, ландшафт.

EDAPHIC FACTOR AS A CONDITION FOR THE ADAPTATION OF POPULATIONS OF THE NORTHERN MOLERAT *ELLOBIUS TALPINUS* (PALLAS, 1770) TO DIVING IN STEPPE LANDSCAPES

Artemieva Elena Alexandrovna

Doctor of Biological Sciences, Professor of Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk

Abstract. The indicators of fur color variability and morphometry of northern molerat *Ellobius talpinus* (Pallas, 1770) (Rodentia, Cricetidae) are considered as adaptations to the edaphic factor of habitation of populations of this species.

Keywords: northern molerat, burrowing shrews, biotope, soil, landscape.

Для *Ellobius talpinus* (Pallas, 1770) (Rodentia, Cricetidae) ведущую роль в среде обитания ее колоний играет эдафический фактор, связанный с механическим и химическим составом почвы. Обыкновенная слепушонка предпочитает для устройства колоний и рытья нор участки биотопов, расположенные в степных ландшафтах Правобережья р. Волга, в развитых овражно-балочных системах, по склонам оврагов и меловых холмов, в каменистых меловых степях и в песчаных степях [4; 18]. Растительность участков колоний в степях представлена различными вариантами разнотравно-ковыльно-типчаковых степей на песках и на карбонатных черноземах.

Цель работы: выявление тенденций адаптаций вида к эдафическому фактору колоний.

Разные почвенно-грунтовые субстраты имеют важное значение для формирования специфики экологической ниши колоний *Ellobius talpinus*, привязанных к определенному составу грунта. Эдафический фактор влияет и на выбор кормовых объектов вида, так как является определяющим при формировании определенных растительных ассоциаций степей. В Среднем Поволжье обитают три экологических группы популяций обыкновенной слепушонки, колонии которых связаны

с песчаными аренами (песчаные степи) - окраска меха зверьков имеет рыжевато-песчаные тона, с меловыми аренами (каменистые маловые степи) - окраска меха зверьков имеет темно-серый тон или меланистическая (черная), с галофитными лугами.

Морфометрические показатели также связаны с обитанием колоний в разных типах грунта. Так, на песчаных аренах обитают колонии с меньшими промерами зверьков - более мелкие особи. На меловых аренах обитают колонии с большими размерами зверьков - более крупные особи, что, вероятно, связано с большими энергозатратами при копании меловых карбонатных черноземов по сравнению с более легкими и податливыми песчаными почвами.

Колонии обыкновенной слепушонки как залог поддержания и сохранения степных ландшафтов и почв. Типовые колонии *Ellobius talpinus* характеризуются хаотичным и густым расположением выкидов по 20-30 шт. и наличием «головной» (свежей) и «хвостовой» (старой) частей колонии. Среднее расстояние между выкидами составляет 0,5-1,5 м. Типовой выкид имеет полумесячную форму с краевым углублением. Выкид, сформированный мелкозернистым грунтом, имеет овальную форму с диаметром 25-35 см. Средний объем выкида составляет 2-3 л (за год выносятся от 60-150 куб. м грунта на каждом га участка колонии [13]. При относительной численности 3-5 колоний на 1 га число выкидов в течение года составляет 40-90 куб. м почвы (каждый выкид 2,5 л). Во второй половине лета характерно возрастание роющей деятельности зверьков [14]. Средняя относительная плотность вида составляет около 3-5 поселений на 1 км маршрута, количество выкидов в одной колонии составляет - 20-35 холмиков [13]. Подземные ходы находятся на глубине 13-15 см, расстояние между выкидами почвы составляет 35-75 см. Размер выкидов почвы 20-30 см в диаметре и до 10 см высоты [14]. Форма выкидов напоминает полумесяц, развернутый вокруг выхода. Само отверстие норы закрыто и заметно по небольшому углублению. Встречаются выкиды ассиметрично-конусовидной формы без боковой ямки [14].

Размеры поселений *Ellobius talpinus* варьируют от 10-20 до 100 кв. м и до нескольких гектаров площади. Высота выброса достигает 35 см [5; 6]. Участок степи, заселенный слепушонкой, пестреет множеством холмиков. Эти холмики – единственные следы подземной работы зверьков. Отнорки и входы в норы туго забиты земляными пробками. Из норы слепушонки можно заметить маленький земляной фонтанчик - зверек быстро работает задними лапами, сухая земля измельчена зубами на мелкие комочки. Кучки земли, выброшенные слепушонкой, похожи на бархан или миниатюрный вулкан. Слепушонка лапками откидывает землю, разрушая твердую почву большими, выставленными вперед

резцами. 1,5 - метровый ход слепушонки, диаметр основания кучки земли (отвала почвы) - 25-40 см, редко больше [17]. Зверьки ежедневно роются и копаются в поверхностных слоях почвы, прокладывают длинные ходы в глубину подпочвы, перебрасывают и измельчают огромные массы земли. Небольшая семья слепушонок покрывает за лето кучками почвы более 25 м² поверхности земли [17].

Изменчивость окраски как адаптация вида к эдафическому фактору. Для вида характерна широкая изменчивость окраски меха, которая маркирует группы популяций из разных областей ареала. Окраска меха спинной части тела обыкновенной слепушонки *Ellobius talpinus* варьирует от светло-серой и песчано-охристо-рыжеватой до буроватой, черно-бурой и черной. Окраска меха брюшной части тела также бурая или с буроватым налетом [16].

На территории Среднего Поволжья и Южного Урала отмечены частичные и полные меланисты. В пределах Южного Урала и Зауралья наблюдается четко выраженная географическая изменчивость полиморфизма по окраске меха, морфы: черная, бурая и переходная. В меридиональном и широтном направлениях соотношение морф в популяциях существенно меняется: в степной зоне преобладают мономорфные популяции (животные только бурой окраски), в лесостепной - полиморфные (с тремя морфами). При продвижении на север, к границе ареала, часть морф выпадает, и остаются популяции только с одной или двумя морфами. Представители исключительно черной морфы встречены в форпостных популяциях на севере Челябинской области [10; 15; 20].

Полиморфизм окраски является маркером региональных популяций и обеспечивает широкий спектр адаптивных возможностей локальных популяций, позволяющих виду существовать в нескольких различных природных зонах (от полупустыни до лесостепи) [10].

Окраска меха *Ellobius talpinus* изменяется от светлой желтовато-рыжей до совершенно черной. На протяжении ареала популяции обнаруживают довольно значительные изменения, особенно в окраске. На севере ареала окраска относительно темно-бурая с коричнево-охристым или сероватым оттенком, голова темнее, сверху коричнево-бурая. Брюшная сторона лишь немного светлее верха; имеется значительный процент меланизма (потемнения) до совершенно черной окраски. В более южных частях ареала (южная Украина, степи Северного Кавказа, Волжско-Уральские полупустыни, Актюбинская область и др.) окраска светлее, меланистическая окраска редка. В самых южных частях ареала (зона пустынь) окраска наиболее светлая, охристо-песчаная; бока и низ беловатые; верх головы лишь со слабой примесью буроватого; меланистическая окраска не встречается. В горных местностях Средней Азии и Казахстана снова наблюдается заметное потемнение окраски, и вновь появляются меланистические особи, хотя и в меньшем проценте, чем на севере ареала [7].

Подвиды обыкновенной слепушонки: *Ellobius talpinus talpinus* Pall. (1770) - окраска меха спины обыкновенно довольно интенсивная серо-буроватая, верх головы черный, нередко встречаются совершенно черные особи;

Среднее Поволжье, Заволжье, Северный Казахстан и т. д. *E. t. tanaiticus* Zubko (1940) - окраска более бледная, чем у предыдущего подвида, тускло серая с палево-буроватой примесью; верх головы менее затемнен; Крым, южная Украина, Предкавказье. *E. t. rufescens* Eversmann (1850) - окраска спины светлая, желтовато-охристая; верхняя часть головы серо-буроватая с легким розовым оттенком; меланисты очень редки; низовья р. Урала, Актюбинская область, Акмолинская область.

Основополагающую роль в жизни землероев-норников играют почвенно-грунтовые условия - эдафический фактор, в широком понимании как почвенно-грунтовый фактор. Прежде всего, в экологическом отношении представляют интерес механический состав, структура почвы и ее поверхности. От окраски поверхности почвы зависит окраска животных, она имеет криптический защитный характер. Совпадение окраски животных и грунта часто наблюдается даже у видов, активных не днем, а ночью. Так, североамериканские грызуны рода *Perognathus* отчетливо различаются по окраске: на лавовых потоках живут темноокрашенные зверьки, на белых песках - очень светлые [9].

Почва - мощный средообразующий фактор, определяющий основные характеристики колоний и популяций, региональных групп популяций *Ellobius talpinus*: почвенные характеристики являются важным диагностическим признаком колоний, популяций, региональных групп популяций, который определяет экоморфологические особенности вида: тип окраски меха особей. Соответствие окраски меха *Ellobius talpinus* почвенному субстрату колоний выглядит следующим образом: рыже-песочно-бежевые оттенки - колонии на песках и супесях; буроватые и бурые оттенки - колонии на суглинках легких и средних; сероватые и серые оттенки - колонии на карбонатных черноземах; черноватые и черные - колонии на обыкновенных и южных черноземах.

Этим можно объяснить причину такого разнообразия окраски меха у *Ellobius talpinus*, которое наблюдал С. И. Огнев [15], при работе с музейными коллекциями данного вида, а также выявленные три основных цветовых морфы *Ellobius talpinus* [10]: бурая, черная и переходная, которые привязаны к основным типам почвенных субстратов, на которых обитали колонии в исследованных регионах - суглинки, черноземы и промежуточные их варианты. При этом все существующие варианты окраски *Ellobius talpinus* и *E. tancrei* имеют генетическую основу.

Изменчивость морфометрических показателей как адаптация вида к эдафическому фактору. Подвиды обыкновенной слепушонки с запада на восток по ареалу: *Ellobius talpinus tanaiticus* Zubko, 1940 (Украина, Крым); *Ellobius talpinus talpinus* Pallas, 1770 (Среднее Поволжье, западная часть Оренбургской области); *Ellobius talpinus rufescens* Eversmann, 1850 (степи на восток от р. Урал). Подвид *E. t. tanaiticus* Zubko. отличается от номинативного меньшими размерами: длина тела чуть более 100 мм, длина лапки 20 мм (Воронцов & Якименко 1984). С Северного Кавказа описан *Ellobius talpinus tanaiticus* [12]. Окраска меха спинной части тела тем-

но-серая, мышастая, окраска головы немного темнее, но не резко отличается от окраски спины, бока серые, брюшная часть тела чуть светлее, размеры тела в целом меньше по сравнению с представителями из популяций в центральной части ареала [12].

Популяции *Ellobius talpinus* в Оренбургской области по морфометрическим показателям близки к популяциям сопредельных территорий. В Оренбургской области *Ellobius talpinus* отличаются меньшей массой, но большей длиной тела, в результате меньшей упитанностью. Различия в длине хвоста и ступни незначительны. С юга на север наблюдается некоторая тенденция к снижению длины ступни и увеличению средней длины хвоста [11]. У всех обследованных животных, независимо от пола, направленность возрастной изменчивости экстерьерных признаков одинакова. Вес и длина тела увеличиваются с возрастом и достигают максимума у слепушонок 3-й возрастной группы, так как основной процент животных, принимающих участие в размножении, - этого возраста [11].

Сезонные и возрастные морфофункциональные изменения интерьерных и экстерьерных признаков носят адаптивный характер, вписываясь в общебиологические закономерности, отражают особенности биологии *Ellobius talpinus* исследуемого региона. Морфофункциональная характеристика экстерьерных и интерьерных признаков особей указывает на то, что в степной зоне Южного Урала вид обеспечивает оптимальное воспроизводство и эффективную адаптацию к факторам среды обитания [11].

Подвиды *Ellobius talpinus* имеют следующие длину тела и длину хвоста: *Ellobius talpinus talpinus* Pallas (1770) - 100-120 мм, 8-15 мм; Среднее Поволжье, Заволжье, Северный Казахстан; *E. t. tanaiticus* Zubko (1940) - 98,2-120 мм, 7,7-13,5 мм; *E. t. rufescens* Eversmann (1850) - 130 мм, 17 мм.

Почва - мощный эдафический фактор, определяющий основные характеристики колоний и популяций (также для наземногнездящихся птиц) [1; 2; 3; 19] региональных групп популяций *Ellobius talpinus*: экоморфологические особенности вида - основные морфометрические параметры особей. Западный подвид *Ellobius talpinus tanaiticus*, имеющий меньшие размеры основных морфометрических параметров тела, привязан к песчаным аренам, требующим меньших физических затрат на устройство колоний в более сыпучих песчаных и супесчаных субстратах. Для устройства колоний в черноземных почвах разных вариантов более приспособлен номинативный подвид *Ellobius talpinus talpinus*, обладающий большими размерами тела и большими величинами основных морфометрических параметров. Данный подвид обладает большей физической силой для рытья нор в более плотной черноземной почве.

Почва как эдафический фактор, формирующий основные характеристики колоний и популяций, региональных групп популяций *Ellobius talpinus*: определяет пространственные рамки экологической ниши колоний, популяций вида в разных областях ареала - по почвенному субстрату и по развитию растительной кормовой базы на этих субстратах. Поэтому почвенные характеристики являются важным диагностическим признаком

колоний, популяций, региональных групп популяций, который определяет экоморфологические особенности вида: тип окраски меха и основные морфометрические параметры особей, которые имеют клинальный характер и направлены с северо-запада на юго-восток.

Особую благодарность автор выражает ведущему научному сотруднику Зоологического музея Национального научно-природоведческого музея НАН Украины Игорю Загороднюку за консультации.

Список литературы:

1. Артемьева Е.А., Жданова М.С., Маловичко Л.В. К геохимии гнездовых биотопов и биоэкологии золотистой щурки и желтой трясогузки в Ульяновской области (Среднее Поволжье) // Проблемы региональной экологии. - 2020. - № 1. - С. 13-21. DOI 10.24411/1728-323X-2020-11020.
2. Артемьева Е.А., Калинина Д.А. К геохимии гнездопригодных биотопов «желтых» трясогузок (Passeriformes, Motacillidae) в Ульяновской области (Среднее Поволжье) // Экология урбанизированных территорий. - 2018. - № 1. - С. 24-29.
3. Артемьева Е. А., Калинина Д. А. К геохимии гнездопригодных биотопов наземногнездящихся птиц воробьинообразных птиц (Aves, Passeriformes) в Ульяновской области (Среднее Поволжье) // Экология урбанизированных территорий. - 2019. - № 1. - С. 93-98. DOI 10.24411/1816-1863-2019-11093.
4. Артемьева Е.А., Масленников А.В., Масленникова Л.А., Корепов М.В., Корепова Д.А., Корольков М.А., Кривошеев В.А., Бородин О.В., Смирнова С.Л. Новые и перспективные ООПТ Ульяновской области. Под ред. Е.А. Артемьевой; Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова. - Издательство «Корпорация технологий продвижения», Ульяновск, 2017. - 268 с.
5. Беляков Б.Ф. Животный мир куйбышевских лесов // Лесное хозяйство Куйбышевской области. - Куйбышев: Куйбышевское книжное изд-во, 1976. - С. 172-181.
6. Виноградов А.В. Природные коллекции Самарского областного Краеведческого музея им. П.В. Алабина // Краеведческие записки. - Вып. VII. - Самара: Изд-во «СамВен», 1995. - С. 329-343.
7. Виноградов Б.С., Громов И.М. Грызуны фауны СССР. - М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. - 297 с.
8. Воронцов Н. Н., Якименко Л. В. Морфометрический анализ изменчивости черепа слепушонок (*Ellobius*, Rodentia) // Зоологический журнал. - 1984. - Т. 63 - № 12. - С. 1865-1877.
9. Громов В.С. Пространственно-экологическая структура популяций грызунов. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. - 581 с.
10. Евдокимов Н.Г., Синева Н.В. Географическое распространение окрасочных морф обыкновенной слепушонки на Южном Урале и в Зауралье // Фауна Урала и Сибири. - 2016. - № 1. - С. 156-163.
11. Елина Е.Е. Особенности морфофизиологических показателей обыкновенной слепушонки *Ellobius talpinus* степных биоценозов Южного Урала // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал (Online). - 2013. - Т. 2. - № 6. - С. 9-13.
12. Зубко Я. П. До питання про підвидовий склад сліпачків (*Ellobius talpinus* Pall.) в Європейській частині СРСР. Окремі відбиток з книги «Наукові записки» // Научные записки Харьковского педагогического института. - Харківський державний педагогічний інститут: Видання ХДПІ, Харківського державного педагогічного інституту. - 1940. - Т. IV. - С. 191-194.
13. Коробченко М.А. Сліпуючок (*Ellobius talpinus*) на піщаних аренах долини річки Деркул (Ростовська і Луганська області) // Раритетна теріофауна та її охорона. Праці Теріологічної школи. - 2008. - № 9. - С. 228-231.
14. Коробченко М.А., Загороднюк І.В. Землерийна діяльність сліпюшка (*Ellobius talpinus*) та характеристика його поривів // Вісник Луганського університету, Біологічні науки. - 2008. - Т. 14. - № 153. - С. 56-62.
15. Огнев С.И. Грызуны (Звери СССР и прилежащих стран). - М.-Л.: АН СССР, 1950. - Т. 7. - 706 с.
16. Павлинов И.Я., Крускоп С.В., Варшавский А.А., Борисенко А.В. Наземные звери России. Справочник-определитель. - М.: Изд-во КМК, 2002. - 298 с.

17. Формозов А.Н. Спутник следопыта / Предисловие, подготовка текста и дополнительные примечания Н. А. Формозова. – Изд. 7-е, доп. – М.: Издательство КомКнига, 2006. – 368 с.
18. Artemieva E. Urban mammal fauna under conditions of a large city (on the example of Ulyanovsk, Middle Volga Region) // *Theriologia Ukrainica*. – 2021. – № 21. – С. 3–23. <http://doi.org/10.15407/TU2103>.
19. Artemyeva E.A., Grudin D.A. To the study of the nesting cycle of yellow wagtail within the Steppe Research Station «Orenburg Tarpania» // Ninth International Symposium «Steppes of Northern Eurasia». – IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – 817 012005 – IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/817/1/012005.
20. Cheprakov M.I., Evdokimov N.G., Glotov N.V. Inheritance of Coat Color in the Mole Vole (*Ellobius talpinus* Pallas) // *Rus. J. of Genetics*. – 2005. – Т. 41. – № 11. – С. 1281–1286.