

Геоэкологические проблемы ландшафтов

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-8-9

ОЧИСТКА ХРОМА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ *AZOLLA CAROLINIANA*

Азимов Шавкат Шухратович

исследователь Ташкентского государственного технического университета, г. Ташкент, Узбекистан

Хўжамшукуров Нортожи

доктор биологических наук, профессор Ташкентского химико-технологического института, г. Ташкент, Узбекистан

Кучкарова Дилафруз

кандидат технических наук, доцент Ташкентского архитектурно-строительного института, г. Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В этом исследовании изучалась толерантность к хрому макрофитов, в том числе *Azolla caroliniana*, *Lemna minor*, *Pistia stratiotes* и *Eichhornia crassipes*.

Ключевые слова: *Lemna minor*, *Pistia stratiotes*, *Eichhornia crassipes*, *Azolla caroliniana*, хромовые сточные воды.

PURIFICATION OF CHROMIUM FROM WASTEWATER USING *AZOLLA CAROLINIANA*

Azimov Shavkat

Researcher of the Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan

Khujamshukurov Nortoji

Doctor of Biological Sciences, Professor of the Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan

Kuchkarova Dilafuz

Candidate of Technical Sciences, assistant professor of the Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. This research studied the chromium tolerance of macrophytes, including *Azolla caroliniana*, *Lemna minor*, *Pistia stratiotes* and *Eichhornia crassipes*.

Keywords: *Lemna minor*, *Pistia stratiotes*, *Eichhornia crassipes*, *Azolla caroliniana*, chromium wastewater.

Лишь в нескольких странах мира сточные воды кожевенных заводов используются в качестве технических вод при выращивании сельскохозяйственных культур после химической и микробиологической очистки [1]. Хотя значение высших водорослей на примере химических и нефтегазовых предприятий широко изучено в нашей стране, исследований по снижению количества хрома в сточных водах кожевенных заводов не проводилось. Для этого важно определить роль высших водорослей в очистке технических вод кожевенных заводов [5]. Поэтому в данной статье рассматриваются возможности макрофитной очистки хромсодержащих сточных вод кожевенных заводов. В настоящее время биомасса *Azolla* широко используется в ряде стран мира для очистки от тяжелых металлов промышленных стоков и сточных вод [3–8].

В ходе исследования был изучен процесс очистки сточных вод кожевенных заводов от хрома и других видов химических веществ с использованием высших водорослей. Также была изучена толерантность высших водорослей к хрому, который был определен в качестве основного объекта изучения. Согласно полученным результатам, биомасса *A. caroliniana* снижается с увеличением концентрации хрома (мг/л) 0,5→0,87%, 1,0→0,68%, 1,5→0,59%, 2,0→0,50%, 2,5→0,46%, 3,0→0,39% и корреляции биомассы (табл. 1). В частности, на 10-й день культивирования при концентрации 0,5 мг/л было получено 1150,9 г биомассы с 1 м², а при концентрации 3,0 мг/л – всего 1,79 г биомассы.

При изучении устойчивости макрофитов к хрому в количестве 1,0 мг/л показатели выживаемости *Azolla caroliniana* составили на 2–7 сутки культивирования 86,7%; 42,1%; 27,1% и 6,32%. По сравнению с контролем 1 он показал снижение на 12% на второй день роста и на 26,1% на 7-й день роста. Было обнаружено, что за тот же период выживаемость малой ряски составляет 3,21% за 5 дней роста по сравнению с другими макрофитами. На 7-е сутки наблюдения отмечено, что культура полностью некротизирована, корни начали гнить. *Lemna minor*, *Pistia stratiotes* и *Eichhornia crassipes* полностью некротизировались на 7-й день наблюдения, в то время как *Azolla caroliniana* полностью некротизировалась на 10-й день наблюдения. В ходе исследования было отмечено, что относительной устойчивостью среди макрофитов по показателю устойчивости к хрому (1,0 мг/л) обладала *Azolla caroliniana* (рис. 1).

Интересным аспектом исследования была очень низкая биомасса с выживаемостью 0,52%. Причина этого была отмечена в использовании в питательной среде водопроводной воды, в которую добавлялось некоторое количество хрома. Толерантность *Azolla caroliniana* к высоким концентрациям хрома и её сорбционные свойства к хрому можно объяснить отсутствием в питательной среде макро-, микроэлементов и минеральных солей.

В нашей стране не проводились исследования по биологической очистке высокохромистых (Cr) технических стоков кожевенных предприятий на основе высших водорослей. Поэтому сочетание биологической очистки сточных вод кожевенных заводов и очистка физико-химическими методами имеет большое научное, практическое и экологическое значение. На основе селекции высокоустойчивых к хрому водорослей получена адаптированная культура *Azolla caroliniana*, устойчивая к воде с содержанием хрома до 30%, на основе загрязненной хромом кустарной воды и остаточной воды завода в различных концентрациях и в искусственных условиях. В исследованиях изучался потенци-




Рис. 1. Толерантность макрофитов к хрому (1,0 мг/л).

ал *Azolla caroliniana* в отношении толерантности к хрому. Согласно результатам, процесс фотосинтеза 5-дневной культуры *Azolla caroliniana* адаптированной к хромированной (30%) сточной воде восстанавливается на 50-80%. Исходный посевной материал увеличивается в 3 раза на 7-й день роста. Урожайность культуры достигла 78,4–82,6% и снижение содержания хрома в сточных водах составила 4,87 мг/л хрома до 2,34 мг/л. Результаты показали, что *Azolla caroliniana* сорбирует хром в среднем в количестве 0,56-1,09 мг/г по отношению к сухой массе.

Список литературы:

- Arora A., Saxena S. Cultivation of *Azollamicrophylla* biomass on secondary-treated Delhi municipal effluents. *Biomass Bioenergy*, 2005. P. 60–64.
- Arora, A., S. Saxena, and D.K. Sharma. Tolerance and phytoaccumulation of chromium by three *Azolla* species. *World Journal of Microbiology & Biotechnology*, 2006. - P. 97–100.
- Bennicelli, R., Z. Stezpniewska, A. Banach, K. Szajnocha, and J. Ostrowski. The ability of *Azollacaroliniana* to remove heavy metals (Hg(II), Cr(III), Cr(VI)) from municipal waste water. *Chemosphere*, 2004. - P. 141–146.
- Mishra V.K., Tripathi B.D., Kim K.H. Removal and accumulation of mercury by aquatic macrophytes from an open cast coal mine effluent. *Journal of Hazardous Materials*, 2009. P. 749–754.
- Rai P.K. Technical note: Phytoremediation of Hg and Cd from industrial effluents using an aquatic free floating macrophytes *Azolla pinnata*. *Int J Phytoremediation*, 2008. P. 430–439.
- Rai P.K., Tripathi B.D. Comparative assessment of *Azolla pinnata* and *Vallisneria spiralis* in Hg removal from G.B. Pant Sagar of Singrauli Industrial region, India. *Environmental Monitoring and Assessment*, 2009. P. 75–84.
- Sela M., Garty J., Tel-Or E. The accumulation and the effect of heavy metals on the water fern *Azolla filiculoides*. *New Phytol*, 1989. P. 7–12.
- Stepniewska Z., Bennicelli R.P., Balakhnina R.P., Szajnocha K., Banach A., Wolinska A. Potential of *Azolla caroliniana* for the removal of Pb and Cd from wastewaters. *International Agrophysics*, 2005. P. 251–255.