

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-20-22

## УЩЕРБ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ГИБЕЛИ ХИЩНЫХ ПТИЦ (НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ЧАСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

**Барбазюк Евгений Владимирович**

кандидат биологических наук, научный сотрудник Института степи УрО РАН ОФИЦ УрО РАН, г. Оренбург

**Мячина Ксения Викторовна**

доктор географических наук, зав. отделом природно-техногенных геосистем Института степи УрО РАН ОФИЦ УрО РАН, г. Оренбург

**Аннотация.** В работе показано, что ущерб сельскому хозяйству в результате деятельности нефтегазового промысла может быть выявлен в том числе через оценку объема полезных для сельского хозяйства птиц, погибших на линиях электропередач нефтегазодобывающей инфраструктуры, и оценку спасенного птицами урожая сельскохозяйственных посевов от уничтожения грызунами. На ЛЭП нефтегазового комплекса за сезон могут погибнуть 65 особей пустельги. Одна семья этих птиц (пара взрослых с птенцами) потребляет за гнездовой сезон не менее 428 грызунов. Истребление такого количества грызунов помогает сберечь в среднем до полутонны урожая зерновых культур.

**Ключевые слова:** сельскохозяйственные посевы, добыча нефти и газа, хищные птицы, гибель, грызуны, ущерб.

### DAMAGE TO AGRICULTURE DUE TO THE DEATH OF DIURNAL RAPTORS (A CASE STUDY OF OIL AND GAS FIELD AREA OF THE ORENBURG REGION)

**Barbazyuk Evgeniy Vladimirovich**

Candidate of Biological Sciences, Researcher at the Steppe Institute of the Ural Branch of the RAS, Orenburg

**Myachina Ksenia Viktorovna**

Doctor of Geographical Sciences, Head of the Natural and Technogenic geosystems Department of the Steppe Institute of the Ural Branch of the RAS, Orenburg

**Abstract.** The paper shows possible calculating damage to agriculture resulting from oil and gas industry activities through an assessment of birds valuable for agriculture and electrocuted on oil and gas infrastructure power lines, and through an assessment of agricultural crop volume saved by birds from rodent destruction. During the season, 65 common kestrels may die on the power lines owned by an oil and gas complex. One family of these birds (a pair of adults with chicks) consumes at least 428 rodents during the breeding season. The extermination of a large number of rodents helps to save up to half a ton of grain crops on average.

**Keywords:** agriculture resulting, oil and gas production, death of diurnal raptors, rodents, damage.

Многие виды хищных птиц оказывают влияние на продуктивность сельскохозяйственных угодий, представляя

форму биологического метода борьбы с вредителями сельского хозяйства. Экономический эффект от их деятельности на сельскохозяйственных землях нельзя недооценивать: каждая семья хищника-мышееда истребляет за сезон 500–1000 мышевидных грызунов, сберегая около полутонны зернового урожая [3]. К этим цифрам необходимо добавить истребление сусликов, саранчовых, личинок жуков-щелкунов (проволочников), клопов вредная черепашка, свекловичных долгоносиков, хлебных жуков и прочих вредителей сельскохозяйственных полей. Таким образом, гибель хищных птиц в результате воздействия антропогенных факторов (в частности - нефтегазодобывающей инфраструктуры) может оказать негативный эффект на продуктивность посевов сельскохозяйственных культур. Цели настоящей работы: 1 – оценка возможного потенциального ущерба, который могут наносить нефтегазовые кластеры с разветвленной сетевой инфраструктурой животному миру, в частности, орнитофауне; 2 – оценка возможного потенциального ущерба сельскому хозяйству, связанного с изъятием хищных птиц из агроценозов.

Территория исследования – нефтегазоносные районы Оренбургской области. Исходные данные предлагаемого анализа – результаты полевого обследования птицепоопасных ЛЭП 6–10 кВ нефтегазодобывающей инфраструктуры. Выборочно обследовались небольшие отрезки ЛЭП – в среднем по 4 км каждый, общий километраж обследования составил около 60 км. Далее все количество найденных останков птиц экстраполировали на аналогичную сеть ЛЭП 6–10 кВ выбранного ключевого участка, предварительно оценив общую протяженность линий на основе космических изображений.

Расчет возможного числа гибели хищных птиц на ЛЭП и ущерба. В районе исследований на линиях электропередач 6–10 кВ гибнут в первую очередь представители семейства Врановые (грач, галка, сорока) – 2,01 особей/км, семейства Соколиные (обыкновенная пустельга, кобчик, чеглок) – 0,78 особей/км и семейства Ястребиные (обыкновенный канюк, орел-могильник, степной орел, черный коршун) – 0,26 особей/км. Средняя встречаемость погибших птиц под ЛЭП 6-10 кВ в районе исследований составила 3,22 особей/км.

В частности, обыкновенная пустельга *Falco tinnunculus* – основной потребитель вредных для сельского хозяйства мышевидных грызунов в рассматриваемом регионе. Обыкновенная пустельга – типичный обитатель степных открытых пространств, активный потребитель грызунов, вредителей сельского хозяйства - основу рациона пустельги в степях Южного Урала составляют грызуны и насекомые [5, 6, 7]. Этот вид наиболее показателен в качестве примера пользы хищных птиц в борьбе с грызунами и, соответственно, примера пользы для сельского хозяйства. Обыкновенная пустельга в связи

Таблица 1

Общая протяженность ЛЭП, число пораженных особей обыкновенной пустельги под ЛЭП (реальные и расчетные данные), среднее потребление обыкновенной пустельгой грызунов за разные периоды гнездового сезона и некоторые биологические параметры обыкновенной пустельги.

Исходные данные		Расчетные данные	
Общая протяженность осматриваемых ЛЭП, км	57,72 (наши данные)	Общая протяженность ЛЭП модельного участка, км	134,36
Общее число найденных птиц, особей	28 (наши данные)	Общее расчетное число птиц, особей	65,18
Среднее потребление 1 взрослой пустельгой грызунов за сутки, особей (с начала откладки до появления птенцов)	$2.6 \pm 0.8$ (n = 35) [11]	Расчетное потребление 65,18 взрослыми пустельгами грызунов за сутки, особей (с начала откладки до появления птенцов)	169,47
Среднее потребление 1 птенцом грызунов за сутки, особей (с начала вылупления до покидания гнезда)	$1.7 \pm 0.9$ (n = 47) [11]	Среднее расчетное потребление 2,66 птенцами пустельги [6] грызунов за сутки, особей (с начала вылупления до покидания гнезда)	4,52
		Среднее расчетное потребление 2,66 птенцами пустельги на одно гнездо [6] грызунов за период нахождения в гнезде – 28,6 суток [8, 9, 4, 5], особей (с начала вылупления до покидания гнезда)	129,3
Расчетное потребление 1 парой пустельг грызунов за гнездовой сезон, особей (15 апреля – 31 июля)	290 [12]	Расчетное потребление 65,18 грызунов пустельгами за гнездовой сезон, особей (15 апреля – 31 июля)	9451,1
Длительность инкубации (дней). Начинается с первого яйца.	30 [2] 27–29 [10]	Расчетное потребление 1 взрослой пустельгой грызунов (2,6 в сутки [11]) за период инкубации, особей (с начала откладки до появления птенцов – 29 суток)	75,4
Среднее число покинувших гнездо слетков	$2,66 \pm 0,25$ (n=38) [6]	-	-
Возраст (суток), в котором птенцы оперяются и покидают гнездо	35–40 [8] 25–32 [9] 24 – 32 [11] 30 [5]	-	-
-	-	Расчетное среднее потребление парой взрослых пустельг грызунов ( $2,6 \times 2 = 5,2$ в сутки [11]) за период инкубации (29 суток) и выкармливания птенцов (28,6 суток) плюс потребление грызунов выводком птенцов ( $2,66 \times [6]$ ) за период нахождения в гнезде (28,6 суток), особей	428,82

с большей специализацией на мышевидных грызунах, по сравнению с кобчиком, дербником и степной пустельгой, охотится практически все светлое время суток. В степях Оренбургской области кормовую базу обыкновенной пустельги в гнездовой период составляют такие массовые, доступные виды грызунов, как обыкновенная полевка *Microtus arvalis*, степная мышовка *Sicista subtilis*, степная пеструшка *Lagurus lagurus*, лесная и домовая *Mus musculus* мыши (мышевидные грызуны), а также малый суслик *Spermophilus pygmaeus*.

В таблице 1 показаны объемы потребления грызунов одной пустельгой, парой пустельг, семьей пустельг и расчетным количеством птиц. Расчетное количество из 65 особей, которые могли погибнуть на ЛЭП нефтегазового комплекса, потребляет за сутки не менее 170 грызунов. За сезон эти 65 птиц могут выловить около 9400 грызунов. Одна семья птиц (пара взрослых с птенцами) потребляет за гнездовой сезон не менее 428 грызунов (табл. 1).

В литературе имеются приблизительные данные о размере вреда, который могут наносить грызуны урожаю зерна. Например, потери урожая зерна при численности около 100 полевок на 1 га составляют около 50% [1]. Легко увидеть, что даже 1 семья пустельги, потребляющая за сезон не менее 400 грызунов, могла бы спасти большую часть урожая от выедания грызунами, в первую очередь мышевидными.

Закключение. Ущерб сельскому хозяйству в результате деятельности нефтегазового промысла может быть выявлен в том числе через оценку объема полезных для сельского хозяйства птиц, погибших на линиях электропередач, и оценку спасенного ими урожая сельскохозяйственных посевов от уничтожения грызунами. Обыкновенная пустельга – одна из главных уничтожителей вредных грызунов, поедающих урожай зерна – гибнет наиболее массово на ЛЭП. Расчетное количество из 65 особей, которые могут погибнуть на ЛЭП нефтегазового комплекса, потребляют за сутки не менее 170 грызу-

нов. За сезон эти 65 птиц могут выловить около 9400 грызунов. Одна семья птиц (пара взрослых с птенцами) потребляет за гнездовой сезон не менее 428 грызунов. Одна семья пустельги, потребляющая за сезон не менее 400 грызунов, могла бы спасти большую часть урожая от выедания грызунами, в первую очередь мышевидными.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-05-00122А, №ГР ААА-А-А20-120011390069-6), а также в рамках гос. задания ИС УРО РАН (№ГР АААА-А21-121011190016-1).

#### Список литературы:

1. Беляев И. М. Вредители зерновых культур. – Издательство «Колос». – Москва, 1974. – 284 с.
2. Гаврилов Э.И., Гаврилов А.Э. Птицы Казахстана (сокращенное издание). – Алматы, 2005, (англ.). Tethys Ornithological Research. – Vol. 2. – 2005. – 226 p.
3. Галушин В.М. Хищные птицы. – Москва: Лесная промышленность, 1970. – 158 с.
4. Ермолаев А. И. Обыкновенная пустельга (*Falco tinnunculus*, *Falconiformes*, *Falconidae*) в колониальных поселениях грача (*Corvus frugilegus*, *Passeriformes*, *Corvidae*) в степных экосистемах долины Маныча // Зоологический журнал, 2016. – Т. 95. – № 4. – С. 440–446.
5. Коровин В. А., Воронин А. П., Сулова Т. А. Пустельга *Falco tinnunculus* в степном Зауралье // Русский орнитологический журнал, 2003. – С.: 275–276.
6. Ленёва Е. А.. Распространение, биология и охрана мелких соколов в степях Южного Урала. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.08 – зоология. – Москва, 2007. – 23 с.
7. Ленёва Е. А.. Суточные изменения численности и доступности добычи мелких соколов в степях Южного Урала // Зоологический журнал, 2011. – Т. 90. – № 9. – С. 1141–1145.
8. Птицы Волжско-Камского края. Неворобьиные. – Москва: «Наука», 1977. – 296 с.
9. Родимцев А. С. Экология размножения обыкновенной пустельги *Falco tinnunculus* и ушастой совы *Asio otus* в агроландшафтах Кемеровской области // Русский орнитологический журнал, 2006. – Том 15. – Экспресс-выпуск 326. – С. 728–737.
10. Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справочник-определитель. – Екатеринбург: изд-во Уральского университета, 2001. – 608 с.
11. Geng R., Zhang X., Ou W., Sun H., Lei F., Gao W., Wang H. Diet and prey consumption of breeding Common Kestrel (*Falco tinnunculus*) in Northeast China // Progress in Natural Science, 2009. – Volume 19. – Issue 11. P. 1501–1507.
12. Korpimäki E, Norrdahl K. Numerical and functional responses of kestrels, short-eared owls, and long-eared owls to vole densities // Ecology, 1991. – 72: 814–26.