

Современные геолого-палеонтологические исследования

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-242-243

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В КАЙНОЗОЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

Берлигузин Максот Тыныштыкович

аспирант Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань

Ахмеденов Кажмурат Максотович

кандидат географических наук, проректор по научной работе и международным связям, ассоциированный профессор Западно-Казахстанского государственного университета им. Махамбета Утемисова, г. Уральск, Республика Казахстан

Якупова Джамиля Болатовна

аспирант Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань

Аннотация. В статье представлены данные о найденных ископаемых остатках позвоночных из отложений кайнозоя на территории Западного Казахстана.

Ключевые слова: позвоночные, кайнозой, Западный Казахстан.

PALEONTOLOGICAL FINDINGS OF LARGE MAMMALS IN THE CENOZOIC IN WESTERN KAZAKHSTAN

Berliguzhin Maxot Tynyshtykovich

Postgraduate student of the Kazan Federal University, Kazan

Ahmedenov Kazhmurat Maksotovich

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor of Makhambet Utemisov West Kazakhstan State University, vice-rector for research and international relations, Uralsk

Yakupova Jamilya Bolatovna

Postgraduate student of the Kazan Federal University, Kazan

Abstract. The article presents data on the found fossils of vertebrates from the Cenozoic sediments in the territory of Western Kazakhstan.

Keywords: vertebrates, cenozoic, western Kazakhstan.

Позднекайнозойская фауна включает виды копытных млекопитающих, существовавших в среднем и позднем плиоцене, плейстоцене (антропогене) и голоцене. Первые научные сведения о находках костей плейстоценовых животных по копытным в пределах Казахстана относятся к XVIII в. По литературным данным, наличие остатков крупных ископаемых животных на р.Урал было известно еще со времен путешествия П.С.Палласа (1786), указывавшего, что кости первобытных бизонов и мамонтов часто вымываются из берегов р.Урала в районе селения Индерска. До 1917 г. в Казахстане находки плейстоценовых остатков по копытным носили случайный характер, научных сообщений было мало, однако известно, что уже в то время были найдены отдельные элементы непарно- и парнокопытных:

сибирского эласмотерия (Черский, 1891), шерстистого носорога, лошади, северного оленя, гигантского оленя, лося, зубра и первобытного тура (Штукенберг, 1900).

Первоначальные данные по изучению позднекайнозойских копытных на территории Казахстана опубликовали В.А.Теряев (1929), Ю.А.Орлов (1930), Н.Г. Кассин (1931), В.И. Громова (1932, 1935), Е.И. Беляева (1935), В.И. Громов (1948), Н.К. Верещагин и И.М. Громов (1952), Н.И. Бурчак-Абрамович (1953) и др. [3].

Систематические исследования по палеонтологии и в Казахстане были начаты в 1946 году; по инициативе К.И.Сатпаева и В.С.Бажанова, организована лаборатория палеобиологии в Институте зоологии АН КазССР. Казахстанскими палеонтологами было открыто и исследовано свыше 50 мест находок ископаемых животных и растений: Акеспе (Северный Арал), Шынтусай, Караторгай, Шалкар тениз, Кушик (Тургайская ложбина), Мын ески суйек, Кызылкия, Шах-шах, Жайрем, Асказансор (Центральный Казахстан), «Гусиный перелёт», Жайсанская впадина и другие. В них найдены остатки свыше 600 видов позвоночных вымерших животных, выявлены важнейшие этапы их развития [1; 4].

Ископаемые остатки животных в западной части Казахстана найдены учеными России и Казахстана в различные периоды их существования. В Актюбинской области близ п. Сегизсай сотрудниками историко-краеведческого музея (1981) был найден *Perissodactyla: Elasmotherium sibiricum* Fisch. (определение Бурчак-Абрамовича). Коллекция из данного местонахождения хранится в историко-краеведческом музее г.Актюбинск. Возраст находки относится к кайнозую (ранний неоплейстоцен).

В Мангистауской области близ полуострова Мангышлак, 25 км на восток от форта Александровского, Ханга-баба, при рытье колодца, на глубине 4 м Т.И. Серегиним в 1921 г. был найден *Proboscidea: Mastodon arvernensis* Cr. et Job. Коллекция из данного местонахождения хранится в Палеонтологическом институте РАН (Москва). Возраст находки относится к кайнозую (эоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области близ устья р. Урал М.В. Павловой был найден *Perissodactyla: Elasmotherium sibiricum* Fischer (определение Павловой). Коллекция из данного местонахождения хранится в музее МГРН (г. Москва). Возраст находки относится к кайнозую (ранний неоплейстоцен).

В Актюбинской области близ ст.Каир В.С.Бажановым и М.Д. Бирюковым найден *Proboscidea: Archidiskodon trogontherii* Pohlig (определение К. Жылкибаева). Хранится в институте зоологии МОН РК лаборатории палеозоологии. Возраст находки относится к кайнозую (ранний неоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области близ пос. Желаяево, Щапова и Январцево К.Ж. Жылкибаевой найден Proboscidea: Archidiskodon wusti (Pawlov) (определение К.Ж. Жылкибаева). Возраст находки относится к кайнозою (ранний неоплейстоцен). Хранится в Институте зоологии МОН РК лаборатории палеозоологии.

В Западно-Казахстанской области на р. Урал, близ Жемчужного яра, “Малые пески” К.Ж. Жылкибаевой найден Archidiskodon wusti (Pawlov) (определение К.Ж. Жылкибаева); Perissodactyla: Elasmotherium sibiricum Fisch. (определение Б.С. Кожамкуловой). Возраст находки относится к кайнозою (ранний неоплейстоцен). Хранится в Институте зоологии МОН РК лаборатории палеозоологии.

В Западно-Казахстанской области на р. Урал, близ Жемчужного яра, “Малые пески” К.Ж. Жылкибаевой (1977) найден Proboscidea: Archidiskodon wusti (Pawlov) (определение К.Ж. Жылкибаева); Perissodactyla: Elasmotherium sibiricum Fisch. (определение Б.С. Кожамкуловой). Коллекция из данного местонахождения хранится в Институте зоологии МОН РК. Возраст находки относится к кайнозою (эоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области на р. Урал, близ пос. Щапова палеозоологом Института зоологии МОН РК К.Ж. Жылкибаевой (1977) найден Proboscidea: Mammuthus chosaricus, Mammuthus primigenius (определение Жылкибаева); Perissodactyla: Equus caballus fossilis, E. hemionus, Coelodonta antiquitatis; Artiodactyla: Camelus knoblochi, Cervus elaphus, Bison sp., Bos sp., Saida tatarica; Carnivora: Homo sapiens (определение Кожамкуловой). Коллекция из данного местонахождения хранится в Институте зоологии МОН РК. Возраст находки относится к кайнозою (средний неоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области на р. Урал, Большие пески (62 км южнее пос. Богатого) палеозоологом Института зоологии МОН РК К.Ж. Жылкибаевой (1977) найден Proboscidea: представитель рода Mammuthus; Perissodactyla: Equus caballus fossilis, Equus hemionus, Equus hydruntinus, Coelodonta antiquitatis; Artiodactyla: Camelus knoblochi, Camelus sp., Megaloceros giganteus giganteus, Cervus elaphus, Alces alces, Rangifer tarandus, Bison priscus gigas, Bison priscus megiator, Saida tatarica, Gazella subgutturosa, Ovis ammon; Carnivora: Felis spalaea, Spelacarcos rossicus, Meles meles, Homo sapiens (определение Кожамкуловой). Коллекция из данного местонахождения хранится в Институте зоологии МОН РК. Возраст находки относится к кайнозою (средний-поздний неоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области на р. Урал, Малые пески (Нижне-найский перекарт) палеозоологом Института зоологии МОН РК К.Ж. Жылкибаевой (1977) найден Proboscidea: Mammuthus primigenius, представитель рода Mammuthus; Perissodactyla: Equus caballus fossilis, Equus hemionus, Equus hydruntinus, Equus sp., Coelodonta antiquitatis; Artiodactyla: Camelus knoblochi, Camelus sp., Sus scrofa, Megaloceros giganteus giganteus, Cervus elaphus, Cervus pygargus, Alces alces, Bison priscus gigas, Bison priscus megiator, Bos primigenius, Saida tatarica, Gazella subgutturosa, Ovis ammon; Carnivora: Homo sapiens (определение Б.С. Кожамкуловой). Коллекция из данного местонахождения хранится в Институте зоологии МОН РК. Возраст находки относится к кайнозою (средний-поздний неоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области на р. Урал, у затона г. Уральска палеозоологом Института зоологии МОН РК К.Ж. Жылкибаевой (1977) найден Proboscidea: Archidiskodon wüsti, Pawlov. Коллекция из данного местонахождения хранится в Институте зоологии МОН РК. Возраст находки относится к кайнозою (эоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области на р. Урал, у пос. Владимировка палеозоологом Института зоологии МОН РК К.Ж. Жылкибаевой (1977) найден Perissodactyla: Equus caballus fossilis, Equus sp., Equus hemionus, Coelodonta antiquitatis; Artiodactyla: Camelus knoblochi, Cervus elaphus, Alces alces, Megaloceros giganteus giganteus, Bison priscus gigas, Bison priscus mediator, Bison sp., Bos primigenius; Carnivora: Canis lupus (определение Кожамкуловой). Коллекция из данного местонахождения хранится в Институте зоологии МОН РК. Возраст находки относится к кайнозою (средний неоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области возле левого берега р. Урал, пос. Дарьинск Н.К. Верещагиной, Н.М. Парфеновой, В.А. Фокановой (1953) найден Proboscidea: archidiskodon wüsti (по определению Верещагина Elaphas trogontherii); Perissodactyla: Elasmotherium sibiricum Fisch. (определение Верещагина). Коллекция из данного местонахождения хранится в Институте зоологии МОН РК. Возраст находки относится к кайнозою (ранний неоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области на левом берегу р. Урала, пос. Дарьинск Н.К. Верещагиной, Н.М. Парфеновой, В.А. Фокановой (1953) найден Proboscidea: archidiskodon wüsti (по определению Верещагина Elaphas trogontherii); Perissodactyla: Elasmotherium sibiricum Fisch. (определение Верещагина). Коллекция из данного местонахождения хранится в ЗИН РАН. Возраст находки относится к кайнозою (эоплейстоцен).

В Западно-Казахстанской области в 12 км северо-западнее Индерского озера М.В. Павловой (1939) был найден Perissodactyla: Elasmotherium sibiricum Fisch. (определение Дампеля). Возраст находки относится к кайнозою (эоплейстоцен) [2].

Фундаментальные научные исследования позволяют собрать полную информационную базу данных по палеонтологическому наследию из отложений кайнозоя Казахстана. Коллекционные материалы, собранные из этих местонахождений являются национальным достоянием страны. В связи с этим назрела необходимость провести работу по сбору банка данных по изученным местонахождениям с ископаемыми остатками позвоночных из отложений кайнозоя на территории Западного Казахстана за прошедшие столетия.

Перспективность исследований очевидна, поскольку недра Казахстанской земли на палеонтологические открытия практически неисчерпаемы.

Список литературы:

1. Ископаемые животные. – Казахстан. Национальная энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – № 2 – ISBN 9965-9746-3-2.
2. Каталог кайнозойских млекопитающих Казахстана. / П.А. Тлеубердина, Б.С. Кожамкулова, Г.С. Кондратенко. – АН КазССР, Ин-т зоологии. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1989. – 157 с.; ISBN 5-628-00480-4.
3. Позднекайнозойские копытные Казахстана. Б.С. Кожамкулова // Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1981. – С. 3–6.
4. Палеонтология. Казахстан. Национальная энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2006. – № 4. – ISBN 9965-9908-6-7.