

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-25-26

ЛИШАЙНИКИ КАК ОБЪЕКТЫ БИОИНДИКАЦИИ

Бородина Екатерина Владимировна,

магистрант естественно-географического факультета Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. В статье рассматриваются виды, формы и методы биоиндикации, а также организмы, которые могут быть использованы для оценки качества окружающей среды.

Ключевые слова: биоиндикация, биоиндикаторы, биотестирование.

LICHES AS OBJECTS OF BIOINDICATION

Borodina Ekaterina Vladimirovna

Masters student of the Faculty of Natural Geography of the Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk

Abstract. This article deals with the kinds, forms and methods of bioindication. It is also concerned with the organisms that can be used for the quality assessment of the environment.

Keywords: bioindication, bioindicator, biotesting.

Загрязнение окружающей среды – одна из главных проблем, связанная с возрастанием антропогенного влияния на природу. В ходе активной хозяйственной деятельности человек привносит различные компоненты, нарушающие баланс всех сред, с которыми эта деятельность связана. Для выявления изменений окружающей среды используют два принципиально разных подхода: физико-химический и экологический. Первый метод предполагает привлечение разнообразных приборов, которые дорого стоят, сложны в эксплуатации, а второй основан на наблюдениях за живыми организмами, которые реагируют на загрязнение определенным образом. Важнейшей частью экологического мониторинга окружающей природной среды является биомониторинг – система наблюдений, оценки и прогноза различных изменений в биоте, вызванных факторами антропогенного происхождения. Биомониторинг делает возможной оценку качества

среды и является одним из уровней последовательного процесса изучения здоровья экосистемы. Основной задачей биологического мониторинга является наблюдение за уровнем загрязнения биоты с целью разработки систем раннего оповещения, диагностики и прогнозирования. Биологический метод оценки развивается в рамках направления, получившего название «Биоиндикация».

Цель работы: Ознакомление с понятием «Биоиндикация», ее методами и видами, общими понятиями в использовании методов биоиндикации и биотестирования.

В настоящее время биоиндикацию определяют как оценку состояния среды с помощью живых объектов. Живые объекты (или системы) – это клетки, организмы, популяции, сообщества. С их помощью может проводиться оценка как абиотических факторов (температура, влажность, кислотность, соленость, содержание ядовитых веществ и т. д.), так и биотических (благополучие организмов, взаимное влияние, их популяций и сообществ) [1].

Биоиндикаторами воздуха могут быть мхи и лишайники. Их физические качества сильно меняются в зависимости от условий произрастания.

На территории города Ульяновска для оценки уровня загрязнения воздуха целесообразно использовать лишайники, поскольку они распространены повсеместно, а реакция на загрязнение у них ярко выражена и ее легко проследить, изучая изменение численности и видового состава.

Чувствительность лишайников к загрязнению воздуха определяется: их симбиотической природой; большой абсорбционной поверхностью (все вещества, включая газообразные и растворенные в воде поллютанты, поглощаются всей поверхностью таллома); высокой гидрофильностью; средой обитания (осадки, стекающие по стволу, содержат значительно более высокие концентрации поллютантов, чем осадки на открытых местах); длительностью жизни [2; 3; 4].

В Ульяновске обитают различные виды лишайников, среди которых встречаются устойчивые (полеотолерантные) к городской среде и неустойчивые. Выявлена зависимость между загрязнением воздуха отходами промышленных



Рис. 1. Виды лишайников (1- ксантония настенная, 2 – фиссия звездчатая, 3 – леканора разнообразная).

производств (серным диоксидом, окислами азота, соединениями фтора и т. п.) и видовым разнообразием лишайников: чем выше уровень загрязнения воздуха, тем менее богата их флора. Наиболее устойчивы к загрязнению некоторые виды: *Xanthoria*, *Physcia*, *Lecanora* (рис. 1) и др.

Напротив, кустистые лишайники вида *Usnea filipendula* растут только в местах с очень высоким качеством воздуха.

Биоиндикация – это оценка состояния окружающей среды по реакции живых организмов, которая может производиться, как путем наблюдения за объектами, характерными для выбранного региона, так и за специально помещенными в среду организмами (биотестирование). Одним из перспективных объектов

биоиндикации являются лишайники, поскольку они наиболее чувствительны к изменению химического состава воздуха вследствие антропогенного воздействия.

Список литературы:

1. Ляшенко О.А. Биоиндикация и биотестирование в охране окружающей среды: учеб. пособие. – СПб.: Издательство СПб ГТУРП, 2012.
2. Афанасьев Ю.А. Мониторинг и методы контроля окружающей среды: учеб. пособие. – М.: Издательство МНЭПУ, 2001.
3. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины. – М.: Издательство «Просвещение», 1998.
4. Лишайники как биоиндикаторы загрязнения атмосферного воздуха. – Режим доступа. – URL: <https://articlekz.com/article/16114> (дата обращения 22.01.2022).