

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-233-235

## ФОМИРОВАНИЕ БЕРЕГОВ КОЛЫМСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЛИФЛЮКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДЕГРАДАЦИИ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ

**Дряхлов Александр Григорьевич**

кандидат географических наук, доцент Дальневосточного Федерального университета, г. Владивосток

**Аннотация.** В статье рассматривается формирование и развитие берегов в условиях многолетней мерзлоты в районе строительства Колымских ГЭС.

**Ключевые слова:** берег, водохранилища, склоновые процессы, мерзлота.

### FORMATION OF THE SHORES OF KOLYMA RESERVOIRS AND DYNAMICS OF DEVELOPMENT, SOLIFLUCTION PROCESSES UNDER THE INFLUENCE OF PERMAFROST DEGRADATION

**Dryakhlov Alexander Grigorievich**

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor of the Far Eastern Federal University, Vladivostok

**Abstract.** The article discusses the formation and development of the shores in permafrost conditions in the area of construction of the Kolyma hydroelectric power plants.

**Keywords:** shore, reservoirs, slope processes, permafrost.

Создание крупного водохранилища на р. Колыме изменило природную гармонию экзогенных геологических, геоморфологических и др. процессов в регионе. Как известно, с момента создания водохранилища его гидрологический режим, морфометрические характеристики отличаются от естественных водоемов. Образование Колымских водохранилищ нарушило естественный ход формирования береговых склонов. Начинается бурная перестройка берегового рельефа. Заполнение водохранилища произошло практически «мгновенно» и сразу же стало отчетливо видно несоответствие уровня режима водоема и вновь образовавшихся берегов.

Формирование берегов водохранилищ - это сложный геологический процесс, протекающий в конкретной физико-географической и геологической обстановке, который заключается в береговом разрушении, смыве определенной площади старых берегов, но и в процессах аккумуляции. При этом происходит формирование нового устойчивого профиля равновесия надводных и подводных частей берегового склона различными геологическими процессами и создается новый подводный рельеф дна водохранилища. Уровневый режим водоема обуславливает специфическую гидрогеологическую обстановку на его побережьях.

Гидрогеологическая ситуация и режим подземных вод играют очень большое значение при процессах. Так, развитие в береговых обрывах водохранилища многочисленных водоносных горизонтов, выходящих выше

и ниже уреза воды, способствует разрушению берегового склона. Увеличивается вес породы, понижается прочность, образуются оползни и оплывины. Выходы напорных вод в виде восходящих источников в зоне прибрежных отмелей способствуют разрыхлению породы и легкому смыву ее волнами. Осенняя и зимняя сработка уровня водохранилища, а затем сравнительно быстрое весеннее наполнение, вызывают смену и резкое изменение гидростатического давления воды на грунт. Увеличивается наклон зеркала подземных вод и возрастает скорость движения. Происходит суффозионный вынос грунта, образование оползней. Овражную эрозию склонов и прибрежных отмелей в период сработки уровня и активного снеготаяния в большой мере обуславливает нерусловой поверхностный сток. Очень большую роль играют подземные воды при процессах выщелачивания. Оно в значительной мере увеличивается в связи с поступлением в массив пресных агрессивных вод. Выщелачивание легкорастворимых солей кальция и др. нарушает структуру пород, способствует оплыванию породы и разрушению берега даже при полном отсутствии волнения.

Таким образом, общие закономерности развития береговых склонов на водохранилищах определяются их уровненным и ветра волновым режимом, климатическими условиями и неотектоническими движениями [4, 5].

Конкретные закономерности формирования склонов обусловлены литологией слагающих пород и генетическим типом берегов. Берега Колымских водохранилищ очень молоды. Для них характерны следующие общие черты: невыработанность берегового профиля, крутой подводный береговой склон и своеобразный барьер из затопленных деревьев, ослабляющих волновое воздействие.

По характеру современных геоморфологических процессов, формирующих облик береговых склонов водохранилища, было выделено четыре типа берегов: денудационный, абразионно-денудационный, наледный и техногенный. Денудационный тип резко преобладает над остальными типами берегов Колымского водохранилища, занимая 94,2% протяженности береговой линии. Денудационные крутые щебнисто-глыбовые берега образовались при затоплении крутых горных склонов, сложенных делювиально-коллювиальными отложениями. Сосредоточены в восточной части водохранилища и занимают две трети береговой линии. Поверхность склонов занята площадными курумами с разреженным покрытием растительности в виде листовенничного редколесья и групп кустарника. Денудационные пологие галечно-песчаные с густым лесом берега образовались при затоплении склонов речных и водно-ледниковых террас. Приурезовая полоса шириной до нескольких сотен метров занята затопленным лесом.




Рис. 1. Типы берегов Колымского водохранилища.

Абразионно-денудационный - единственный тип берегов Колымского водохранилища обусловленный своим возникновением разрушительной силой волн. Занимает всего 1% береговой линии водохранилища, находится на левом берегу. Интенсивный размыв берега во многом обусловлен рыхлостью слагающих отложений, представленных гравийно-галечной толщей с песчаным заполнителем. Этот тип берега отличает хорошо выработанный уступ размыва высотой 1–3 м. В результате абразии нижняя часть берегового склона до 12 м над урезом воды, примыкающая к уступу размыва, лишилась дернового горизонта вместе с растущими на нем деревьями. Последние сползли в водохранилище.

На Колымском водохранилище, в условиях выхода к урезу воды курумов, широкое развитие имеет лишь термокарстовый вид. Для территории характерна значительная насыщенность льда с водной массой, которая способствует просадкам грубообломочного чехла вследствие вытаивания льда [1]. Наледный тип берегов образовался при затоплении обширной наледи в долине (занимает 1% береговой линии водохранилища). Техногенный тип берегов образовался при затоплении склонов строительных насыпей и отсыпок дорог в приплотинной части водохранилища. Береговые склоны обычно крутые ( $20-30^\circ$ ), сложены незакрепленными остроугольными глыбами со щебнем и дресвой. Высота склонов колеблется от нескольких метров до нескольких десятков метров [2].

В формировании преобладающего денудационного типа крутых щебнисто-глыбовых берегов Колымского водохранилища важнейшую роль играет процесс денудации, многолетняя мерзлота, как результат подтопления склонов водами водохранилища, который приводит к солифлюкционным разрушениям (рис. 1). Здесь происходит разрушение берегов, транспортировка материала и его аккумуляция.

Изучение морфологического строения протаявших почв показало, что торфянистые ретинизированно-гумусовые, наиболее характерные для исследуемого района, почвы имеют мощный профиль (1,5–1,8 м), большая часть которого находится в мерзлотном состоянии и лишь 40–60 сантиметровая толща в естественных ус-

ловиях в летний период протаивает, т. е., многолетняя мерзлота стабильна.

В отличие от стабильного положения многолетней мерзлоты в почвах района на крутых денудационных берегах водохранилища идет процесс ее деградации. Почвенная масса протаивает от контакта с водой, и протаивание идет снизу вверх. Подобными процессами затронуты крутые денудационные берега почти на всем протяжении береговой линии. Из полученных наблюдений следует, что прибрежная полоса шириной до 5 м почв крутых склонов в результате подтопления водами водохранилища подтаивает до глубины 2 м. В ходе протаивания почвенно-грунтовая масса вместе с растительным покровом и площадным курумом (1–1,5 м) оползает в воды водохранилища. За пределами прибрежной полосы в почвах, не подверженных активному влиянию вод, мерзлота находится на глубине 30–50 см. По мере разрушения почвогрунтов на склонах прибрежной части складываются благоприятные условия для разрушения почв, лежащих выше по склонам гор, под воздействием теплых масс воздуха в летний период, что способствует развитию солифлюкционных, термоэрозионных явлений. Так, например, наблюдалось оползание этой пятиметровой полосы почвогрунтов полностью в водохранилище и образование новой системы трещин и ниш в почве выше по склонам; протаивание почв на глубины 1,5–2,2 м и их смещение вниз по склону, где происходит увеличение зоны разрушения берегов в ширину и глубину. Левый берег водохранилища подвергся интенсивной эрозии. Ширина эрозионной полосы составляет в нижней части 20 м длина более 250 м, в верхней части разделяется на два языка выноса материала шириной 5–10 м.

На правом берегу происходит образование ниш, пещер, различных полостей, визуально прослеживаются солифлюкционные смещения протаявшей почвогрунтовой массы в сторону водохранилища. Длина оползневых отвалов достигает 11–15 м, глубина ниш 2,5–3 м, ширина ниш 4 м, высота ниш 3 м. В провалах и нишах встречаются массивы чистого льда высотой 3 м, шириной 2 м. Вместе с почвой и грунтом происходит оползание в водохранилище густого растительного покрова.

Отдельные блоки оторванного почвенного растительного покрова достигают размеров 2,5 м, происходит отсекание и обрушение таких блоков, т. е. блок породы, подрезанных снизу нишей и отчлененный от коренного массива трещиной, падает в воду и дробится на куски различных размеров. Таким образом, главным фактором, который необходимо учитывать при прогнозировании развития берегов водохранилищ на территории с многолетнемерзлыми породами, является тепловая переработка берегов. Очевидно, что при положительной температуре воды берег, сложенный чистым льдом, будет отступать беспредельно. Берег, сложенный породами, не содержащими льда, совершенно не подвержен тепловой переработке,

Таким образом, цикл разрушения берегов состоит из нескольких стадий. На стадии подготовки происходит выработка ниш и раскрытие трещин в результате деградации многолетней мерзлоты. На стадии обрушения происходит формирование глыбовых обвалов и образование блоков оседания. На стадии транспортировки происходит размыв и частичное растворение обвалившегося материала.

При разрушении почв ежегодно в водохранилище смещается порядка 7500 м грунта на километровом отрезке, ежегодно поступает от 240 до 320 кг/м песка и глины. По мере разрушения почв и смещению ее массы в воды водохранилища существенно трансформируется экологическая обстановка как самого водохранилища, так и реки Колымы в целом, в силу того, что почвы кислые, содержат много недоокисленных продуктов разложения растительных остатков. На их окисление расходуется кислород, что приводит к нежелательному снижению его содержания в воде. Вынос почв и горных пород приводит к тому, что создаются условия, нарушающие устойчивость горных пород на территории побережья. Изменяется инженерно-геологическая обстановка, затрудняется промышленное и гражданское строительство на таких участках.

Наиболее стабильно сохраняют свои склоны низкие берега затопления, в основной части денудационные пологие галечно-песчаные берега. Так как берега сложены алеврито-песчаными и галечно-гравийно-песчаными грунтами, то в надводной части развиваются подтопление и заболачивание, а в подводной - аккумулятивные формы рельефа. Вода, обладая большими запасами энергии, разрушает берега механически и химически.

Рассмотрев материалы о процессе формирования геотехнических систем в условиях многолетней мерзлоты, можно сделать следующие выводы. Многолетняя мерзлота оказывает воздействие на процесс создания и эксплуатации водохранилища. Климат исследуемой территории резко-континентальный и суровый. Для исследуемой территории характерно большое разнообразие геолого-географических условий, и, следовательно, резкая изменчивость температурного поля и мощности многолетнемерзлых пород.

Мощность мерзлоты здесь изменяется в больших пределах от 100 до 200 м. Температура мерзлых пород на глубине 20–30 м, где годовые колебания температур отсутствуют, изменяется в пределах от -2-6°C. В пределах описываемой территории выделяется три типа многолетней мерзлоты: а) древняя, сформировавшаяся в период последнего оледенения; б) постледниковая; в) современная. Из-за насыщения водой слоя оттаившей мерзлоты усилились явления солификации, склоновой эрозии и движения курумов, что вызывает переформирование берегов водохранилища. На исследуемой территории возросло антропогенное воздействие. Создание и эксплуатация Колымского водохранилища являются частью этого воздействия. Вполне очевидно, что подобные изменения метеоэлементов, глубины сезонного оттаивания грунтов в прибрежной зоне находятся в пределах амплитуды вековой изменчивости не вызовут изменения мощности переходного слоя и активизации криогенных процессов. Из характеристики непосредственного и опосредованного воздействия водной массы следует, что масштабы экологического воздействия водохранилища будут определяться собственно разрушением геологического субстрата при переработке береговой полосы и влиянием подпора в пределах СТС.

#### **Список литературы:**

1. Говорушко С.М. Курумовый морфолитогенез / С.М. Говорушко. – Владивосток, 1986 – 115 с.
2. Дряхлов А.Г. Некоторые вопросы влияния водохранилища Колымской ГЭС на окружающую среду // Круговорот вещества и энергии в водоемах: Материалы докладов 4-го Всесоюз. лимнологического совещания. – Иркутск, 1985. – Водные экосистемы. – Вып. 4. – С. 30–32.
3. Дряхлов А.Г., Пшеничников, Б.Ф. Антропогенные изменения почв в районе строительства Колымской ГЭС // Научные и практические основы управления техническим состоянием ангарских водохранилищ. – Братск, 1984. – С. 57–58.
4. Печеркин И.А. Геодинамика побережий камских водохранилищ. – Пермь, 1966. – Т. 1. – 198 с.
5. Печеркин И.А. Геодинамика побережий камских водохранилищ. – Пермь, 1969. – Т. 2. – 308 с.