

# Геоэкологические исследования водных объектов и охрана их биоразнообразия

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-128-130

## БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГУСТЕРЫ *BLICCA BJOERKNA* (LINNEUS, 1758) ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ВОЛЖСКОГО ПЛЕСА КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

### Глазунова Глория Филипповна

студентка Института Фундаментальной Медицины и Биологии Казанского Федерального университета, г. Казань

### Гайфутдинова Ильясия Фаннуровна

студентка Института Фундаментальной Медицины и Биологии Казанского Федерального университета, г. Казань

### Галанин Игорь Федорович

кандидат биологических наук, доцент Казанского федерального университета, г. Казань

**Аннотация.** В статье рассматривается состояние густеры в условиях верховой Волжского плеса Куйбышевского водохранилища за период 2009-2019 гг.

**Ключевые слова:** густера, Куйбышевское водохранилище.

## BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WHITE BREAM *BLICCA BJOERKNA* (LINNEUS, 1758) IN THE UPPER PART OF THE VOLZHSKY SECTION OF THE KUIBYSHEV WATER RESERVOIR

### Glazunova Gloria Filippovna

student of the Institute of Fundamental Medicine and Biology of Kazan Federal University, Kazan

### Gayfutdinova Ilsa Fannurovna

student of the Institute of Fundamental Medicine and Biology of Kazan Federal University, Kazan

### Galanin Igor Fedorovich

Candidate of biological Sciences, Associate Professor of Kazan Federal University, Kazan

**Abstract.** The article describes the state of the White bream in the upper reaches of the Kuibyshev reservoir in the period from 2009 to 2019.

**Keywords:** White bream, Kuibyshev reservoir.

Наблюдение за состоянием промысловых видов рыб – необходимое условие их рационального использования. Густера *Blicca bjoerkna* (Linneus, 1758) является одним из массовых видов промысловых рыб Куйбышевского водохранилища – относительно молодого, динамично эволюционирующего реконструированного водоема. Значение этого вида в условиях водохранилища в последние десятилетия возросло. По данным 1973-2012 гг. густера составляет от 6,1% до 25,3% всего

вылова рыбы [5]. Результаты, представленные в государственном докладе Республики Татарстан 2017 года [2], также подтверждают высокий процент густеры от общего вылова. Густера конкурирует с более ценными видами рыб, например, с лещом *Abramis brama*. Целью данного исследования стала оценка ряда основных биологических показателей этого вида в условиях верховой Волжского плеса водохранилища в период 2017-2019 гг.

Для данной работы были использованы материалы контрольных уловов Казанского (Приволжского) федерального университета. В работе представлено сравнение данных последних трех лет исследований (2017-2019 гг.) с материалами уловов университета предыдущих лет (2013-2016 гг.), а также с опубликованными данными (2009-2012 гг.) [5]. Отлов производился в летне-осенний период (июль, сентябрь) в верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища с помощью набора ставных сетей с размерами ячеи 24-65 мм.

В период с 2013 по 2019 год было совершено 118 сетепостановок и было поймано 1632 особи густеры. С 2017 по 2019 год совершено 37 сетепостановок и поймано 172 особи. Первичная обработка материала проводилась по методике И.Ф. Правдина [9] для рыб семейства карповых (*Cyprinidae*). Возраст рыб определялся по спилам первых лучей спинного плавника и чешуе. Статистическая обработка производилась по руководствам Н.А. Плохинского [8], Г.Ф. Лакина [6] и П. Ю. Малкова [7] с использованием программы *Microsoft Excel Microsoft Office 2016*.

*Размерно-весовой состав густеры.* В пределах ареала максимальная зафиксированная длина тела густеры составляет 45,5 см [11]. По литературным данным в Волжско-Камском крае ее размеры достигали 30-35 см [3]. По материалам наших уловов 2017-2019 годов самая крупная особь густеры имела размеры 27 см. Показатель средней длины густеры был также невысок и составил 17,4 см, 17,1 см и 17,1 в 2017-2019 годах соответственно.

Исходя из размерного состава густеры (рис. 1) можно заключить, что основу уловов густеры по материалам 2017-2019 годов составляли особи размерных классов от 13 до 21 см. Более крупные и мелкие рыбы были представлены единично.

Обычно густера имеет массу не больше 1 кг [3].




Рис. 1. Размерный и весовой состав густеры в верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища по материалам контрольных уловов 2017-2019 годов.




Рис. 2. Размерный и весовой состав густеры в верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища по материалам контрольных уловов 2009-2019 годов.

Таблица 1.

Возрастной состав (%) уловов густеры в верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища за 2009-2019 гг.

Годы	Возраст, лет													
	2+	3+	4+	5+	6+	7+	8+	9+	10+	11+	12+	13+	14+	15+
2009	2,2	6,7	10,0	21,1	38,9	15,0	4,4	1,7	-	-	-	-	-	-
2010	-	1,5	5,2	23,9	19,4	36,6	11,2	2,2	-	-	-	-	-	-
2011	-	2,2	20,4	21,5	10,7	21,5	9,7	10,7	1,1	2,2	-	-	-	-
2012	3,8	36,1	10,0	25,0	9,1	11,5	2,0	2,0	0,5	-	-	-	-	-
2013	0,9	4,5	19,6	24,9	19,9	13,0	7,7	5,6	3,0	0,9	-	-	-	-
2014	1,0	8,7	11,1	15,9	30,9	17,4	9,2	4,8	1,0	-	-	-	-	-
2015	-	-	6,1	16,6	20,4	16,0	16,6	9,9	6,1	4,4	1,7	1,7	-	0,5
2016	-	1,7	5,8	26,7	17,5	10	19,1	15	2,5	1,7	-	-	-	-
2017	0,9	5,7	18,9	23,6	20,7	12,3	10,4	3,8	2,8	0,9	-	-	-	-
2018	-	5,3	26,3	36,8	15,2	15,2	-	2,6	2,6	-	-	-	-	-
2019	-	-	21,4	25	21,4	14,3	14,3	3,6	-	-	-	-	-	-

Однако известно, что густера бывает весом и в 1,25 кг [1]. Максимальный вес рыб из наших уловов был равен 615 г (рис. 1). Среднее значение массы густеры составило 153,3, 148,0 и 139,8 г в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно.

Если сравнивать с данными прошлых лет, за 1986-1999 гг. размерный состав уловов густеры [4] оказался выше результатов 2009-2012 годов [5]. Из представленного размерного и весового состава за десятилетний период (рис. 2) можно отметить, что минимальное значение длины равнялось 6 см, среднее колебалось от 15,5 до 17,4, а максимальное значение составило 30 см. Вес густеры варьировал от 10 г до 615

г. Среднее значение массы колебалось от 95 г до 153,3 г.

Несмотря на относительную устойчивость уловов густеры, в последние годы стабильно сохраняется тенденция уменьшения размерно-весовых показателей густеры, намечившейся еще в начале текущего столетия по сравнению с концом XXв.

Возрастная структура густеры. Максимальным возрастом для густеры считается 15 лет [10]. В уловах 2017-2019 гг. встречались особи в возрасте 11+ лет.

Анализ возрастного состава уловов густеры предыдущих исследований 2009-2016 гг. в верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища показывает, что наиболее массовыми в уловах того

периода были рыбы в возрасте 5-7 лет. Основная масса выловленных особей в период с 2017 по 2019 год была представлена рыбами от 4+ до 7+ (табл. 1).

Можно заключить, что сохраняется тенденция начала XXI века. Изменения возрастной структуры густеры в сторону омоложения, отмечаемое по нашим материалам относительно данных конца прошлого столетия, можно объяснить прессом вылова. Массовое созревание густеры происходит уже в возрасте 4+, поэтому большая часть уловов представлена половозрелыми особями.

Подытоживая все вышесказанное, можно заключить, что в верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища по материалам 2017-2019 годов основа уловов густеры представлена относительно некрупными особями с невысокими показателями массы. Это свидетельствует о том, что густера не реализует потенциальные возможности роста. Возрастная структура густеры, выловленной в 2017-2019 гг., варьирует от 3+ до 11+. Вылов этих лет базировался на относительно молодых особях в возрасте 4+ 5+ и 6+. Однако, благодаря раннему созреванию густеры в уловах преобладают половозрелые особи, что говорит об отсутствии опасений относительно состояния популяции данного вида в условиях верховий Волжского плеса Куйбышевского водохранилища.

#### Список литературы:

1. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / М.: Академия наук СССР, Т. 2. 1949. - С. 763-767.
2. Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2017 году». - С. 174-182.
3. Кузнецов В.А. Рыбы Волжско-Камского края. / Казань: Казанский государственный университет, 2005. - С. 116-118.
4. Кузнецов В.А. Размножение, размерно-возрастная структура и рост густеры *Blisca bjoerkna* верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища // Вопросы рыболовства. 2011. N 2 (46) С. 248-261.
5. Кузнецов В.А., Григорьев В.Н., Галанин И.Ф., Кузнецов В.В. Биологическая характеристика Густеры *Blisca bjoerkna* верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т.17., N 6. С. 23-26.
6. Лакин Г.Ф. Биометрия / Изд-во: М.: Высшая школа, 1990. 352 с.
7. Малков П.Ю. Количественный анализ биологических данных: учебное пособие / Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. 71 с.
8. Плохинский Н.А. Математические методы в биологии: учебн-метод. пособие для студентов биол. фак. ун-тов / М.: Изд-во МГУ, 1978. 265 с.
9. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных) Москва: изд-во «Пищевая промышленность» / 1966 г. С. 33.
10. Решетников Ю.С., Попова О.Л., Соколов Л.И., Цепкий Е.А. Атлас пресноводных рыб России / изд-во: Москва «Наука», 2002 г. С. 219-221.
11. Verreycken H., G. Van Thuyne and C. Belpaire, Length-weight relationships of 40 freshwater fish species from two decades of monitoring in Flanders Belgium, 2011. J. Appl. Ichthyol. 2011:1-5.