

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-11-13

## ИЗМЕНЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ВДОЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ПРОФИЛЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ МАЙДАН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### Гончаров Евгений Алексеевич

кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой экологии, почвоведения и природопользования Поволжского государственного технологического университета, г. Йошкар-Ола

### Булыгина Наталья Алексеевна

старший преподаватель кафедры экологии, почвоведения и природопользования Поволжского государственного технологического университета, г. Йошкар-Ола

### Арбузов Кирилл Владимирович

студент Института леса и природопользования Поволжского государственного технологического университета, г. Йошкар-Ола

**Аннотация.** В статье приводятся результаты оценки вклада техногенных и терригенных радионуклидов в формирование мощности дозы гамма-излучения для геосистем бассейна малой реки.

**Ключевые слова:** ландшафт, цезий-137, калий-40, радий-226, торий-232, мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.

### CHANGE OF RADIATION PARAMETERS ALONG A LANDSCAPE PROFILE IN THE MAJDAN RIVER POOL OF THE ULLYANOVSK REGION

### Goncharov Evgenii Alekseevich

Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Department of Ecology, Soil Science and Nature Management of the Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola

### Bulygina Natalya Alekseevna

Senior Lecturer, Department of Ecology, Soil Science and Nature Management of the Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola

### Arbuzov Kirill Vladimirovich

student of the Institute of Forestry and Nature Management of the Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola

**Abstract.** The article presents the results of assessing the contribution of technogenic and terrigenous radionuclides to the formation of the dose rate of gamma radiation for geosystems of the small river basin.

**Keywords:** landscape, cesium-137, potassium-40, radium-226, thorium-232, gamma radiation dose rate.

Радиационная обстановка на местности зависит от природных и антропогенных факторов. К природным факторам в первую очередь следует отнести геологическое строение и физико-географическое положение местности, а также атмосферные процессы; к антропогенным - перераспределение

и концентрирование природных радионуклидов в ходе добычи полезных ископаемых, применения минеральных удобрений, сжигания органического топлива и т.п., производство и использование техногенных радионуклидов, ядерные испытания и промышленные взрывы, деятельность предприятий ядерного топливного цикла, радиационные аварии и др.

**Цель работы** - оценить вклад техногенных ( $^{137}\text{Cs}$ ) и естественных (терригенных -  $^{40}\text{K}$ ,  $^{226}\text{Ra}$  и  $^{232}\text{Th}$ ) радионуклидов в формирование мощности дозы гамма-излучения в различных геосистемах реки Майдан.

### Задачи исследования:

- выполнить радиоэкологические исследования на ключевых участках, соответствующих основным геосистемам (ранга местности) вдоль ландшафтного профиля;
- установить распределение радионуклидов в почвенном профиле;
- оценить мощность дозы гамма-излучения и вклад в его формирование техногенных и терригенных радионуклидов в различных геосистемах.

**Объектом исследования** стал бассейн р. Майдан - приток р. Суры третьего порядка (рис. 1). Водосборный бассейн площадью 190 км<sup>2</sup> расположен в средней части Приволжской возвышенности и относится к району типичных лесостепных ландшафтов, который представлен глубоко расчлененной речной и овражно-балочной сетью двухъярусных плато. Максимальные высоты достигают 290 м, минимальные - 135 м (устье р. Майдан). Леса сохранились по возвышенным плато, уступам и балкам. Преобладающим типом почв являются серые лесные почвы: от светло-серых и темно-серых, в разной степени оподзоленных почв, до черноземов, также встречаются дерново-подзолистые почвы. Преобладающим фоновым видом природопользования на данной территории является сельское, а также лесное хозяйство.

Основными природными источниками формирования гамма-фона на исследуемой территории, связанными с местными ландшафтными условиями, являются терригенные радионуклиды  $^{40}\text{K}$ ,  $^{226}\text{Ra}$  и  $^{232}\text{Th}$ , причем  $^{226}\text{Ra}$  и  $^{232}\text{Th}$  в основном содержатся в минеральной части почв и почвообразующих породах, а  $^{40}\text{K}$ , как биофильный элемент, в существенном количестве также содержится в биоте. При этом значительный привнос  $^{40}\text{K}$  мог осуществляться на пахотных угодьях в составе калийных удобрений в период интенсивного сельскохозяйственного использования территории. По данным поквартального обследования 2002 г. Инзенской лабораторией радиационного контроля уровень загрязнения  $^{137}\text{Cs}$  лесных участков составлял 30-50 кБк/м<sup>2</sup> [1].




Рис. 1. Водосборный бассейн р. Майдан и объекты исследования.

**Методика исследования.** Проводились исследования на ключевых участках вдоль ландшафтного профиля: от водораздела до русла реки. Для этого профиль разбивался на участки, соответствующие геосистемам ранга местности. При этом учитывались: элементы рельефа, характер растительности, тип хозяйственного использования. Протяженность профиля составила 6,2 км, перепад высот 105 м (абсолютная высота начала профиля 280 м).

На ключевых участках проводилось измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (далее МЭД) на высоте 1 м портативным сцинтилляционным спектрометром МКС-01А «Мультирад» с ПО «Прогресс-Навигатор» (с исключением космического излучения – нулевой фон спектрометра составляет 0,004 мкЗв/ч) и отбор проб почвы. Отбор, пробоподготовка, измерение удельной активности радионуклидов  $^{137}\text{Cs}$ ,  $^{40}\text{K}$ ,  $^{226}\text{Ra}$ ,  $^{232}\text{Th}$  на стационарном гамма-спектрометре МКС-01А «Мультирад», расчет плотности загрязнения почвы  $^{137}\text{Cs}$  выполнялись в лаборатории радиационной экологии ПГТУ по методике, изложенной в [2].

Оценка вклада природных и техногенных радионуклидов в формирование дозы внешнего облучения человека, осуществлялась с помощью дозовых коэффициентов для  $^{40}\text{K}$  0,0417 нГр·кг/(Бк·ч),  $^{226}\text{Ra}$  0,461 нГр·кг/(Бк·ч),  $^{232}\text{Th}$  0,604 нГр·кг/(Бк·ч) [3-5], для  $^{137}\text{Cs}$  6 (мкЗв/год)/(кБк/м<sup>2</sup>) [6].

**Результаты и их обсуждение.** Ландшафтная характеристика и основные радиологические параметры ключевых участков приведены в табл. 1.

Таблица 1.  
Характеристика ключевых участков.

Ключевой участок (КУ), геосистемы (форма рельефа, ступень высот, растительность, почвы, геологическая основа)	МЭД, мкЗв/ч	Плотность загрязнения почвы $^{137}\text{Cs}$ кБк/м <sup>2</sup>
КУ 1 Водораздел, 275-280 м, производные березняки на серых лесных супесчаных почвах на элювиальных супесчаных отложениях	0,048	23,1

КУ 2 Пологий склон водораздела, 270-275 м, производные березняки с примесью осины на светлосерых супесчаных почвах на элювиально-делювиальных супесчаных отложениях	0,047	18,0
КУ 3 Пологий склон водораздела, 250-270 м, заброшенные сельхозугодья на черноземных суглинистых почвах на элювиально-делювиальных супесчаных отложениях	0,038	10,5
КУ 4 Денудационный уступ, 240-250 м, сосняки на серых лесных почвах на делювиальных отложениях	0,036	7,3
КУ 5 Пологий склон водораздела, 210-235 м, сельхозугодья на черноземных суглинистых почвах на элювиально-делювиальных суглинистых отложениях	0,042	4,8
КУ 6 Пойма р. Майдан, 172-177 м, ольшаники на аллювиальных дерновых почвах на современных аллювиальных отложениях	0,033	3,9

На рис. 2 приведены данные расчетов вклада в МЭД от терригенных и техногенных радионуклидов, содержащихся в почве ключевых участков.




Рис. 2 Вклад почвенных радионуклидов в формирование мощности дозы гамма-излучения (в %).

В ходе изучения характера распределения техногенных и природных радионуклидов в верхнем 20 см слое почвы установлено (табл. 2), что почвы практически не различаются по составу терригенных радионуклидов: содержание  $^{40}\text{K}$  составляет 300-400 Бк/кг,  $^{226}\text{Ra}$  10-21 Бк/кг,  $^{232}\text{Th}$  12-25 Бк/кг. При этом существенное увеличение калия (450-600 Бк/кг) отмечено на участке 5, который используется в настоящее время под пашню, что свидетельствует о применении калийных удобрений. При этом распределение по глубине природных радионуклидов носит равномерный характер.

87-97%  $^{137}\text{Cs}$  в лесных почвах (КУ 1, 2, 5) содержится в слое 0-15 см, на глубине 15-20 см его содержание не превышает 13% от общего запаса в почве, что обусловлено атмосферным поступлением загрязнителя и активным вовлечением его в биологический круговорот. На сельскохозяйственных землях содержание  $^{137}\text{Cs}$  распределено по всему почвенному слою 0-20 см вследствие обработки почвы, на пойменном участке содержание  $^{137}\text{Cs}$  минимально, он интенсивнее

мигрирует вглубь. Средние уровни поверхностного загрязнения почв  $^{137}\text{Cs}$  изменяются от 3,9-4,8 кБк/м<sup>2</sup> в пойме и на сельскохозяйственных участках в нижней части склона до 18,0-23 кБк/м<sup>2</sup> на лесных участках водораздела, что согласуется с данными предыдущих исследований [1].

Вклад в формирование МЭД техногенного почвенного  $^{137}\text{Cs}$  составляет от 8 до 33% (минимум в пойме, максимум на лесном участке водораздела). Вычитание вклада  $^{137}\text{Cs}$  позволяет определить естественный фон территории (без учета космогенного излучения): на открытых участках он составляет 0,030-0,031 мкЗв/ч, на лесных – 0,032-0,035 мкЗв/ч, различие связано с вкладом  $^{40}\text{K}$  в надземной фитомассе (главным образом древесной растительности). На участке 5 (обрабатываемое поле) привнос калия определяют повышение гамма-фона на 0,005-0,006 мкЗв/ч. В целом в рассмотренных геосистемах вклад в МЭД  $^{137}\text{Cs}$ ,  $^{40}\text{K}$ ,  $^{226}\text{Ra}$  и  $^{232}\text{Th}$ , содержащиеся в почве, с учетом неопределенности измерения составляет от 92 до 100%. На лесных участках около 8% МЭД формируется «непочвенной» компонентой ( $^{137}\text{Cs}$  и  $^{40}\text{K}$  надземной фитомассы).

#### Список литературы:

1. Конаков Д.Е. Накопление и перераспределение техногенных радионуклидов в лесных биогеоценозах Ульяновской области: дис. ... канд. с.-х. наук: 03.00.16 / Конаков Дмитрий Евгеньевич. – Йошкар-Ола, 2004. - 169 с.
2. Гончаров Е.А. Радиоэкологические исследования ландшафтов национального парка «Смольный» / Е.А. Гончаров, Н.А. Булыгина, С.Г. Васин // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия «Лес. Экология. Природопользование». - 2017. - № 4 (36). - С.66-81.
3. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. 1993 Report to the General Assembly, with annexes. N. Y.: United Nations, 1993. - 922 p.
4. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. 2000 Report to the General Assembly, with annexes. V. 1. Sources. N. Y.: United Nations, 2000. - 655 p.
5. Perevolotskiĭ A.N., Perevolotskaia T.V. About the contents of  $^{40}\text{K}$ ,  $^{226}\text{Ra}$  and  $^{232}\text{Th}$  in forest soils of the Republic of Belarus // Radiatsionnaya biologiya, radioecologiya / Rossijskaia akademiia nauk. - 2014. - Volume 54. Issue 2. - P. 193-200.
6. МР 2.6.1.0063-12. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Контроль доз облучения населения, проживающего в зоне наблюдения радиационного объекта, в условиях его нормальной эксплуатации и радиационной аварии. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.06.2012) – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200095229/> (дата обращения: 22.02.2020).