

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-217-218

## МАЛОЯМАНТАУСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (ОСОБЕННОСТИ ОРОГРАФИИ И ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ)

### Горичев Юрий Петрович

кандидат биологических наук, зам. директора по научной работе Южно-Уральского государственного природного заповедника, д. Реветь, Республика Башкортостан

### Горичев Всеволод Юрьевич

студент географического факультета Башкирского государственного университета, г. Уфа

**Аннотация.** В статье рассматриваются особенности орографии и ландшафтной структуры одного из ландшафтных районов Южно-Уральского заповедника.

**Ключевые слова:** хребет Малый Ямантау, Южно-Уральский заповедник, фация, урочище.

### MALOYAMANTAU LANDSCAPE DISTRICT OF THE SOUTH URAL RESERVE (FEATURES OF OROGRAPHY AND LANDSCAPE STRUCTURE)

### Gorichev Yuri Petrovich

Candidate of Biological sciences, Deputy Director for Research, South Ural State Nature Reserve, village of Revet, Republic of Bashkortostan

### Gorichev Vsevolod Yurievich

Student of the Geographical Faculty of Bashkir State University, Ufa

**Abstract.** The article discusses the features of orography and landscape structure of one of the landscape areas of the South Ural Reserve.

**Keywords:** Small Yamantau ridge, South Ural Reserve, facies, natural boundary.

На территории заповедника нами выделены 5 ландшафтных районов [1]: Белягушский и Малоямантауский низкогорные широколиственно-темнохвойно-лесные, Машакский и Еракташский среднегорные темнохвойно-таежные с участками высокогорной растительности, Лапыштинский низкогорный сосново-мелколиственно-лесной.

Малоямантауский район расположен в юго-западной части заповедника, занимает территорию в междуречье рек М. Инзер и Реветь. Район включает горный хребет М. Ямантау с прилегающими отрогами, а также часть межгорного понижения между хребтами М. Ямантау и Нары. Границы района с соседними ландшафтными районами заповедника очерчиваются долинами горных рек и ручьев: границу с Белягушским районом – долины р.Реветь и ручья Кургуза, с Машакским районом - долины ручьев Кургуза, (левый приток р.Реветь) и Кабанташ (правый приток р.М.Инзер), с Лапыштинским районом – долина р.М.Инзер. В схеме физико-географического районирования Республики Башкортостан [7]

территория района отнесена к Зильмердакско-Инзерскому району Каразинско-Зильмердакского округа. В соответствии с классификационной схемой А. Г. Исаченко [3] ландшафты района классифицируются как суббореальные гумидные (широколиственно-лесные), умеренно континентальные, складчатоглыбовые низкогорья на протерозойских метаморфизованных породах.

Статус данной территории правильнее рассматривать как ландшафтный подрайон, принимая во внимание его небольшую площадь (62 кв.км). Отличие от соседнего Белягушского ландшафтного района состоит в том, что Малоямантауский район сложен более устойчивыми к денудации породами, выходящими на поверхность в осевой части хребта. Вследствие этого здесь на вершине хребта распространены формы рельефа, характерные для среднегорных районов – высокие отвесные скалы, скальные городки, крупноглыбовые курумы.

Район сложен отложениями среднего (зигальгинская и зигазино-комаровская свиты) и нижнего (суранская свита) рифея [5]. На вершине хр. М.Ямантау на поверхность выходят устойчивые к разрушению кварцевые и кварцитовидные песчаники зигальгинской свиты. Западный склон хребта сложен алевролитами и углеродисто-глинистыми сланцами зигазино-комаровской свиты, восточный склон и межгорное понижение - алевролитами, глинистыми и углеродисто-глинистыми сланцами суранской свиты, в районе устья р. Реветь обнажены доломиты и глинистые сланцы авзянской свиты [5].

Хр. М. Ямантау является одним из звеньев горной цепи, включающей хребты Зигальга, Нары, М. Ямантау, Караташ. Осевая линия хребта вытянута с юга на север, протяженность гребня 6 км. Хребет венчают 2 вершины - северная вершина с наивысшей отметкой (976,3 м) и южная с отметкой 867,2 м. Северная вершина платообразная, со слабым наклоном на юг. Между вершинами на высоте около 730 м над ур. м проходит перевал.

Почвы района серые горнолесные малой и средней мощности. Коренную растительность района образуют формации широколиственно-темнохвойных, широколиственных и темнохвойных лесов. На большей части территории в результате рубок их место заняли производные осинового и березовые фитоценозы, а также сосновые фитоценозы, возникшие после пожаров.

В орографическом строении района можно выделить 6 структурных частей (рис. 1): осевая линия хребта М. Ямантау с водораздельным гребнем (1); основные склоны хребта - западный (2а), восточный (2б)), северный (2в), южный (2г); группа увалов, примыкающих к западному склону (3); группа увалов, примыкающих к восточному склону (4); межгорное

пространство между хр.М. Ямантау и Нары (междуречье ручьев Кушьелга, Сухая Кушьелга, Кургуза, Кабанташ (5); днища долин крупных рек (М.Инзер, Реветь). Каждая из перечисленных орографических структур занимает определенный высотный уровень. Нижнюю ступень образует днище долины р. М.Инзер, расположенное на высоте 280-350 м над ур. м, следующую ступень – вершины увалов прилегающих к западному и восточному склонам хр. М Ямантау высотой 500-550 м, еще выше (550-700 м) расположены основные склоны хр.М. Ямантау, верхнюю высотную ступень (700-900 м) образует гребень хребта с вершинами.

Выделенные структуры представляют собой ландшафтные единицы - ландшафтные урочища разной степени сложности, с определенным набором фаций. В соответствии с методическими разработками [2, 4, 6] для каждой из структур определены характерные виды фаций. В осевой зоне хребта с гребнем характерными фациями являются крупные скалы-останцы высотой 10-40 м и скальные городки, отвесные и обрывистые скалистые обнажения сложенные кварцитами со скальной растительностью; курумы у подножья скал, лишенные мелкозема с лишайниковыми сообществами; курумы со скоплением мелкозема на покатых склонах с фрагментарными всячими почвами с локальными темнохвойными фитоценозами; слабонаклонные платообразные водоразделы с редколесьем из рябины, хвойных и мелколиственных пород на устойчиво влажных маломощных почвах с редкими выходами коренных пород.

В урочищах западного, восточного и северного склонов хр. М. Ямантау наибольшие площади занимают следующие фации: покатые склоны с коренными широколиственно-темнохвойными фитоценозами и производными от них осиновыми и березовыми фитоценозами с участками условно-коренных сосновых фитоценозов на свежих маломощных почвах. Локально распространены курумы – каменные моря и каменные реки, линейно - ложбины стока с временными водотоками, пересекающие склоны. На северном склоне широко распространены покатые и пологие склоны с темнохвойными фитоценозами на влажных среднемоощных почвах. На южном склоне, обращенном к долине р. М.Инзер преобладают крутые и обрывистые инсолируемые склоны с сосновыми фитоценозами на сухих примитивных почвах, скалистые обнажения со скальными растительными сообществами.

Для урочищ увалов, примыкающих к западному и восточному склону характерными фациями являются: выпуклые и слабонаклонные водоразделы с коренными широколиственными фитоценозами, покатые склоны разной солярной экспозиции, в т.ч. покатые теневые склоны с коренными широколиственно-темнохвойными фитоценозами на влажных средне- и маломощных почвах, крутые инсолируемые склоны с условно-коренными сосновыми фитоценозами на сухих маломощных щебенистых почвах, глубокие узкие лога с руслами временных водотоков с сосновыми фитоценозами на крутых склонах.




Рис. 1. Схема орографического строения Малоямантауского района.

В межгорном пространстве между хребтами М. Ямантау и Нары широко распространены следующие фации: гребни и слабонаклонные водоразделы с коренными широколиственно-темнохвойными фитоценозами на свежих склонах, пологие и покатые теневые склоны с коренными темнохвойными фитоценозами на влажных среднемоощных почвах, крутые инсолируемые склоны с условно-коренными сосновыми фитоценозами на сухих маломощных почвах, глубокие лога с руслами временных водотоков с сосновыми фитоценозами на крутых склонах.

Днище долины р.М.Инзер объединяет фации: каменистое русло реки с быстрым течением, пойму реки с уремой, старицы, надпойменные террасы с сосновыми фитоценозами. В днище долины р. Реветь в районе устья распространены аналогичные фации – русло, пойма, старицы, надпойменная терраса с коренными темнохвойными фитоценозами.

Представленная схема может быть использована в дальнейшем при составлении детальной карты района на основе крупномасштабного картографирования.

#### Список литературы:

1. Горичев Ю.П., Горичев В.Ю. Некоторые закономерности ландшафтной дифференциации Южно-Уральского заповедника // География и современные проблемы географического образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Екатеринбург, 2019. - С. 93-97.
2. Жучкова В.К., Раковская Э. М. Методы комплексных физико-географических исследований. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 368 с.
3. Исаченко А.Г. Ландшафты СССР.- Л.: Издательство Ленинградского университета, 1985. - 320 с.
4. Капустин В.Г., Скок Н.В., Янцер О.В. Детальное ландшафтное картографирование территории // Физико-географическое районирование и ландшафты Свердловской области. - Екатеринбург, 2016. - С. 195-238.
5. Козлов В.И. Геологическая карта Южно-Уральского государственного природного заповедника. Масштаб 1:100 000: Объяснительная записка. - Уфа: ДизайнПресс, 2014. - 48 с.
6. Прокаев В. И. Физико-географическое районирование. - Москва: Просвещение, 1983. - 176 с.
7. Физико-географическое районирование Башкирской АССР // Ученые записки Башкирского гос. университета. Сер. географич. Том XVI. № 1. - Уфа, 1964. - 210 с.