DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-29-31

СОЗДАНИЕ РЕЕСТРА СЛЕПНЕЙ И ОВОДОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, КАК ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЭНТОМОЗОВ КРУПНЫХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ

Грудинин Дмитрий Александрович
научный сотрудник, заведующий стационаром «Оренбургская Тарпания» Института степи УрО РАН, г. Оренбург
Кузьмина Елена Николаевна
кандидат биологических наук , научный сотрудник стационара «Оренбургская Тарпания» Института степи УрО РАН, г. Оренбург

Аннотация. Составлен реестр видового состава возбудителей энтомозов, обитающих на территории Оренбургской области и потенциально опасных для реализации проектов природоохранного перемещения крупных фитофагов. Семейство Tabanidae представлено двумя подсемействами, семью родами и двадцатью восемью видами кровососущих насекомых. Оводовые мухи представлены тремя семействами, шестью родами и двенадцатью видами.
Ключевые слова: энтомозы, Оренбургская область, Оренбургская Тарпания, слепни, оводы.

CREATION OF A REGISTRY OF HORSE-FLIES AND GAD-FLIES JCCURRED IN THE ORENBURG REGION, ACTING AS PATHOGENS OF ENTOMOSES IN LARGE UNGULATES

Grudinin Dmitriy Alexandrovich
Researcher, head of the Steppe Research Station «Orenburg Tarpania», Institute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Kuzmina Elena Nikolaevna
Candidate of biological sciences, researcher of the Head of the Steppe Research Station «Orenburg Tarpania», Institute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

Abstract. In this report we compiled a species composition database relating to arachnoentomosis pathogens in animals living in the Orenburg region and potentially dangerous for the implementation of projects for the conservation movement of large phytophages. Horse-flies (family Tabanidae) are represented by two subfamilies, seven genera and twenty-eight species of blood-sucking insects. Gad-flies are represented by three families (Hypodermatidae, Gastrophilidae, and Oestridae), six genera, and twelve species.
Keywords: entomoses, Orenburg region, Orenburg Tarpania, horse-flies, gad-flies.

В процессе акклиматизации животные сталкиваются с обитающими на территории паразитами. Успех природоохранных перемещений зависит, в том числе, и от учета рисков возникновения негативных последствий, возникающих при формировании новых территориальных паразитарно-фаунистических комплексов, инвазировании животных обитающими на территории паразитами или распространении переносимых ими заболеваний.

В Оренбургской области в стационаре Института степи УрО РАН «Оренбургская Тарпания» ведется работа по изучению акклиматизации крупных копытных животных. Коллекция степных животных стационара включает лошадей Пржевальского, киангов, яков, верблюдов и пуховых коз. Животные содержатся полувольно в просторных вольерах с естественной растительностью. Задача проекта возвращение крупных копытных животных в степные ландшафты с целью восстановления экосистем.

В данной работе представлен реестр слепней (сем. Tabanidae) и оводов (сем. Hypodermatidae, Gastrophilidae и Oestridae), обитающих в Оренбургской области. Реестр составлен на основе имеющихся литературных данных о распространении видов насекомых, данных ветеринарной отчетности за 2014–2020 гг. и выявленных в стационаре паразитов содержащихся животных.

Согласно имеющимся данным в ландшафтах Южного Урала обитают 28 видов слепней, относящиеся к 7 родам и двум подсемействам [2, 4] (табл. 1). Слепни являются активными гематофагами.

При кровососании млекопитающих самками слепней вполне возможна трансмиссия многих возбудителей зооантропонозов от больных особей к здоровым [5].

Оводы играют важное эпизоотическое и эпидемиологическое значение. Они участвуют в процессе передачи ряда инфекционных заболеваний. Но наибольший вред оводы приносят в фазе личинки, поскольку развитие их преимагинальных фаз протекает в организме животных. Длительное паразитирование этих насекомых обуславливает хроническое течение энтомозов, воспаление жизненно важных органов и общую интоксикацию организма животных.

Оводы на территории Оренбургской области представлены 12 видами, относящихся к 6 родам трех семейств (табл. 2–4).

Визуальный осмотр содержащихся на стационаре животных показал, что оводовые мухи откладывают яйца на кроющие волосы в области холки и передних ног лошадей Пржевальского. Аналогичная картина наблюдалась и с лошадьми подсобных хозяйств, содержащихся в п. Сазан. Единичные яйца встречаются на кроющих волосах передних ног верблюдов. Яйца одиночные, бело-желтоватые. Структура поверхности яиц имеет вид частых поперечных полос. Прикрепительный придаток по длине занимает около половины яйца. Форма яиц была клиновидная, расширяющая к свободному концу, на котором, очевидно, располагалась крышечка. По срокам сбора яиц оводов (август – сентябрь), месту их откладки на теле животных и их морфологии мож-

Таблица 1
Видовой состав гематофагов семейства *Tabanidae* территории Оренбургской области.

Подсемейство	Род	Вид	Статус численности вида
Chrysopsinae	*Silvius*	*Silvius vituli*	многочисленный
	Chrysops	*Chrysop scaecutiens*	немногочисленный
		Chrysops pictus	немногочисленный
		Chrysops relictus	немногочисленный
Tabaninae	*Tabanus*	*Tabanus bromius*	многочисленный
		Tabanus miki	не определен
		Tabanus maculicornis	немногочисленный
		Tabanussudeticus	немногочисленный
		Tabanus bovines	немногочисленный
		Tabanus glaucopis	немногочисленный
	Atylotus	*Atylotus rusticus*	немногочисленный
		Atylotus quadrifarius	не определен
	Hybomitra	*Hybomitra muehlfeldi*	редкие
		Hybomitra lurida	немногочисленный
		Hybomitra nitidifrons	немногочисленный
		Hybomitra confiformis	немногочисленный
		Hybomitra distinguenda	немногочисленный
		Hybomitra ciureai	немногочисленный
		Hybomitra nigricornis	немногочисленный
		Hybomitra lundbecki	немногочисленный
		Hybomitra montana	немногочисленный
	Heptatoma	*Heptatoma pellucens*	многочисленный
	Haematopota	*Haematopota italica*	немногочисленный
		Haematopota turkestanica	редкий
		Haematopota classicalness	немногочисленный
		Haematopota pallidula	немногочисленный
		Haematopota ptuufalfa	многочисленный
		Haematopota bimaculata	многочисленный

Таблица 2
Видовой состав оводов семейства *Hypodermatidae,* обитающих на территории Оренбургской области и их характеристика.

Род	Вид	Описание
Hypoderma	*Hypoderma bovis*	Паразит КРС, лошадей, коз, овец. Личинки 1-й стадии паразитируют в жировой ткани спинномозгового канала. Личинки 2-й и 3-й стадии мигрируют в область спины и поясницы. Дают одно поколение в год [1].
	Hypoderma lineatum	Паразит КРС, лошадей, коз и яков. Личинки 1-й стадии паразитируют в глотке, подслизистом слое и мышечной оболочке пищевода. Личинки 2-й и 3-й стадии локализуются в области спины и поясницы. Дают одно поколение в год [1].
Pallasiomyia	*Pallasiomyia antilopum*	Паразитирует под кожей спины сайгака. В Оренбургской области зарегистрирован на левобережье р. Урал, на правобережье р. Илек, а также в г. Бузулук [1].

но заключить, что эти яйца принадлежат *Gastrophilus intestinalis*. Определение яиц оводовых мух проводилось по К.Я. Грунину.

В период 2020–2021 гг. на территории научного степного стационара «Оренбургская Тарпания» от лошадей Пржевальского и киангов были получены личинки *G. veterinus* и *G. intestinalis*. Личинки выделялись единично и располагались на поверхности скибол. Часть эвакуированных личинок третьего возраста была нежизнеспособной.

Подготовленный реестр видового состава возбудителей энтомозов позволит выявлять в процессе выбора наиболее благоприятные степные участки для реинтродукции крупных фитофагов на территории Оренбургской области. Изучение видового состава паразитических насекомых, их распространения, численности и фенологических особенностей позволят сократить экологические риски программ природоохранного перемещения животных.

Работа выполнена на базе Степного научного стационара ИС УрО РАН «Проблемы степного природопользования в условиях современных вызовов: оптимизация взаимодействия природных и социально-экономических систем» (№ ГР АААА-А21-121011190016-1)

Таблица 3
Видовой состав оводов семейства *Gastrophilidae*, обитающих на территории Оренбургской области и их характеристика.

Род	Вид	Описание
Gastrophilus	*Gastrophilus pecorum*	Паразит лошади, лошади Пржевальского, осла. Личинки 2-й и 3-й стадии паразитируют на поверхности слизистой оболочки желудка, ротовой полости и пищевода, у корня языка, на мягком и твердом небе, в прямой кишке. Развивается одно поколение. Лет овода происходит с июля по сентябрь [3].
	Gastrophilus veterinus	Паразит лошади и осла. Личинки 1-й стадии паразитируют на внутренней поверхности десен хозяина, личинки 2-й и 3-й стадии – в двенадцатиперстной кишке, желудке. Дает одно поколение в год. Лет овода происходит в июне-августе [3].
	Gastrophilus haemorrhoidalis	Паразит лошади и осла. Личинки 1-й стадии паразитируют в ротовой полости, личинки 2-й и 3-й стадии – в двенадцатиперстной кишке, желудке, в глотке и гортани, в прямой кишке лошади. Развивается одно поколение оводов. Лёт овода в Оренбургской области отмечен в мае-октябре [3].
	Gastrophilus inermis	Паразит лошади и осла. Личинки 1-й стадии паразитируют в слизистой оболочке щек, личинки 2-й и 3-й стадии – в желудке и прямой кишке. Развивается одно поколение. Лет отмечен в июне – августе [3].
	Gastrophilus intestinalis	Паразит лошади и осла. Личинки 1-й стадии паразитируют в слизистой оболочке языка, личинки 2-й и 3-й стадии – в желудке, двенадцатиперстной кишке и пищеводе. За сезон развивается одно поколение. В Оренбуржье лет отмечен в июле – сентябре [3, 6].

Таблица 4
Видовой состав оводов семейства *Oestridae*, обитающих на территории Оренбургской области и их характеристика.

Род	Вид	Описание
Oestrus	*Oestrus ovis*	Паразит овец и коз. Личинки 1-й стадии локализуются на внутренней поверхности нижних носовых раковин, носовой перегородке, стенке носовой полости. Личинки 2-й и 3-й стадии локализуются в гайморовых, лобных пазухах, полостях роговых отростков. В природно-климатических условиях Оренбургской области дает одно поколение в год [3, 7]. Лёт овода происходит в конце августа – сентябре [6, 7]. В Оренбургской области в лесостепной и степной зонах экстенсивность оводовой инвазии у овец составляет до 81,8 %, при интенсивности 24,6 личинки [8].
Cephalopina	*Cephalopina titilator*	Паразит верблюдов. Личинки паразитируют в полостях головы (завитки носовых раковин, решетчатая кость, верхний и средний носовые ходы) и носоглотке верблюдов. Овод дает два поколения в год. Лёт овода происходит в мае – июне, в сентябре – октябре [3].
Rhinoestrus	*Rhinoestrus purpureus*	Паразит лошадей и ослов. Личинки 1-й стадии развиваются в носовых раковинах, решетчатой кости, в носовых ходах. Личинки 2-й и 3-й стадии локализуются в лабиринте решетчатой кости, в глотке, в пазухах клиновидной кости, в гортани, в оболочках обонятельных луковиц. В Оренбуржье отмечено развитие одного поколения Rhinoestrus purpureus [3].
	Rhinoestrus latifrons	Личинки паразитируют в полостях головы лошади [3].

Список литературы:

1. Грунин К.Я. Фауна СССР. Насекомые двукрылые. Подкожные овода (Hypodermatidae). – М.: Изд-во Акдемии наук СССР, 1962. – 240 с.
2. Кучеров Е.В. О фауне слепней на южной оконечности Урала // Успехи энтомологии на Урале. Сборник научных трудов. – 1997. – С. 180.
3. Непоклонов А.А., Хипе Т., Шплистезер Х., Дорж Ц. Болезни животных, вызываемые оводами. – М.: Колос, 1980. – 256 с.
4. Петерсон А.М., Чиров П.А. Фаунистический обзор коллекции слепней (DIPTERA, TABANIDAE) зоологического музея Саратовского государственного университета // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье, 2008. – № 7. – С. 33–35.
5. Поляков В.А., Узаков У.Я., Веселкин Г.А. Ветеринарная энтомология и арахнология: спавочник. – М.: Агропромиздат, 1990. – 293 с.
6. Трухачев В.И., Толоконников В.П., Лысенко И.О., Балега А.А. Оводовые болезни животных: монография. – Ставрополь: АГРУС, 2011. – 168 с.
7. Христиановский П.И., Жарких Т.Л., Платонов С.А. Гельминтозы лошадей Пржевальского в Оренбургском государственном заповеднике // Перспективные аграрные и пищевые инновации. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией И.Ф. Горлова. – 2019. – С. 166–171.
8. Шамин В.Л. Эстроз овец и коз в Оренбургской области (эпизоотология, фенология, терапия и профилактика): авт. дисс. … канд. вет. наук. – Тюмень, 1996.