

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-140-141

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БАСЕЙНА РЕКИ ИНЗЫ

Истомина Елена Юрьевна

кандидат биологических наук, доцент кафедры географии и экологии Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. В статье рассматривается специфика гидрологического режима бассейна реки Инзы.

Ключевые слова: гидрологический режим, река Инза, Ульяновская область.

HYDROLOGICAL CONDITIONS OF THE RIVER BASIN THE CITY

Istomina Elena Yurievna

candidate of biological Sciences, associate Professor of geography and ecology Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanova Ulyanovsk

Annotation. The article deals with the specifics of the hydrological regime of the Inza river basin.

Keywords: hydrological regime, Inza river, Ulyanovsk region.

Бассейн реки Инзы имеет площадь 3115 км² и располагается в западной части Ульяновской и северо-восточной части Пензенской области. Территория бассейна относится к центральной части Приволжской возвышенности и находится на границе лесной и степной зоны.

Природные воды бассейна представлены реками, озерами и болотами. Реки в бассейне имеют смешанные источники питания: снеговое, дождевое и грунтовое. В верховьях Инзы интенсивность подземного питания увеличивается до 3,0-5,0 л/с с 1 км² за счёт распространения водообильных горизонтов в отложениях палеогена и маастрихта. Высота истока – 240 м (окрестности с. Вороновка Базарносызганского района Ульяновской области), устья – 116 м (окрестности р.п. Сура Никольского района Пензенской области). Длина реки составляет 103 км. Течение быстрое, так как перепад составляет 1 м на 1 км течения. Обносы в пределах 50-80 м. Ширина долины доходит до 4 км. Ширина в межень 10-15 м. Глубина – 0,5 м, на плесах – до 2,5 м. Средний слой весеннего стока составляет 30 мм.

По химическому составу воды в бассейне Инзы относятся к гидрокарбонатносульфатнокальциевому типу. В верхнем течении Юловки и Сюксюма воды гидрокарбонатнохлориднокальциевого типа. Вода бассейна Инзы характеризуется умеренной жёсткостью 8,4-16,8 °DH (немецких градусов). Минимальные значения жесткости воды отмечены для верхнего течения Сюксюма и верхних притоков Сызганки (3,9-3,4 °DH). Преобладают воды с содержанием железа до 0,5 мг/л, максимальные значения отмечены на участках рек Сызганки (2,4 мг/л), Сюксюма (6,0 мг/л) [3].

Река Инза имеет множество мелких притоков (более 40), длина которых чуть превышает 900 км. Крупными правыми притоками являются: Сызганка (34 км), Юловка (33 км), Сюксюм (28 км), Эмбелейка (21 км); левыми – Маис (29 км), Кеньша (26 км), Старый Калдаис (24 км), Ночка (11 км), Какарма (8 км).

Для оценки насыщенности территории речной сетью вычисляют коэффициент её густоты или плотности. Он определяется отношением длины речной сети, измеренной в км в пределах каждого элементарного бассейна к его площади, выраженной в км². Значения коэффициентов на территории бассейна р. Инзы изменяется в широком диапазоне: от 0,1 до 1,2 км/км². В бассейнах Юловки, Сызганки коэффициенты увеличиваются до 1,0 км/км². В верхнем течении Инзы, в районе распространения песков, речная сеть получает слабое развитие, так как питание водоносных горизонтов недостаточное, а водовмещающая емкость их значительная.

Подземные воды района бассейна р. Инзы многочисленны, так как представлены опоками камышинской и саратовской свит палеогена. Родники имеют значительный дебит и характеризуются небольшой минерализацией и высокими питьевыми качествами. Речная сеть района многочисленна, обильна и полноводна. Об этом свидетельствует тот факт, что в районе Сурской Шишки (Кузоватовский район Ульяновской области) не далеко друг от друга расположены истоки таких рек нашего региона, как Сура, Инза, Барыша, Свяги, Сызрана. Меженный сток рек значителен, пересыхающих рек нет. И в русловом, и в пойменном элювии преобладают пески, так как взвешенных частиц в водах рек незначительное количество [4].

Согласно гидрогеологическому районированию [3] исследуемая территория относится к центральному району развития палеогеновых вод. Основной источник водоснабжения – палеогеновые воды, частично – верхнемеловые.

В центральной части Правобережья Ульяновской области, к которой относится территория наших исследований, большое значение саратовские водоносные горизонты палеогеновых отложений. Воды данного горизонта циркулируют в толще переслаивающихся песков и песчаников. Водоупорным ложем служат глауконитовые глинистые песчаники, иногда опоки. Саратовский водоносный горизонт имеет значительный бассейн питания. Мощная водопроницаемая толща песков служит коллектором для значительной части инфильтрующихся атмосферных осадков. Именно саратовский горизонт питает исток реки Инзы.

В верховьях реки Инзы развиты воды камышинского водоносного горизонта. Воды его залегают в толще сильно трещиноватых глауконитовых песчаников и опок, а также мелкозернистых кварцевых песков, лежащих нижнюю часть камышинских отложений. Водо-

упорным ложем служит сплошная твердая плита песчаника, лежащая в основании этих отложений. Камышинские воды имеют особо большое значение в районах Сурской Шишки и Свяжского плато, где берут начало родники, являющиеся источниками рек Суры, Инзы, Барыша, Свяги, Сызрана и Усы [3].

Верхнемеловые отложения представлены сложным комплексом пород мергельно-мелового состава, характеризующихся различной степенью обводненности. Согласно классификации З.И. Кубыниной [1] территория бассейна р. Инзы относится к Сурско-Волжскому участку верхнемеловых отложений Приволжской возвышенности, расположенному на водоразделе рек Сура и Волга. Средняя глубина залегания вод маастрихтского горизонта на изучаемой территории – 14-38 м. Имеют небольшую минерализацию (0,3-0,6 г/л) и относятся к гидрокарбонатному кальциевому, реже гидрокарбонатно-сульфатному кальциево-магниевому типу [2].

Кампанский ярус сложен трещиноватым мелом, мергелями, чередующимися со слоями опок и глин. Обводнены эти отложения в верховьях рек Инзы и Суры. Здесь воды кампана эксплуатируются многими скважинами с дебитом 1,2-10,3 л/с, (удельный дебит 0,08 – 26 л/с). Такие различия в производительности скважин обусловлены разной степенью трещиноватости и закарстованностью пород. Наибольший приток воды был получен в скважине на ст. Инза. Вследствие высокого гипсометрического положения, совпадения или близкого расположения областей питания и дренирования воды кампана преимущественно пресные гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,2-0,34 г/л [2].

Мергельно-меловые породы тулона и коньяка, залегают на глинах верхнего альба и перекрываются трещиноватыми мергелями и мелом сантона и кампана. Вследствие этого все воды, заключенные в породах, лежащих на альбских глинах, образуют единый верхнемеловой надальбский водоносный горизонт, дренируемый овражно-балочной и речной сетью и питающий многочисленные родники в бассейнах рек Суры, Свяги, Барыша, Сызранки, Терешки и Инзы с дебитом в основном от 1 до 100 л/с [2].

Выходы родниковых вод расположены в пределах карстовой области северной части Ульяновско-Саратовского прогиба. Карстующей породой является белый, трещиноватый мел. Карстовые провалы образуются, в рельефе в виде воронок, если мощность перекрывающих палеогеновых отложений не превышает 40 м. Чаще всего провалы образуются в толще мощностью 1530 м. Если же мощность перекрывающих пород превышает 40 м, закарстованные площади фиксируются карсто-

выми полостями и выходами подземных вод в виде мощных источников, дебит которых достигает 25-40 л/с. Современный карт приурочен к участкам, где происходит инфильтрация слабоминерализованных вод в растворимые породы. К восходящим родникам карстового происхождения относятся родники Окненный, Дубровка, Юловский в Инзенском районе [2].

На водораздельных облеснённых участках данного района встречаются небольшие озера карстового, суффозионно-карстового, пойменного происхождения и болота, в том числе и редкие верховые и переходные со сплавиной. Верховые озера со временем зарастают и превращаются в болота [4]. В районе исследования встречаются так же искусственные водоёмы – пруды, самым известным среди которых является Юловский пруд (Инзенский район Ульяновской области). Возраст этого пруда более ста лет, длина около 2 км, ширина доходит до 500 м, общая площадь водоёма 65 га. За этот период в нём сформировалась разнообразная флора и фауна, характерная для нашего региона, в том числе редкие водные растения (кувшинка чисто-белая, лютик кауфмана и др.). С 1981 года Юловский пруд и его окрестности имеет статус памятника природы [2].

Самые распространённые среди болот в районе исследования являются травяные болота, которые встречаются в поймах рек. Здесь преобладают различные виды осок, тростник, рогозы. Значительно реже на изучаемой территории отмечены верховые и переходные сфагновые болота, многие из которых являются региональными памятниками природы. На территории Инзенского района расположены три верховых сфагновых болота – болото Малое, Моховое-2 и Ягодное. Важное значение для Никольского района Пензенской области имеет Пестровское торфяное болото – верховое сплавное сфагновое болото.

Таким образом, на территории бассейна реки Инзы гидрологические условия разнообразны, что является характерной особенностью данной территории.

Статья подготовлена в рамках Договора № 04/2019-Р о предоставлении гранта Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество».

Список литературы:

1. Кубынина З.И. Подземные воды верхнемеловых и палеогеновых отложений северной и средней части Ульяновско-Саратовской впадины // Бюл. Московского о-ва испытателей природы, отделение геология. – 1961. – Т. 36. – Вып. 6.
2. Особо охраняемые природные территории Ульяновской области / Под ред. В. В. Благовещенского. – Ульяновск: «Дом печати», 1997. – 184 с.
3. Природные условия Ульяновской области. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1978. – 328 с.
4. Физико-географическое районирование Среднего Поволжья / Под ред. А.В. Ступишина. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1964. – С. 122–124.