

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-42-43

СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ТЕРРИТОРИИ ВЕТРОПАРКА «УЛЬЯНОВСКИЙ» С. КРАСНЫЙ ЯР

Казакова Наталья Анатольевна

кандидат биологических наук, доцент
Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова, г. Ульяновск

Масленникова Елена Анатольевна

магистрант кафедры географии и экологии
Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты исследований по экологическому состоянию почвенного покрова на территории ветропарка «Ульяновский» в селе Красный Яр.

Ключевые слова: ветрогенераторы, почва, тяжелые металлы, загрязнение, экологическое состояние.

MODERN ASSESSMENT OF THE STATE OF SOILS IN THE TERRITORY OF THE ULYANOVSKY WIND FARM P. KRASNY YAR

Kazakova Natalya Anatolyevna

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, Ulyanovsk

Maslennikova Elena Anatolyevna

Master student of the department of geography and ecology
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, Ulyanovsk

Abstract. This article discusses the results of research on the ecological state of the soil cover on the territory of the Ulyanovsky wind farm in the village of Krasny Yar.

Keywords: wind generators, the soil, heavy metals, pollution, ecological state.

Ветроэнергетика является одной из самых быстроразвивающихся технологий возобновляемой энергетики. Ветровые электростанции строят в местах с высокой средней скоростью ветра – от 4,5 м/с и выше. Они преобразуют энергию ветра в электрическую энергию и состоят из нескольких ветрогенераторов, собранных в одном месте. Крупные ветровые электростанции могут состоять из 100 и более ветрогенераторов. Ветровая электроэнергия производится более чем в 70 странах. Лидерами в ее производстве являются США, Испания и Китай [3].

Ветропарк «Ульяновский» в селе Красный Яр Чердаклинского района обладает мощностью 35 МВт. Состав оборудования включает 14 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Учитывая различные виды воздействия турбин на компоненты биоты, влияние ветропарков необходимо оценивать исходя из локальных условий, которые могут спровоцировать как

позитивный, так и негативный эффекты ветропарков на местные искусственные и естественные экосистемы [16].

Есть информация о влиянии ветрогенераторов на птиц: занятие территорий, отпугивание мигрирующих птиц вращающимися элементами ветровых установок и ночным освещением, столкновение птиц с лопастями и вертикальными конструкциями ветряков [2]. У человека же может развиваться «Синдром ветрогенератора», а вот информации о влиянии ветрогенераторов на почву крайне мало. В связи с этим, возникает необходимость оценки влияния ВЭС на почвенный покров.

Основными видами отходов от ветроэлектростанций являются твердые бытовые отходы, а также мусор, которые при несвоевременном сборе могут негативно сказываться на состоянии почвенного покрова и служить источником привноса в почву различных загрязняющих веществ [6].

Чтобы предотвратить процессы негативного изменения биологической активности почв, нарушения ее самовосстанавливающей способности и загрязнения тяжелыми металлами, была проведена оценка экологического состояния территорий вблизи ветрогенераторов.

В исследовании обращено внимание на загрязнение территорий вблизи ветропарка тяжелыми металлами, так как им свойственно накопление и миграция, что негативно сказывается на почве и развитии растений [12], а также непосредственно на человеке.

Объектом исследований послужили почвы ветропарка на территории с. Красный Яр Чердаклинского района Ульяновской области. Забор почвенных проб производили в центре села, на его окраине и, конечно, вблизи самих ветрогенераторов. На рисунке (рис.1) отмечены точки сбора исследуемых образцов почвы.



Рис.1. Места сбора исследуемых образцов почвы [11].

Исследование тяжелых металлов в почвах ветропарка села Красный Яр проводилось в осенний период. Результаты данной работы представлены на рисунке (рис. 2).




Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в почвах района исследований.

В основу работы были положены общепринятые в геохимии и почвоведении методы [4-7]. Определение концентрации тяжелых металлов в образцах почвы проводили в агрохимцентре г. Ульяновска на атомно-абсорбционном спектрофотометре. Оценка результатов проводилась по «Перечню ПДК и ОДК химических веществ в почве» (№6229-91, 1991). Статистический анализ полученных данных проводили с использованием общепринятых методов и пакета прикладных программ MS Excel for Windows (2013). Во всех взятых почвенных образцах методом атомно-адсорбционной спектроскопии были определены концентрации следующих тяжелых металлов – Zn, Pb, Cu, Ni, Cd (рис. 2).

При анализе проб почв на территории ветропарка установлено содержание Cu 13,2 мг/кг, на окраине села – 15,4 мг/кг, и в центре – 9,8 мг/кг. Общесанитарная предельно допустимая концентрация по Cu составляет 55 мг/кг и по данному показателю превышений не выявлено. Содержание Zn и Ni исследуемых территорий также находится в допустимых пределах концентраций. Наибольшее накопление Pb обнаружено в пробах почв центральной части села – 10,7 мг/кг, наименьшее на территории ветропарка – 8,1 мг/кг, стоит отметить, что ПДК – 30 мг/кг превышен не был. Наличие Cd было обнаружено во всех почвенных пробах исследуемых территорий, содержание которого не превышает ПДК (1,0 мг/кг). Территорию исследуемых территорий можно отнести к территориям умеренного риска, которым требуется постоянный экологический мониторинг [11].

Таким образом, при минимизации всех возможных факторов отрицательного воздействия ветроэлектростанций на окружающую среду на всех этапах их жизненного цикла, ветроэнергетика сегодня остается одним из самых безопасных видов электрогенерации.

Список литературы:

1. Безносков В. Н., Суздалева А. Л., Эль-Шаир Хаям И. А. Оценка экологической безопасности объектов ветроэнергетики // Малая энергетика. – 2011. – № 3–4. – С. 37 – 43.
2. Говорушко С.М. Воздействие ветровых электростанций на окружающую среду // Альтернативная энергетика и экология №4, 2011, С. 38 – 42.
3. Горлов П.И., Слюхин В.Д., Осадчий В.В., Васильев В.М., Мацюра А.В., Баджи Р. «Методики изучения миграций птиц на территориях ветровых электростанций»; Біологічний вісник, 2016, С. 15.
4. ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы (ССОП). Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (с Изменением N 1)
5. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб
6. ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения
7. ГОСТ 17.4.3.05-86 Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения
8. Ермоленко Г., Гордеев И., Рыженков М., Никомарова А., Богородицкая Н. Развитие сетевых ветряных электростанций в России на примере пилотного проекта сетевой ветроэлектростанции «ВЭС Мирный» в Ейском районе Краснодарского края / Энергетический вестник №18, 2014, С. 57 – 73.
9. Ермоленко Б. В. Экологические аспекты ветроэнергетики / Б. В. Ермоленко, Г. В. Ермоленко, М. А. Рыженков. // Теплоэнергетика. – 2011. – № 11. – С.72 – 78.
10. Ермоленко Г. В. Реализация проектов ветроэнергетики в России / Г. В. Ермоленко // Институт энергетики НИУ ВШЭ. – 2015. – 13 с.
11. Казакова Н.А., Садретдинова Л.Р., Мухаметшин А.А. Влияние ветрогенераторов на загрязнение почв тяжелыми металлами Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 2019. – Т. 11. – № 1. – С. 25 – 34.
12. Коровина Е.В., Сатаров Г.А. Оценка состояния почвенного покрова урбозкосистемы //Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского, Тамбов 2009. – С. 157 – 161
13. Литвиненко А. М. Проектирование ветроэлектростанций / А. М. Литвиненко, А. В. Тихунов, Воронеж 2003. – 96 с.
14. Рыженков М.А. Экологическая оценка воздействия ВЭС на окружающую среду в процессе эксплуатации //Успехи в химии и химической технологии, Том XXV. №10 (126), 2011.– С.28 – 32
15. Степанцева О. Новые проекты в ветроэнергетике / Энергетический вестник №8, 2010, С. 43 – 45.
16. Турко С. Ю., Петров В. И. Ветроэнергетика и ее возможности на юге и юго-востоке Европейской части России //Биологические основы устойчивого развития Волго-Каспийского природного комплекса. – М.: «Современные тетради», 2006. – 235 с.