

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-57-58

ВСТРЕЧИ БЕЛОЙ ТРЯСОГУЗКИ И ЛЕСНОГО КОНЬКА С РАЗЛИЧНЫМИ АНОМАЛИЯМИ В АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ**Маловичко Любовь Васильевна,**

доктор биологических наук, профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва

Артемьева Елена Александровна,

доктор биологических наук, профессор Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. В работе представлены находки птиц с аномалиями в развитии клюва, ног, хвоста, которые сделаны в различных антропогенных ландшафтах. Прогнозированы тенденции появления аномалий птиц при различных нарушениях в постнатальном онтогенезе.

Ключевые слова: птицы, аномалии в развитии, ландшафт, популяция.

ENCOUNTERS OF THE WHITE WAGTALE AND THE FOREST PIT WITH VARIOUS ANOMALIES IN ANTHROPOGENIC LANDSCAPES**Malovichko Lyubov Vasilievna,**

Doctor of Biological Sciences, Professor of RGAU-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, Moscow.

Artemieva Elena Alexandrovna,

Doctor of Biological Sciences, Professor of Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk

Abstract. The paper presents finds of birds with anomalies in the development of the beak, legs, tail, which were made in various anthropogenic landscapes. Trends in the appearance of anomalies in birds with various disorders in postnatal ontogenesis are predicted.

Keywords: birds, anomalies in development, landscape, population.

Проблема аномального развития у птиц является актуальной и мало изученной [1–3]. Накопление таких фактов представляет большой теоретический интерес.

Лесной конек *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758) и белая трясогузка *Motacilla alba* (Linnaeus, 1758) (Passeriformes, Motacillidae) относятся к насекомоядным птицам. На территории Ульяновской области (Среднее Поволжье) и юга России – это обычные гнездящиеся и перелетные виды, которые обитают в антропогенных ландшафтах.

Цель работы: выявление аномалий в постнатальном онтогенезе развития птиц в условиях антропогенных ландшафтов.

Исследования проводились в течение полевых сезонов 2011–2021 гг. Находки птиц с аномалиями в развитии приведены в хронологическом порядке.

28.07.2011 г., в окр. п. Октябрьский, на пруду Октябрь-

ский Радищевского района Ульяновской области обнаружена молодая особь лесного конька с аномальным развитием клюва. На берегу пруда на ночь была установлена орнитологическая сетка. Утром при ее проверке в орнитологической сетке обнаружен молодой лесной конек с деформированным клювом – аномалия «клевостость». Такая птица не способна нормально захватывать корм (рис. 1).



Рис. 1. Молодой лесной конек с деформированным клювом – аномалия «клевостость» (28.07.2011 г., фото Е.А. Артемьевой).

08.07.2020 г. в 25 км южнее г. Кисловодска в п. Кичи-Балык КЧР на речке Кичмалка встречена белая трясогузка без хвоста. Она неуклюже с трудом перелетала с камня на камень, затруднено движение птицы (рис. 2).



Рис. 2. Молодая белая трясогузка без хвоста (08.07.2020 г., фото Л.В. Маловичко).

15.05. 2021 г. в г. Калуге в микрорайоне Анненки отмечена белая трясогузка с деформированной правой

лапкой. Птица с трудом передвигалась прыжками по земле, практически не опираясь на деформированную лапку, затруднено движение птицы (рис. 3).



Рис. 3. Деформированная лапка у белой трясогузки (15.05.2021 г., фото Л.В. Маловичко).

13.07.2021 г. на фермерском пруду РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева (г. Москва) отмечена белая трясогузка с удлинненными средними рулевыми перьями белого цвета, которые выдавались вперед на 1,5 см, затруднен полет птицы (рис. 4).



Рис. 4. Белая трясогузка с аномалией рулевых перьев (13.07.2021 г., фото Л.В. Маловичко).

21.07.2021 г. в г. Ставрополе на территории онкологического центра в северо-западном районе отмечен птенец белой трясогузки с деформированной лапкой (пальцы были направлены под себя). Птенец не мог опираться на лапу и скакал на одной ноге, затруднено движение птицы (рис. 5).



Рис. 5. Слеток белой трясогузки с аномалией развития лапки (21.07.2021 г., фото Л.В. Маловичко).

Все фиксации аномалий птиц связаны с их обитанием в антропогенных ландшафтах, где особенно сильно может проявляться нарушение постанального онтогенеза. Основными факторами могут выступать – нарушение генетической программы онтогенеза, а значит, нарушение трендов индивидуального развития. Это в свою очередь, может быть связано с обитанием в экологически неблагоприятных условиях загрязнения ландшафта. Так, количество особей насекомых с аномальным развитием на территории г. Ульяновска имеет показатель тетракорического коэффициента связи: $r_{++} = 0.034$; $\chi^2 = 29.8$; $P > 0.95$, что указывает на прямую корреляцию достаточно большого числа возникающих морфологических аномалий в постнатальном онтогенезе у насекомых с их обитанием в антропогенном ландшафте, что было показано ранее (Артемьева, Зусмановский, 2001).

Авторы благодарят Г.В. Пилюгину за техническую помощь в проведении выезда на пруд Октябрьский Радищевского района Ульяновской области.

Список литературы:

1. Артемьева Е.А., Зусмановский Г.С. Топографические особенности биоразнообразия энтомофауны города Ульяновска // Любичевские чтения. Сб. докл. – УлГПУ, Ульяновск, 2001. – С. 112–115.
2. Домбровский К.Ю. Гнездование лысухи *Fulica atra* с аномалиями в окраске оперения в Красном Селе // Русский орнитологический журнал, 2021. – Том 30. – Экспресс-выпуск 2052. – С. 1529–1530.
3. Маловичко Л.В. Встреча жулана *Lanius collurio* с аномальным клювом // Русский орнитологический журнал, 2021. – Том 30. – Экспресс-выпуск 2094. – С. 3485–3487.
4. Назин А.С., Назин Я.А. О встречах птиц с травматическими дефектами в Светлинском районе Оренбургской области // Русский орнитологический журнал, 2021. – Том 30. – Экспресс-выпуск 2038. – С. 852–865.