

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-54-56

УДК: 616.995.1:646.1(470.56)

НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГЕЛЬМИНТОЗОВ НЕПАРНОКОПЫТНЫХ В ЦЕНТРЕ РАЗВЕДЕНИЯ СТЕПНЫХ ЖИВОТНЫХ «ОРЕНБУРГСКАЯ ТАРПАНИЯ»

Мальцев Семён Сергеевич,

аспирант Оренбургского аграрного университета, инженер-стационара «Оренбургская Тарпания» Института степи УрО РАН, г. Оренбург

Аннотация. Одним из значительных рисков при интродукции животных является заражение их гельминтами. В 2020 г. в степном стационаре «Оренбургская Тарпания» проведено обследование лошадей Пржевальского и киангов на гельминтозы. Выявлено паразитирование нематод подотрядов Strongylata, Ascaridata и Oxyurata при низкой и средней интенсивности инвазии. Зараженность нематодами выше у лошадей Пржевальского, чем у киангов. Указанные гельминтозы протекали в форме носительства.

Ключевые слова: степной стационар, лошади Пржевальского, кианги, гельминтозы, возбудители, зараженность.

NOSOLOGICAL COMPOSITION OF HELMINTHOSES IN EQUIDS IN THE CENTER FOR BREEDING OF STEPPE ANIMALS «ORENBURG TARPANIA»

Maltsev Semyon Sergeevich

Post-graduate student of the Orenburg Agrarian University, Orenburg

Abstract. One of the significant risks in the introduction of animals is their infection with helminths. In 2020 in the steppe hospital "Orenburg Tarpaniya" a survey of Przewalski's horses and kiangs for helminthiasis was carried out. Parasitism of nematodes of the suborders Strongylata, Ascaridata and Oxyurata was revealed at low and medium intensity of invasion. Nematode infestation is higher in Przewalski's horses than in Kiangs. These helminthiasis proceeded in the form of carriage.

Keywords: steppe station, Przewalski's horses, kiangs, helminthiasis, pathogens, infestation.

Актуальность темы. Основная задача проекта «Оренбургская Тарпания» - экологическая реабилитация степей путем возвращения в них диких копытных животных, как метод, основанный на природоподобных технологиях.

Успех интродукции того или иного вида животных обусловлен множеством факторов. Для прогнозирования результатов интродукции на уровне сообщества видов необходимо учитывать возможные экологические и биологические риски. Одним из значительных рисков, определяющих здоровье и жизнеспособность перемещаемых популяций, является риск распространения заболеваний и паразитов, прежде всего, гельминтов. Для анализа риска распространения гельминтозов проводились копрологические обследования животных степного стационара «Оренбургская Тарпания».

Цель исследования: изучить нозологический состав гельминтозов непарнокопытных в Центре разведения степ-

ных животных «Оренбургская Тарпания», а также домашних непарнокопытных на сопредельной территории.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Проводить копрологические обследования непарнокопытных животных, с интервалами 1-1,5 месяца в степном стационаре «Оренбургская Тарпания»

2. Проводить аналогичные обследования домашних непарнокопытных животных в с. Сазан Беляевского района.

3. Определить видовой состав гельминтов у обследуемых животных.

Материал и методы исследований. Объектом исследования являются непарнокопытные животные различных видов. В отчетный период в степном стационаре содержались лошади Пржевальского (ЛП-5 голов), кианги (3 головы). В с. Сазан жители содержат домашних лошадей.

Материалом копрологических исследований служили фекальные массы от указанных животных. Фекалии собирали в полиэтиленовые пакеты и доставляли в паразитологическую лабораторию ОГАУ. Здесь материал исследовали методом овоскопии по Мак Мастеру. Для видовой дифференциации гельминтов проводили культивирование личинок в течение 8-10 суток при температуре 22-25°C с последующей ларвоскопией по Берману-Орлову.

При выполнении ово- и ларвоскопии проводили микрофото съемку с целью создания фотоархива результатов исследований.

Результаты и обсуждение. В течение 2020 г. гельминтокопрологические исследования в стационаре проводились с интервалами 1–1,5 месяца. Данные по овоскопии собранного материала приведены в табл.1,2 поквартально.

Анализ данных таблиц показывает, что у животных всех обследуемых групп обнаружены яйца нематод подотряда Strongylata (рис. 1). При этом интенсивность инвазии (ИИ) была низкой и средней: от единичных до 700 яиц в 1 г фекалий. В нескольких случаях яйца гельминтов в пробах не обнаруживались.




Рис 1. Яйца гельминтов в поле зрения микроскопа: 1 – яйцо параскариды, 2 – яйца стронгилят (увеличение 80°).

Таблица 1

Результаты гельминтоооскопии проб фекалий от животных степного стационара «Оренбургская Тарпания» за первое полугодие 2020 г.

№ п/п	Вид животных	Периоды исследования			
		I-III		IV-VI	
		Обнаружено	Количество яиц в 1 г фекалий	Обнаружено	Количество яиц в 1 г фекалий
1	ЛП-жеребец Орго	я. стронгилят	до 50 я. в 1г	я. стронгилят	до 400 я. в 1г
2	ЛП-косяк, сборная проба	я. стронгилят	до 215 я. в 1г	я. стронгилят	до 180 я. в 1г
3	Кианг-самец	я. стронгилят	до 600 я. в 1г	я. стронгилят	до 500 я. в 1г
4	Кианги-самки, сборная проба	я. стронгилят я. параскарид	до 400 я. в 1г еденичные	я. стронгилят	до 400 я. в 1г

Таблица 2

Результаты гельминтоооскопии проб фекалий от животных степного стационара «Оренбургская Тарпания» за второе полугодие 2020 г.

№ п/п	Вид животных	Периоды исследования			
		VII-IX		X-XII	
		обнаружено	Количество яиц в 1г фек.	обнаружено	Количество яиц в 1г фек.
1	ЛП-жеребец Орго	я. стронгилят	до 380 я. в 1г	я. стронгилят	до 700 я. в 1г
2	ЛП-косяк, сборная проба	я. стронгилят	до 160 я. в 1г	я. стронгилят	до 140 я. в 1г
3	Кианг-самец	я.стронгилят	до 400 я в 1г	я. стронгилят	до 200 я. в 1г
4	Кианги-самки, сборная проба	я.стронгилят	до 80 я в 1г	я. стронгилят	до 150 я. в 1г

Таблица 3

Результаты гельминтоооскопии проб фекалий от домашних лошадей с Сазан Беляевского района за первое и второе полугодия 2020 г.

№ п/п	Вид животных	Периоды исследования			
		I-III		IV-VI	
		обнаружено	Количество яиц в 1г фек.	обнаружено	Количество яиц в 1г фек.
1	Лошади домашние	я. стронгилят	До 150 я в 1гр	я. стронгилят я. параскарид	до 250 я в 1гр единичные
	Лошади домашние	VII-IX		X-XII	
		обнаружено	Количество яиц в 1г фек.	обнаружено	Количество яиц в 1г фек.
		я. стронгилят	До 300 я. в 1гр	я. стронгилят	До 400 я. в 1гр




Рис. 2. Личинка трихонемы в поле зрения микроскопа (увеличение 200%).

В отдельных пробах фекалий обнаруживались единичные яйца нематод вида *Parascaris equorum*.

У двух лошадей Пржевальского из сборной группы был замечен «зачес» корня хвоста. Это свидетельствует о паразитировании у этих животных нематод вида *Oxyuris equi*.

Копрологические исследования материала от домашних лошадей с. Сазан проводились в аналогичные периоды. Результаты исследований представлены в табл. 3.

Из таблицы следует, что домашние лошади с. Сазан инвазированы теми же видами паразитов, что и лошади стационара. Интенсивность инвазии у домашних лошадей составляет от единичных до 250 яиц в 1 г фекалий. По сведениям местной ветеринарной службы, клинических признаков данных инвазий у домашних лошадей с. Сазан не наблюдалось.

Видовой состав стронгилятозного комплекса у непарнокопытных животных степного стационара и с. Сазан в настоящий период уточняется. По предварительным данным, у непарнокопытных обнаружены представители семейства Strongylidae (*Alfortia edentatus* и *Strongylus equinus*) и Trichonematidae (*Trichonema* sp., рис. 2) в стационаре и частном секторе.

В целом, инвазированность гельминтами непарнокопытных животных степного стационара «Оренбургская Тарпания» и домашних лошадей с. Сазан Беляевского района за отчетный период имела стабильный характер. Отмечались незначительные колебания зараженности в пределах невысокой интенсивности инвазии. Для выяснения сезонной динамики процесса необходимы более длительные наблюдения.

Выводы 1. За отчетный период в степном стационаре «Оренбургская Тарпания» у непарнокопытных животных выявлено паразитирование нематод подотряда *Strongylata* (семейств Strongylidae и Trichonematidae). Видовой состав стронгилят уточняется.

2. Интенсивность стронгилятозной инвазии колебалась от низкой до средней (от единичных до 700 яиц гельминтов в 1 г фекалий). Отмечена более высокая интенсивность инвазии у лошадей Пржевальского, чем у киангов.

3. У лошадей Пржевальского, кроме того, обнаружены нематоды видов *Parascaris equorum* (подотряд Ascaridata) и *Oxyuris equi* (подотряд Oxyurata) при невысокой интенсивности инвазии.

4. У домашних лошадей сопредельной территории (с. Сазан Беляевского района) выявлены те же виды гельминтов, что у непарнокопытных животных стационара при низкой и средней интенсивности инвазии.

5. По всем указанным гельминтозам клинических

признаков в период исследований не отмечено, т. е. инвазии у всех животных протекали в форме носительства.

6. Для определения сезонной динамики выявленных инвазий необходимо проводить длительные наблюдения.

Работа выполнена на базе стационара Института степи ОФИЦ УрО РАН «Оренбургская Тарпания» в рамках НИР ОФИЦ УрО РАН (ИС УрО РАН) «Проблемы степного природопользования в условиях современных вызовов: оптимизация взаимодействия природных и социально-экономических систем» (№ ГР ААА-А-А21-121011190016-1)

Список литературы:

1. Пельгунов А.Н., Маклакова Л.П. Паразитологические аспекты, связанные с акклиматизацией и интродукцией диких копытных // Российский паразитологический журнал, 2013. – № 3. – С. 67–75.
2. Синяков, М.П., Стогначева Г.А. Особенности клинического проявления при паразитозах желудочно-кишечного тракта лошадей // Животноводство и ветеринарная медицина, 2020. – № 4 (39). – С. 38–42.
3. Синяков, М.П., Стогначева Г.А. Особенности клинического проявления при паразитозах желудочно-кишечного тракта лошадей // Животноводство и ветеринарная медицина, 2020. – № 4 (39). – С. 38–42.
4. Zvegintsova N.S., Zharkikh T.L., Kuzmina T.A. Parasites of Przewalski's horses (*Equus ferus przewalskii*) in Askania Nova biosphere reserve (Ukraine) and Orenburg State Nature Reserves (Russia) // Nature Conservation Research, 2019. – Т. 4. – № S2. – С. 8–83.
5. Sazmand A., Bahari A., Papi S., Otranto D. Parasitic diseases of equids in Iran (1931-2020): a literature review // Parasites & Vectors, 2020. – 13: 586. DOI: 10.1186/s13071-020-04472-w.