

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-53-54

РЯБЧИК РУССКИЙ (*FRITILLARIA RUTENICA* Wikstr.) - ЭТАЛОННЫЙ ВИД ЛЕСОСТЕПНЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ ЛАНДШАФТОВ УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ**Масленников Андрей Викторович**

кандидат биологических наук, профессор Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск;
научный сотрудник национального парка «Сенгилеевские горы»

Масленникова Людмила Анатольевна

кандидат биологических наук, доцент Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние популяций редкого и охраняемого вида – рябчика русского (*Fritillaria ruthenica* Wikstr.), как характерного и эталонного вида кальциевых лесостепных ландшафтов Ульяновского Предволжья и отмечается их роль, как центров сохранения этого уязвимого вида.

Ключевые слова: рябчик русский, кальцефил, кальциевые ландшафты, флора, биоразнообразие.

RUSSIAN FRITILLARIA (*FRITILLARIA RUTENICA* WIKSTR.) - A STANDARD VIEW OF FOREST-STEPPE CALCIUM LANDSCAPES OF ULYANOVSK VOLTAGE**Maslennikov Andrey Viktorovich**

Candidate of Biological Sciences, Professor of the Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk;
Researcher of the Sengiley Mountains National Park

Maslennikova Lyudmila Anatolevna

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk

Abstract. The article discusses the current state of a rare and protected species - Russian fritillary (*Fritillaria ruthenica* Wikstr.), as a characteristic and reference species of calcium forest-steppe landscapes of the Ulyanovsk region of the Volga Upland and their role as conservation centers for this vulnerable species.

Keywords: Russian fritillary, calcephilus, calcium landscapes, flora, biodiversity.

Лесостепные кальциевые ландшафты Приволжской возвышенности, развитые на территории Ульяновского Предволжья, в силу исторических, орографических, эдафических и микроклиматических причин и ярко выраженного экотонного эффекта до сих пор являются центрами флористического биоразнообразия и концентрации популяций редких, уязвимых, эндемичных, реликтовых и охраняемых видов сосудистых растений.

Один из таких видов – рябчик русский (*Fritillaria ruthenica* Wikstr.), лесостепной кальцефил и эталонный

вид данных местообитаний, и одновременно индикаторный вид их малой антропогенной нарушенности и высокой природоохранной ценности [3, 7].

Это хорошо подтверждается распространением популяций этого редкого и охраняемого вида [4, 5] по лесостепным урочищам в зоне развития кальциевых ландшафтов на территории Ульяновского Предволжья (рис. 1).




Рис. 1. Распространение рябчика русского (*Fritillaria ruthenica* Wikstr.) по территории Ульяновского Предволжья в зоне развития кальциевых ландшафтов.

На картосхеме хорошо видно приуроченность рябчика русского к черноземно-карбонатным и перегнойно-карбонатным почвам, развитым на меловых, мергелистых и глинистых карбонатных материнских породах.

В фитоценоотическом отношении, рябчик русский как вид-антропофоб может служить индикатором малой антропогенной нарушенности горных меловых сосняков, остепнённых нагорных дубрав и редких в регионе остепнённых липняков, а также кустарниковых, луговых, разнотравных и кострцево-разнотравных степей, развитых в зоне развития кальциевых ландшафтов.

На меловых холмах, останцах и шиханах на самых крутых склонах, на карбонатных породах верхнемелового возраста в Сенгилеевском, Радищевском, Теренгульском, Вешкаймском и Старокулаткинском районах встречаются реликтовые сосняки, образованные сосной меловой (*Pinus sylvestris* L. var. *cretaceae* Kalenicz. ex Kom.) - реликтовым охраня-

емым видом, занесенным в Красную книгу Российской Федерации [4].

Ярусосны в нагорных сосняках обычно разреженный и сомкнутость крон низкая. Кустарниковый ярус также разрежен, иногда вообще не развит и представлен вишней степной, реже - раkitником русским, дроком красильным, кизильником черноплодным и миндалём низким [2, 6]. Проективное покрытие травянистого яруса также невысоко [1].

Благодаря хорошей освещенности в горных сосняках, в травянистом ярусе на полянах, опушках и по разрежениям встречаются редкие и охраняемые степные растения, такие как тимьян клоповый (*Thymus cimicinus* Blum ex Ledeb.) и рябчик русский (*Fritillaria ruthenica* Wikstr.) [4], василек русский, скабиоза исетская, адонис весенний, осока стоповидная [5], а также произрастают виды-кальцефилы, такие как оносма простейшая, лазурник трехлопастной и лён желтый [7, 8]. Рябчик русский, как правило, образует в нагорных и остепненных лесах небольшие популяции. Так, в Сенгилеевских горах, средняя плотность его популяций составляет 4 – 7 особей на 1 м², и он служит видом, показывающим относительно малую нарушенность данных растительных сообществ.

Рябчик русский также произрастает и в кустарниковых степях, которые развиты по вершинам оврагов и на окончаниях гребней, а также окружают лесные массивы лесостепных урочищ. В настоящее время в Ульяновском Предволжье преобладают кустарниковые степи со спиреей городчатой, иногда с примесью вишни степной, кизильника черноплодного и миндальника низкого. В травяном ярусе на многих участках доминирует земляника зеленая и кострец береговой, на некоторых - может преобладать душица обыкновенная. Также обильны подмаренник настоящий, типчак, вейник наземный, есть участки, где обилен рябчик русский (*Fritillaria ruthenica* Wikstr.), средняя плотность его популяций во многих урочищах составляет 8 – 15 особей на 1 м².

В нашем регионе на территории национального парка «Сенгилеевские горы» в 6 км южнее села Шиловка в кустарниковых степях отмечены очень крупные популяции рябчика русского (*Fritillaria ruthenica* Wikstr.). Плотность популяции на отдельных участках достигает 24 – 30 особей на 1 м², он хорошо цветет и плодоносит, что позволяет надеяться на постепенное восстановление численности этого редкого вида и в других рядом расположенных степных сообществах.

Луговые степи также являются характерными сообществами, вмещающими популяции рябчика русского. В Ульяновском Предволжье они обычно занимают вершины гребней и северные склоны холмов и балок. Из злаков преобладает кострец береговой, а также встречаются овсец опушенный, мятлик узколистный, типчак. Наиболее распространен-

ными являются кострецово-вязелево-земляничные, кострецово-разнотравные, кострецовые, а на юге региона и *кострецово-пионовые ассоциации*. В некоторых группировках обилен типчак (*Festuca valesiaca* Gaudin.). На участках с более низким травостоем встречаются ветреница лесная (*Anemone sylvestris* L.) и ирис безлистный (*Iris aphylla* L.) [4], а также гониолимон высокий [5], тимьян Маршалла и подмаренник настоящий. Проективное покрытие высокое и часто составляет 100% [7].

Популяции рябчика русского в луговых степях часто имеют разную плотность, которая зависит от антропогенной нагрузки. Так в луговых степях Арской лесостепи, подвергающихся сенокосению и периодическим весенним пожарам популяции рябчика русского невелики и их плотность мала 1–3 растения на 1 м². В Сенгилеевских горах на территории национального парка отмечены очень крупные для нашего региона популяции этого вида, приуроченные к луговым степям на черноземно-карбонатных почвах. Плотность популяций на отдельных участках достигает 22–30 особей на 1 м², рябчик ежегодно хорошо цветет и плодоносит. К естественным лимитирующим факторам следует отнести его активное поедание кабанами, что часто приводит к сильному сокращению популяций рябчика на участках луговых степей, прилегающих к крупным лесным массивам.

В заключение следует отметить, что только сохраняя лесостепные урочища – центры развития кальциевых ландшафтов Ульяновского Предволжья, мы сохраним и популяции редкого и охраняемого вида – рябчика русского, по встречаемости и плотности популяций которого легко определить степень антропогенного прессинга на растительные сообщества, для которых он является характерным индикаторным видом-антропофобом.

Список литературы:

1. Благовещенский В.В. Растительность Приволжской возвышенности в связи с её историей и рациональным использованием. - Ульяновск, 2005. - 715 с.
2. Благовещенский В.В., Раков Н.С. Сенгилеевские горные сосняки // Ценные ботанические объекты Ульяновской области. - Ульяновск: УПГУ, 1986. - С. 18–22.
3. Благовещенский В.В., Раков Н.С., Шустов В.С. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области. - Саратов: Приволжск. кн. изд-во, 1989. - 96 с.
4. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). - М., 2008. - 782 с.
5. Красная книга Ульяновской области /Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, А.В. Масленникова, М.В. Корепова; Правительство Ульяновской области. - Москва: Издательство «Буки Веди», 2015. - 550 с.
6. Масленников А.В. Кальцефильная флора центральной части Приволжской возвышенности. - Ульяновск, 2005. - 162 с.
7. Масленников А.В. Флора кальциевых ландшафтов Приволжской возвышенности. - Ульяновск, 2008. - 136 с.
8. Масленников А.В., Шалдыбина Л.А. К анализу флоры и растительности Шилловской лесостепи //Состояние растительных ресурсов Восточной Европы: Тез. междунар. совещ. - Ульяновск, 1992. - С. 145-147.