

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-64-65

ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ МИКРОЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA: NEPTICULIDAE, GRACILLARIIDAE) УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мищенко Андрей Владимирович

кандидат биологических наук, доцент кафедры географии и экологии Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

Артемьева Елена Александровна

доктор биологических наук, профессор кафедры географии и экологии Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. В статье рассматриваются фауна и экология минирующих молей семейств Nepticulidae и Gracillariidae Ульяновской области.

Ключевые слова: моли, фауна, экология.

FAUNA AND ECOLOGY OF MICROLEPIDOPTERA (LEPIDOPTERA: NEPTICULIDAE, GRACILLARIIDAE) OF THE ULYANOVSK REGION

Mishchenko Andrey Vladimirovich

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Geography and Ecology of Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk

Artemyeva Elena Aleksandrovna

Doctor of Biological Sciences, Professor of the Department of Geography and Ecology of Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk

Abstract. The article deals with the fauna and ecology of mining moths of the families Nepticulidae and Gracillariidae of the Ulyanovsk region.

Keywords: moths, fauna, ecology.

Микрочешуекрылые – небольшие бабочки, имеющие размеры около 3–10 мм в размахе крыльев. В Ульяновской области обнаружено 84 вида данной группы, относящиеся к семействам Nepticulidae и Gracillariidae [1, 2]. Большинство видов ведут минирующий образ жизни, т. е. развиваются на личиночной стадии внутри растительных тканей (чаще листьев), образуя повреждения различной формы (мины). Отдельные представители наносят существенный вред кормовым растениям, заселяя в массе листву, вызывая дефолиацию и угнетение растений [3].

Сбор насекомых осуществлялся приманиванием на свет, кошением, а также выведением имаго из мин на листьях кормовых растений. Определение представителей семейства Gracillariidae велось по ключам В.И. Кузнецова [4], где детально разработана методика определения видов бабочек по генитальным структурам самцов. Препараты гениталий изготавливались путем кипячения брюшка бабочки в 10% растворе гидроксида натрия в течение 10 минут, в

результате чего разрушалась мышечная ткань насекомого и внутренности. После этого брюшко промывалось в дистиллированной воде, и с его поверхности препаративной иглой удалялись чешуйки. Затем готовый препарат с хорошо различимыми генитальными структурами помещался в раствор глицерина для длительного хранения. Гениталии самцов отличаются друг от друга строением таких структур как вальвы, эдеагус, расположением щетинок и т.д. Следует отметить, что диагностика по другим особенностям строения затруднена (окраска крыльев, строение отдельных сегментов тела и т. д.) вследствие малых размеров бабочек данного рода и значительной изменчивости данных структур даже в пределах одного вида. Для определения использовались бинокулярный и оптический микроскопы МБС-9 и Микмед-1.

Определение представителей семейства Nepticulidae велось по характерным повреждениям растительных тканей (обычно листовой пластинки) – минам, которые у различных видов могут иметь характерную форму (спиралевидную, пузыревидную, змеевидную и т. д.). Кроме того, виды данного семейства приурочены чаще всего к определенным кормовым растениям, что значительно облегчает определение на стадии личинки. Представителей этого семейства можно определить и по генитальным структурам самцов и самок, но из-за незначительных размеров имаго, а также вследствие трудности изготовления генитальных препаратов и препаровки в данной работе была выбрана методика диагностики по минирующим повреждениям.

В ходе проведенных исследований с территории области было выявлено 56 представителей семейства Nepticulidae, относящихся к 4 родам: *Stigmella* (40 видов), *Ectoedemia* (14 видов), *Trifurcula* (3 вида) и *Bohemannia* (1 вид), а также были описаны 28 видов рода *Phyllonorycter* (семейство Gracillariidae). 6 видов Nepticulidae указываются впервые для фауны России: *Stigmella freyella* (отмечена на *Calystegia sepium*); *S. nivenburgensis* (на *Betula pendula*); *S. paradoxa* (на *Grataegus* sp.); *S. perpygmaeella* (на *Grataegus* sp.); *Ectoedemia atricollis* (на *Malus domestica*) и *E. spinosella* (на *Prunus spinosa*). Отмечена строгая приуроченность видов к конкретным кормовым растениям. Большинство нептикулид связано с *Rosaceae* – 38%; *Betulaceae* и *Salicaceae* – по 16% соответственно и *Fagaceae* – 14%. Большая часть *Phyllonorycter* связана с ивовыми – 24%; розоцветными и березовыми – 16% и буковыми – 12%. Большинство представителей являются монофагами, гусеницы которых минируют в основном листья древесных растений. Лишь отдельные виды развиваются на травянистых бобовых (*Fabaceae*) – род *Trifurcula* (Nepticulidae), *Ph. medicaginella*, *Ph. mgrescentella* (Gracillariidae); минируют кору дуба *Quercus robur* –

E. liebwerdella и крылатки клена *Acer platanoides* – *E. sericopeza*. Описанные виды минеров не наносят существенного вреда кормовым растениям, на которых они развиваются. Исключением является представитель так называемых видов-вселенцев – *Ph. issikii*, заселяющий липу и наносящий существенный вред данному растению. Вид проник на территорию Ульяновской области в начале 80-х годов XX века, успешно адаптировался к местным природным условиям и размножился.

Список литературы

1. Мищенко А.В., Золотухин В.В. Минирующие моли-пестрянки рода *Phyllonorycter* Hbn., 1822 (Lepidoptera: Gracillariidae) фауны Ульяновской области // Природа Симбирского Поволжья. Сборник научных трудов. Ульяновск. – 2003. – Вып. 4. – С. 47–53.
2. Мищенко А.В. Обзор минирующих молей-пестрянок рода *Phyllonorycter* Hubn. (Lepidoptera, Gracillariidae) Среднего Поволжья и таблица для определения видов с использованием морфологических особенностей гениталий самок // Энтомологическое обозрение. – 2014. – Т. 93. Вып. 2. – С. 448–455.
3. Мищенко А.В. Эколого-фаунистический и зоогеографический анализ минирующих чешуекрылых семейств Gracillariidae и Nepticulidae (Lepidoptera) Среднего Поволжья // Наука Online. – 2020. – № 3 (12). – С. 1–7.
4. Кузнецов В.И. Сем. Gracillariidae – Моли-пестрянки // Определитель насекомых европейской части СССР / под общ. ред. Г. С. Медведева. – Л.: Наука, 1981. – Т. IV. Чешуекрылые. Ч. 2. – С. 149–311.