

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-55-56

К ВОПРОСУ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИРУЮЩИХ НАСЕКОМЫХ ЛЕСОСТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Мищенко Андрей Владимирович

кандидат биологических наук, доцент Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. Биологический контроль над численностью минирующих чешуекрылых является перспективным направлением современной энтомологии. Всё возрастающая роль минёров как вредителей создаёт необходимость в поиске видов насекомых-энтомофагов, активное использование которых позволит ограничить применение инсектицидов.

Ключевые слова: минирующие моли, мины, инвазивные виды, паразитоиды, паразитокомплекс.

ON THE ISSUE OF BIOLOGICAL CONTROL OF MINING INSECTS OF FOREST-STEPPE LANDSCAPES OF THE MIDDLE VOLGA

Mishchenko Andrey Vladimirovich

PhD, assistant professor of Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk

Abstract. The biological control of pests is an important branch of modern entomology. The leaf-mining moths are important in nature and agriculture, as well as a pest.

Keywords: leaf-mining moths, mines, invasive species, parasitoids, parasitocomplex.

В результате проведённых исследований, с 32 видов минирующих чешуекрылых Среднего Поволжья было выведено 44 вида паразитических перепончатокрылых (всего 955 экземпляров). Выявленные моли относятся к 3 семействам: Nepticulidae (роды *Stigmella* и *Ectoedemia*), Gracillariidae (род *Phyllonorycter*) и Tischeriidae (род *Tischeria*). Выведенные паразитоиды относятся к семейству Eulophidae: подсемейство Eulophinae (роды *Cirrospilus*, *Diaulinopsis*, *Elachertus*, *Hyssopus*, *Hemiptarsenus*, *Prigalio* и *Sympiesis*), подсемейство Entedoninae (роды *Achrysocharoides*, *Closterocerus*, *Chrysocharis*, *Neochrysocharis*, *Omphale* и *Pediobius*) и подсемейство Tetrastichinae (роды *Aprostocetus*, *Minotetrastichus*, *Mischotetrastichus* и *Oomyzus*).

Значительным видовым разнообразием выводимых паразитоидов отличаются представители рода *Phyllonorycter* (выведено 96% от общего числа экземпляров паразитоидов, представлено 85% видов от всего комплекса). Виды паразитоидов из родов *Diaulinopsis*, *Elachertus*, *Hyssopus*, *Hemiptarsenus*, *Sympiesis*, *Achrysocharoides*, *Closterocerus*, *Neochrysocharis*, *Omphale*, *Aprostocetus*, *Mischotetrastichus* и *Oomyzus* выведены только с личинок и куколок *Phyllonorycter*. Среди 36 видов эвлофид, выведенных с *Phyllonorycter*, 20 эндо- и

16 эктопаразитических, в основном солитарные виды.

В ходе исследований в Среднем Поволжье был выявлен один вредоносный вид чешуекрылых, липовая моль-пестрянка *Phyllonorycter issikii*, заселяющий липу; а также потенциальный вредитель *Ph. comparella*, минирующий листья белого тополя. *Ph. issikii* даёт до трёх генераций за вегетационный период, образуя многочисленные (до 22 на одном листе) мины. В результате этого оказывается поражённой значительная площадь листовой поверхности, которая не участвует в фотосинтезе. Следует отметить, что *Ph. issikii* является заносным видом, и не встречался в Среднем Поволжье до 80-х годов прошлого века [1]. Инвазия вида создаёт угрозу его кормовым растениям, произрастающим в регионе – *Tilia cordata* и *T. platyphyllos*. Наибольшее количество видов эвлофид было выведено именно с *Ph. issikii*, что, вероятно, говорит о переходе представителей местной паразитофауны на нового хозяина и несформированном пока устойчивом экологическом равновесии в системе паразит-хозяин. Доминирующими видами паразитоидов, выведенных с *Ph. issikii*, являются *Sympiesis gordius* и *Minotetrastichus frontalis* (37% и 31% соответственно от всего выведения с липовой моли-пестрянки). Эти виды паразитоидов в некоторой степени (приблизительно на 20%) снижают численность *Ph. issikii*, что не является достаточным для того, чтобы остановить её инвазию, так как поражённость липы в Среднем Поволжье остаётся значительной.

Значительный всплеск численности наблюдался для *Phyllonorycter comparella*, о чём позволяет судить увеличение количества мин на листьях кормового растения тополя белого. В ходе полевых исследований их наблюдалось 3-4 на одном листе, в то время как большинство представителей рода *Phyllonorycter* Среднего Поволжья даёт не более 1-2 мин. *Ph. comparella* не наносит существенного урона тополю в районе исследований, но, возможно, роль его как потенциального вредителя в ближайшие годы будет возрастать. Доминирующим паразитоидом этой моли является *Minotetrastichus frontalis* (55% от всего выведения с *Ph. comparella*).

Тенденцией к образованию большого числа мин в Среднем Поволжье обладают также такие виды как *Phyllonorycter emberizaepennella*, *Ph. medicaginella*, *Ph. pastorella*, поэтому можно сделать предположение об их потенциальной вредоносности. Данные показывают, что наиболее часто в выведении доминирующими являются *Minotetrastichus frontalis* и разные паразитоиды рода *Chrysocharis*. Данные виды, видимо, играют значительную роль в ограничении численности минёров рода *Phyllonorycter* в Среднем Поволжье.

С видов семейства Nepticulidae было выведено 3% всех паразитоидов. Необходимо отметить, что были

выведены виды, не встречающиеся в выведениях с других семейств. Это виды рода *Chrysocharis*: *C. pentheus*, *C. pubens* и *C. viridis*, а также вид *Cirrospilus vittatus*. Преобладают в выводке *C. pentheus* и *C. viridis* (24% и 17% соответственно). Среди выведенных эвлофид 4 являются эктопаразитическими видами и 4 эндопаразитоида (отношение 1:1), все солитарные. Отношение самок и самцов составило приблизительно 2:1. Находки видов Nepticulidae Среднего Поволжья в естественных условиях редки, а количество минирующих повреждений на листьях кормовых растений минимально; поэтому минёры этого семейства не являются вредителями в районе исследований [2, 3].

Менее 1% паразитов выведено с Tischeriidae. С вида *Tischeria ekebladella* выведены *Chrysocharis submutica* и *Pediobius flaviscapus*, не встречающиеся в выведениях с других семейств чешуекрылых. Преобладающим в выведении является *Chrysocharis laomedon* (57%). Все выведенные паразитоиды являются эндопаразитическими; половой состав эвлофид характеризуется наличием в выведении только самок. Вред, наносимый молью *T. ekebladella* кормовому растению (*Quercus robur* L.) в природных условиях Среднего Поволжья, невелик.

В целом комплекс паразитоидов минирующих молей включает 44 вида эвлофид. Преобладающими в комплексе паразитоидов минирующих молей являются виды *Minotetrastichus frontalis* (26%), *Sympiesis gordius* (26%), *Chrysocharis laomedon* (9%), *Sympiesis sericeicornis* (8%) и *Prigalio soemius* (8%). На долю этих видов приходится 77% всех выведенных паразитоидов. В ходе проведённых исследований была проведена оценка вредоносности видов минирующих чешуекрылых Среднего Поволжья. Наибольший ущерб кормовым растениям в районе исследований наносят моли рода *Phyllonorycter* (Gracillariidae). Виды *Phyllonorycter* в Среднем Поволжье используют в качестве кормовых растения из 20 семейств; преобладают виды, развивающиеся на розоцветных, ивовых и буковых. В комплексе паразитоидов *Phyllonorycter* значительный сдерживающий эффект принадлежит

виду *Minotetrastichus frontalis*, который наиболее часто встречается в выведениях с Gracillariidae и в целом преобладает в комплексе всех минёров Среднего Поволжья (составляет 26% от общего числа экземпляров). Следует отметить также большую роль в сдерживании минёров паразитических эвлофид рода *Chrysocharis*, которые также доминируют в комплексе *Phyllonorycter*. Как злостный вредитель отмечен один вид - *Phyllonorycter isskii*. Комплекс паразитоидов этого вида составляют 16 видов эвлофид; наибольший сдерживающий эффект оказывают виды *Sympiesis gordius* и *Minotetrastichus frontalis*, которые преобладают в выведениях с липовой моли и вместе составляют 68% от общего числа экземпляров эвлофид. Как потенциальные вредители отмечены виды *Ph. comparella*, *Ph. emberizaepennella*, *Ph. medicaginella* и *Ph. pastorella*. Среди других семейств минирующих чешуекрылых вредоносных видов не выявлено.

Всё возрастающее антропогенное влияние на среду, изменения климата с повышением среднемесячных температур, появление в районе исследований вредоносных видов, ранее здесь не отмечавшихся, позволяет сделать предположение о возможной инвазии на территорию Среднего Поволжья новых чешуекрылых-минёров, а также о возможности увеличения роли эндемичных видов молей, заявленных как потенциальные вредители. В этих условиях становится всё более весомым значение паразитических эвлофид как фактора сдерживания численности насекомых-вредителей.

Список литературы:

1. Золотухин В.В. О некоторых членистоногих-вселенцах на территории Ульяновской области. // Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. трудов. Ульяновск. - 2002. - Вып. 2. - С. 200-203.
2. Мищенко А.В. 2006. Комплекс чешуекрылых-минёров зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum* L.) Ульяновской области // Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. трудов. - 2006. - Вып. 7. - С. 137-140.
3. Nieuwerkerken E.J. van, Zolotuhin V.V., Mistchenko A.V. Nepticulidae from Volga and Ural region // Nota lepidopterologica. - 2004. - №27. - P. 125-157.