DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-62-63

ВЛИЯНИЕ СМЕШАННОЙ ГНИЛИ ОТ ТРУТОВИКА НАСТОЯЩЕГО НА НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ БЕРЕЗОЙ ПОВИСЛОЙ

Митрофанова Наталья Александровна
кандидат биологических наук, доцент Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск
Гнусарев Сергей Сергеевич
Заместитель начальника отдела защита леса и государственного лесопатологического мониторинга Филиала ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Ульяновской области», г. Ульяновск
Чураков Борис Петрович
доктор биологических наук, профессор Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск
Рассадина Екатерина Владимировна
кандидат биологических наук, доцент Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск

Аннотация. Проводилось исследование влияния смешанной гнили от трутовика настоящего на накопление тяжелых металлов (медь, цинк, никель, кадмий, свинец, кобальт, железо) березой повислой
Ключевые слова: настоящий трутовик, смешанная гниль, тяжелые металлы, береза повислая.

THE EFFECT OF MIXED ROT FROM THE PRESENT TINDER ON THE ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN THE HANGING BIRCH

Mitrofanova Natalia Alexandrovna
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Ulyanovsk State University, Ulyanovsk
Gnusarev Sergey Sergeevich
Deputy Head of the Department of Forest Protection and State Forest Pathological Monitoring of the Branch of the Federal State Institution "Roslesozashchita" - "TsZL of the Ulyanovsk Region", Ulyanovsk
Churakov Boris Petrovich
Doctor of Biological Sciences, Professor of Ulyanovsk State University, Ulyanovsk
Rassadina Ekaterina Vladimirovna
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Ulyanovsk State University, Ulyanovsk

Abstract. A study was conducted on the effect of mixed rot from the present tinder on the accumulation of heavy metals (copper, zinc, nickel, cadmium, lead, cobalt, iron) by hanging birch
Keywords: real tinder, mixed rot , heavy metals, hanging birch.

На состояние и продуктивность березовых насаждений сильное влияние оказывают грибы-деструкторы. Одним из таких грибов является трутовик настоящий (Fomes fomentarius(L.:Fr.) Gill.), вызывающий у березы повислой белую смешенную гниль. Данный патоген широко распространён в лесах Ульяновской области (площадь очагов на 01.01.2021 года составляет 412,4 га), негативно влияет на санитарное и лесопатологическое состояние насаждений и наносит колоссальный экономический ущерб ввиду снижения товарных качеств древесины.

Задача исследования – исследовать накопление ТМ (медь (Cu), цинк (Zn), никель (Ni), кадмий (Cd),свинец (Pb), кобальт (Co), железо (Fe)) и радиоактивного нуклидаCs-137 в системе почва–дерево–трутовик (почва–береза повислая–трутовик настоящий).

Одним из основных антропогенных факторов оказывающих негативное влияние на лесные насаждения является загрязнение тяжелыми металлами и радиоактивными нуклидами. Особый интерес представляет изучение содержания и миграции тяжелых металлов и радиоактивного нуклида Cs-137 в системе почва – дерево – трутовик настоящий, а также влияние патогена на накопление данных элементов.

В настоящее время ввиду бурного развития промышленного сектора, транспорта, энергетики и других отраслей экономики, негативно влияющих на экосистемы, острой проблемой становится загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами и радиоактивными нуклидами.

Тяжелые металлы – химические элементы, имеющие свойства металлов (полуметаллов) и большой атомный вес. Элементы данной группы высокотоксичные, подвижные, способны к биоаккумуляции. К ним относятся медь, цинк, никель, кадмий, свинец, кобальт, железо и др.

В данной работе представлены исследования содержания и миграции тяжелых металлов и радиоактивного нуклида **Cs-137** в системе почва – береза провислая – трутовик настоящий в целях биоиндикации техногенного загрязнения.

Исходя из полученных данных, пришли к выводу, что наибольшее содержание данного элемента в системе почва–дерево–гриб выявлено в почве (13,45 мг/кг), содержание в древесине и теле гриба ниже ввиду того, что медь малоподвижный металл и его активность напрямую зависит от свойств почвы, её структуры. Высокое содержание меди в теле гриба относительно древесины можно объяснить тем, что данный элемент входит в состав ферментов участвующих в разложении древесины, в частности целлюлозы.

При анализе наибольшее содержание цинка было выявлено в почве 12,11 мг/кг, в древесине данный показатель был равен 8,55 мг/кг, в трутовике настоящим – 9,45 мг/кг. Такое содержание цинка в данной системе обусловлено в первую очередь тем, что растения накапливают цинк в корневой системе и только при сильном избытке, металл мигрирует в верхние части растения [1]. Высокое содержание цинка в трутовике относительно древесины связано снепосредственным участием данного элемента в построении белков макромицетов.

В результате проведенного анализа выявлено, что содержание никеля в почве 10,79 мг/кг, древесине 3,02 мг/кг, плодовом теле трутовика 4,83 мг/кг. Полученные данные показывают, что содержание данного металла в трутовике настоящем выше, чем в древесине, но ниже чем в почве.

Кадмий (Cd) – один из самых опасных тяжелых металлов, активно поглощаться корневой системой и листьями.Высокое содержание кадмия способствует замедлению роста растения, негативно влияет на образование репродуктивных органов и содержание пигментов в листовых пластинках [2]. Анализ содержания кадмия в системе почва-дерево-гриб показал относительно постоянную концентрацию (0,38–0,58 мг/кг). Это обусловлено подвижностью элемента, его способностью легко поступать через корневую систему в растение, а затем и в тело гриба.

Свинец (Pb) – высокотоксичный для растений элемент. Может поступать в растение, как из почвы, так и из атмосферы.Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что содержание свинца в почве 9,15 мг/кг, древесине 8,55 мг/кг, трутовике10,12 мг/кг.Анализируя его содержания в системе, почва-дерево гриб можно сделать вывод, что трутовик настоящий способен аккумулировать данный элемент, это обусловлено тем, что свинец легко передается по цепям и аккумулируется на конечном элементе системы. Так же стоит отметить, что содержание и миграция свинца сильно зависит от свойств почвы и рельеф.

Кобальт (Co) – относительно распространенный элемент, его содержание кобальта увеличивается по мере продвижения по трофической группе почва-дерево-гриб (от 2,54 мг/кг до 3,54 мг/кг). Концентрация кобальта в трутовике настоящим в 1,4 раза выше, чем в почве и в 1,2 выше, чем в древесине.

Анализ на нахождения железа показал наибольшую концентрацию в системе относительно других металлов (почва – 155,25 мг/кг; древесина – 89,58мг/кг; гриб – 75,24 мг/кг). Концентрация железа в трутовике в 2 раза ниже, чем в почве. Уменьшение содержания железа по трофической системе обусловлено трудной растворимость солей железа, что в свою очередь затрудняет его поглощение растениями.

Цезий-137(Cs-137) – долгоживущий радионуклид, представляющий особую биологическую опасность. Отличается высокой биологической активностью и подвижностью. При анализе содержания данного элемента в трофической системе получены следующие результаты: содержание Cs-137 в почве 820,63 Бк/кг, в древесине 3,89 Бк/кг, в трутовике 6,58 Бк/кг. Содержание цезия в древесине и трутовике значительно ниже, чем в почве ввиду того, что Cs-137 сильнее сорбируется почвой и потому в относительно меньших количествах переходит в древесные растения.

Подводя итог сказанному выше, стоит отметить, что концентрация тяжелых металлов и радиоактивного нуклида Cs-137 в пробах почвы, древесина, трутовика была в пределах естественного фона и не превышала предельно допустимых значений.

Среди всех исследуемых металлов наибольшая концентрация в системе почва–дерево–трутовик у железа, наименьшая у кадмия.

При исследовании выявлена следующая закономерность, что при переходе в трофической цепи от почвы к дереву, концентрация тяжелых металлов и радионуклида Cs-137 снижается, за исключение кобальта, где наблюдается аккумуляция элемента в древесине. Связно это с тем, что многие тяжёлые металлы находятся в почве в труднодоступной форме или же накопление металла происходит только в корневой системе и только при достижении предельных концентраций мигрирует в верхние части растения. В цепи дерево-трутовик можно наблюдать увеличение концентрации при переходе к высшему трофическому звену (трутовику). Это объясняется тем, что многие элементы входят в состав ферментов участвующих в разложении древесины, а так жебиоаккумулятивной способностью патогена.

Таким образом, накопление тяжелых металлов и радионуклидов в системе почва-дерево-трутовик настоящий, в основном, зависит от свойств самого элемента, биологических особенностей гриба, дерева и условий их произрастания. Так же можно утверждать, что трутовик настоящий можно использовать в качестве биоиндикатора загрязнения кобальтом и свинцом окружающей среды.

Список литературы:

1. Губин А.Н. Кадмий в системе: торфяная низинная почва – растение // Плодородие. – 2007. – №2. – С.35–36.
2. Каббата-Пендис А. Микроэлементы в почвах и растениях. – М.: Мир, 1989. – 439 с.