

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-157-158

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРОГО МОРСКОГО ПЕТУШКА *ALECTRIAS ALECTROLOPHUS* (STICHAETIDAE) ИЗ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД О-ВА КРАШЕНИННИКОВА (АВАЧИНСКИЙ ЗАЛИВ)**Мурашева Мария Юрьевна**

младший научный сотрудник, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский

Токранов Алексей Михайлович

доктор биологических наук, старший научный сотрудник, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский

Аннотация. Дана биологическая характеристика (размерно-возрастная структура, соотношение полов, состав пищи) бурого морского петушка *Alectrias alectrolophus* из прибрежных вод о-ва Крашенинникова (Авачинский залив). Приведены сведения о местах его нахождения в приливно-отливной зоне этого острова.

Ключевые слова: бурый морской петушок, литораль, Камчатка, остров Крашенинникова, встречаемость, размерно-возрастная структура, состав пищи

BIOLOGICAL CHARACTER OF STONE COCKSCOMB *ALECTRIAS ALECTROLOPHUS* (STICHAETIDAE) OF COASTAL WATERS OF KRASHENINNIKOV ISLAND (AVACHA GULF)**Murasheva Marya Yurievna**

Junior science, Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute of Far Eastern Branch of RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky

Tokranov Alexey Mikhailovich

Doctor of Biological Sciences, Senior science, Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute of Far Eastern Branch of RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky

Abstract. The biological character (size-age structure, sexual correlation, food composition) of stone cockscomb *Alectrias alectrolophus* of coastal waters of Krasheninnikov Island is given. Data on occurrence of its species in intertidal zone of this island are presented.

Key words: stone cockscomb, intertidal zone, Kamchatka, Krasheninnikov Island, occurrence, size-age structure, food composition

Бурый морской петушок *Alectrias alectrolophus* - типичный представитель литоральных рыб, который постоянно обитает в период открытой воды в приливно-отливной зоне, оставаясь здесь в укрытиях под камнями и в лужах во время отливов [1, 5, и др.]. Во многих районах (в том числе, на литорали Авачинской губы и о-ва Старичков Авачинского залива) в галечно-валунных биотопах он считается массовым или доминирующим видом рыб [5, 6, 8, 10, 12, и др.]. В прибрежье о-ва Крашенинникова, расположенного в северной части Авачинского залива и входящего в состав Налычевского природного парка, согласно имеющимся в коллекционных фондах

КФ ТИГ ДВО РАН материалам, бурый морской петушок в летний период также постоянно встречается в приливно-отливных лужах. Несмотря на это, сведения о его биологии здесь до настоящего времени совершенно отсутствуют. В конце июня 2021 г. при проведении исследований по теме «Изучение восстановительного потенциала прибрежных экосистем юго-восточной Камчатки, динамики популяций морских млекопитающих в условиях масштабных ВЦВ в водах Камчатки и прилегающих акваторий дальневосточных морей России в районах массовой гибели гидробионтов» в рамках договора о научном сотрудничестве с КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» одним из авторов был собран материал, анализ которого позволяет получить представление о встречаемости, размерно-возрастной структуре и составе пищи бурого морского петушка в прибрежных водах о-ва Крашенинникова.

Материалом для настоящего сообщения послужили сборы, выполненные в приливно-отливной зоне о-ва Крашенинникова 25 июня 2021 г. во время одного из максимальных отливов. Бурого морского петушка ловили руками в приливно-отливных лужицах под камнями. Выловленных особей этого представителя литоральной ихтиофауны фиксировали в 6% формалине, а затем в лабораторных условиях измеряли с точностью до 1 мм (*TL*) и взвешивали с точностью до 0,1 г. Всего поймано и подвергнуто биологическому анализу 70 экз. бурого морского петушка. В дальнейшем результаты измерений длины с помощью имеющегося размерно-возрастного ключа были переведены на возраст. Обработку содержимого желудков всех исследованных особей бурого морского петушка вели количественно-весовым методом в соответствии с «Методическим пособием...» [3]. Статистическую обработку проводили по общепринятой методике [2].

Результаты выполненных 25 июня 2021 г. исследований позволяют сделать вывод, что в летние месяцы во время отливов бурый морской петушок встречается главным образом в прибрежье с северной стороны о-ва Крашенинникова, наиболее защищённой от волновой деятельности. Встречаемость этого вида в обследованных приливно-отливных лужах под камнями колебалась от 1 до 6 экз. Большинство особей было обнаружено на расстоянии до 1 м от уровня максимального отлива.

Бурый морской петушок является мелким, короткоцикловым видом сем. Stichaeidae, наибольший зарегистрированный размер которого в Авачинской губе, по нашим данным за 1988-2021 гг., составляет 143 мм, масса тела – 15,9 г, а предельный возраст – 7 лет [4]. В прибрежных водах о-ва Крашенинникова в июне 2021 г. он был представлен особями размером 50-131 (в среднем 82,4±2,7) мм с массой тела 0,3-11,4 (в среднем 3,4±0,4) г в возрасте от 1 до 7 лет, большую часть из которых со-

ставляли двух- (1+) и четырёхлетки (3+) – соответственно 31,4 и 34,3%. Причём среди его самцов доминировали двух- и четырёхлетки (соответственно 34,9 и 48,8%) длиной 51-70 (32,5%) и 81-90 (41,9%) мм с массой тела менее 4 г (90,6%), тогда как среди самок – двух- и четырёх-пятилетки (соответственно 22,2 и 44,4%) размером 51-70 (25,9%) и 105-120 (29,8%) мм с массой тела до 3 (43,5%) и 9-10 (14,8%) г. Относительное количество первых в прибрежных водах о-ва Крашенинникова, также как в Авачинской [5], Тауйской губах [9] и в прибрежье о-ва Старичков [6], по нашим данным, выше, чем вторых (соответственно 61,4 и 38,6%).

Согласно имеющимся в литературе данным, по типу питания бурый морской петушок - бентофаг, использующий в пищу различных мелких донных беспозвоночных, в первую очередь, ракообразных, моллюсков и червей [1, 6, 7, 11, и др.]. Результаты наших исследований свидетельствуют, что, несмотря на достаточно широкий спектр питания, включающий представителей 10 различных систематических групп, в июне основной пищей бурому морскому петушку в приливно-отливной зоне о-ва Крашенинникова, как и в других районах его обитания [1, 5-7, 9], служили бокоплавы Amphipoda, доля которых составляет 65,9% массы пищи (таблица). Заметную роль (22,7% по массе) играли также равноногие раки Isopoda (табл.1). В отличие от прибрежных вод о-ва Старичков, где существенную долю в рационе бурого морского петушка (28,3% по массе) занимают многощетинковые черви [6], в приливно-отливной зоне о-ва Крашенинникова их значение не превышает 4,2%.

Таблица 1.

Состав пищи (в % по массе) бурого морского петушка в прибрежных водах о-ва Крашенинникова (25 июня 2021 г.).

Компонент	Длина, мм			В целом
	менее 80	81-110	более 110	
Isopoda	6,0	11,5	39,0	22,7
Amphipoda	80,9	75,0	52,1	65,9
Прочие	13,1	13,5	8,9	11,4
Число рыб, экз.	29	31	10	70

Хотя бокоплавы служат главной пищей (от 52,1 до 80,9% по массе) всех особей бурого морского петушка (таблица), у самых крупных рыб (свыше 110 мм) их доля сокращается более, чем в 1,5 раза по сравнению с молодью (менее 80 мм), однако резко возрастает (с 6,0 до 39,0%) потребление ими равноногих раков (таблица). Подобные различия в соотношении основных потребляемых пищевых объектов (бокоплавов и равноногих раков), очевидно, снижают пищевую конкуренцию

у особей бурого морского петушка разных размеров, обитающих в одном биотопе.

Результаты выполненных исследований позволяют сделать вывод, что в летний период бурый морской петушок, судя по всему, постоянно встречается в приливно-отливной зоне о-ва Крашенинникова. Нахождение здесь в июне 2021 г. его особей в возрасте от 1 до 7 лет, наглядно свидетельствует, что сложившаяся осенью 2020 г. в прибрежных водах Южной Камчатки неблагоприятная экологическая обстановка, вызвавшая массовую гибель донных морских организмов, не оказала сколь-нибудь значительного воздействия на численность и размерно-возрастную структуру этого представителя литоральной ихтиофауны.

Список литературы:

1. Андрияшев А.П. Рыбы северных морей СССР. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1954. - 566 с.
2. Лакин Г.Ф. Биометрия. - М.: Высшая школа, 1980. - 292 с.
3. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. - М.: Наука, 1974. - 254 с.
4. Мурашева М.Ю., Токранов А.М. Размерно-возрастная структура бурого морского петушка *Alectrias alectrolophus* (Stichaeidae) Авачинской губы (Восточная Камчатка) // Вестник КамчатГТУ. - 2017. - Вып. 40. - С. 77 – 85.
5. Мурашева М.Ю., Токранов А.М. Биологическая характеристика бурого морского петушка *Alectrias alectrolophus* (Stichaeidae) Авачинской губы (Восточная Камчатка) // Тр. V Межд. Балтийского морск. форума: Всерос. науч. конф. «Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоёмов». - Калининград: ФГБОУ ВО «Калининградский гос. техн. университет», 2017. - С.38 – 42.
6. Мурашева М.Ю., Токранов А.М. Биологическая характеристика бурого морского петушка *Alectrias alectrolophus* (Stichaeidae) из прибрежных вод о-ва Старичков (Авачинский залив) // Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техническое использование: Матер. X Нац. (всерос.) науч.-практ. конф. - Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2019. - С.45 – 49.
7. Мурашева М.Ю., Токранов А.М. Особенности питания бурого морского петушка *Alectrias alectrolophus* (Stichaeidae) в Авачинской губе (Восточная Камчатка) // Вопр. ихтиологии. - 2019. - Т.59. - №1. - С.54 – 59.
8. Токранов А.М., Мурашева М.Ю. Ихтиофауна литорали Авачинской губы (Юго-Восточная Камчатка) // Вопр. ихтиологии. - 2018. - Т.58, №4. - С.422 – 427.
9. Чегодаева Е.А. Новые данные по морфологии и биологии морского петушка *Alectrias alectrolophus* (Stichaeidae) Тауйской губы Охотского моря // Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей: Матер. VI науч. конф. - Петропавловск-Камчатский: Изд-во «Камчатпресс», 2005. - С.164 – 168.
10. Шейко Б.А., Федоров В.В. Класс Cephalaspidomorpha – Миноги. Класс Chondrichthyes – Хрящевые рыбы. Класс Holoccephali – Целноголовые. Класс Osteichthyes – Костные рыбы // Каталог позвоночных животных Камчатки и сопредельных морских акваторий. - Петропавловск-Камчатский: Камч. печатный двор, 2000. - С. 7 – 69.
11. Murasheva M.Yu. Biology of the stone cockscomb from the littoral near Nikolskaya Hill in 2019 // Proceedings Int. Conf. «Process Management and Scientific Developments». - Birmingham, United Kingdom: Sci. publ. house Infinity, 2021. - Part 1. - P. 114 – 118.
12. Popov A.M. Fishes of Avatcha Bay on the Southern Coast of Kamtchatka // Copeia. - 1933. - №2. - P.59 – 67.