

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-161-162

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНОГО РЕЖИМА И СТОКА РЕКИ БАРСУК

Переладова Лариса Владимировна

кандидат географических наук, доцент, Тюменский государственный университет, г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматриваются условия формирования водного режима и стока малой реки Барсук, бассейн которой расположен в сельскохозяйственной зоне Тюменской области. На основе анализа современной информационной базы произведены расчеты морфологических, морфометрических характеристик бассейна, статистических параметров годового стока реки.

Ключевые слова: малая река, половодье, межень, уровень воды, расход воды

FEATURES OF THE FORMATION OF THE WATER REGIME AND RUNOFF OF THE BARSUK RIVER

Pereladova Larisa Vladimirovna

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Tyumen State University, Tyumen

Abstract: The article discusses the conditions for the formation of the water regime and the flow of the small river Barsuk, the basin of which is located in the agricultural zone of the Tyumen region. Based on the analysis of the modern information base, calculations of the morphological, morphometric characteristics of the basin, statistical parameters of the annual river flow were made.

Keywords: small river, high water, low water, water level, water flow

Проблема изменения водного режима и водных ресурсов малых рек в условиях антропогенной нагрузки остается актуальной на протяжении нескольких последних десятилетий. Тем не менее, большинство малых рек Тюменской области остаются малоизученными или неизученными вовсе. В зоне сельскохозяйственного освоения юга территории, где увлажнение от года к году характеризуется большой изменчивостью, особенно важно изучение гидрологического режима малых рек с целью рационального использования их водных ресурсов.

Исследование представляет собой комплексный анализ водного режима и стока малой реки Барсук. Исходными материалами послужили топо- и космо-материалы, данные наблюдений, опубликованные в гидрологических ежегодниках и изданиях «Основные гидрологические характеристики» и «Ресурсы поверхностных вод СССР», данные портала АИС ГМВО.

Река Барсук протекает в Викуловском районе Тюменской области, берет начало из верхового болота Килейного, течет на запад и впадает в р. Ишим. Площадь бассейна реки составляет 1300 км². Форма бассейна

близка к овальной, с наибольшим развитием в верхнем течении. На реке Барсук в 1959 г. заложен гидрологический пост у п. Каточиги на расстоянии от устья в 27 км. Площадь водосбора реки до пункта наблюдения составляет 1 030 км².

Главную роль в формировании водного режима реки играет климат, который относится в районе исследования к умеренному континентальному. Основные климатические характеристики территории исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные климатические показатели в бассейне реки Барсук.

Среднегодовая температура воздуха	0,1°С
Средняя температура воздуха июля	18°С
Средняя температура воздуха января	-18,9°С
Максимальная температура воздуха	38°С
Минимальная температура воздуха	-40°С
Продолжительность безморозного периода	190 дней
Продолжительность периода с температурой выше 10°С	123 дня
Годовая сумма осадков	417 мм
Высота снежного покрова	35 см
Продолжительность залегания снежного покрова	160 дней
Наибольшая величина испарения	5 мм/сут

Территория бассейна относится к Сорокинско-Ишимскому физико-географическому району с полого-увалистым рельефом с абсолютными отметками высот до 120–130 м, постепенно уменьшающимися к северу. На протяжении 1,5 км от истока долина реки не выражена, склоны пологие и заболочены. Вниз по течению склоны долины постепенно повышаются до 20-25 м и сложены суглинистыми грунтами. Пойма реки двухсторонняя, песчано-илистого состава, иногда перекрыта отложениями торфа [2].

Для территории бассейна реки характерны березовые и осиново-березовые широко-травные леса на серых лесных почвах и суходольные и низинные луга на луговых и лугово-болотных почвах.

Река Барсук имеет 10 притоков. Густота речной сети на территории бассейна составляет 0,109 км/км². В его пределах расположено 20 озёр [2].

На формирование водного режима реки на протяжении нескольких десятилетий оказывают влияние такие техногенные факторы, как распашка и орошение земель (площадь пашен составляет 20% водосбора), расширение площадей населенных пунктов (крупные поселки Калинино, Каточиги общей площадью 25 км²).

В ходе исследования с использованием топо- и космо-материалов изучены морфологические особенности

бассейна реки Барсук и рассчитаны морфометрические характеристики (табл. 2), определяющие во многом особенность формирования режима реки.

Таблица 2

Морфологические и морфометрические характеристики бассейна реки Барсук.

Средний уклон бассейна	0,0006 м/км
Коэффициент извилистости реки	1,18
Длина водораздельной линии бассейна реки	214 км
Средняя высота водораздела	100 м
Длина бассейна реки	56 км
Максимальная ширина бассейна	27,8 км
Средняя ширина бассейна	17,9 км
Коэффициент болотистости территории бассейна	15%
Коэффициент озерности территории бассейна	5%
Коэффициент лесистости территории бассейна	60%

Река Барсук относится к рекам западно-сибирского типа, для которой характерны три основные фазы водного режима: весеннее половодье, летне-осенняя и зимняя межени. Река имеет преимущественно снеговое питание, доля которого в зависимости от конкретного года изменяется от 80 до 50%.

Исследование водного режима реки за период наблюдений показал, что половодье, в период которого проходит 80-90% годового стока, начинается в середине марта - начале апреля, достигает пика в среднем 20 апреля и завершается в конце мая - первой половине июня. Продолжительность его колеблется по годам от 2 до 3 месяцев. Высота весеннего подъема уровня возрастает по длине реки от 1 м в верховьях до 4-5 м в нижнем течении, в особо многоводные годы на 1-1,5 м выше. Самый высокий уровень половодья стоит на реке от 1 до 3 дней, после чего наступает спад. Летняя межень

почти ежегодно нарушается 2-3 дождевыми паводками высотой до 0,5-1,5 м, а зимняя межень устойчива.

Средний многолетний расход воды в реке у с. Каточиги за период наблюдений составил 1,6 м³/с, наибольший – 94,6 м³/с (2 мая 1979 г.), наименьший 0 м³/с (переморозание 14-17 ноября 1983 г. и пересыхание 20-25 сентября 1984 г.). В устье реки средний расход составляет более 2 м³/с [2]. Согласно произведенным расчетам, самые многоводные месяцы на реке март - апрель (более 50% годового стока), самые маловодные – январь - февраль (1,5% годового стока). Анализ базы данных наблюдений за расходами на реке Барсук позволил выделить годы минимальной (1967 г.), средней (1980 г.) и максимальной (1981 г.) водности.

Для количественной оценки годового стока р. Барсук у п. Каточиги рассчитаны его статистические параметры (табл. 3) согласно методикам, изложенным в [1], [3].

Таблица 3

Статистические параметры годового стока р. Барсук - п. Каточиги.

Cv	$Q_{1\%}$	$Q_{50\%}$	$Q_{95\%}$
1,02	3,38 м ³ /с	1,21 м ³ /с	0,34 м ³ /с

Данные о водном режиме и водных ресурсах реки Барсук, полученные в ходе исследования на основе результатов анализа современной исходной информации и выполненных расчетов, полезны в целях планирования видов хозяйственной деятельности при дальнейшем хозяйственном освоении территории бассейна.

Список литературы:

1. Владимиров А.М. Гидрологические расчеты. - Л.: Гидрометеиздат, 1990. – 365 с.
2. Лёзин, В.А. Реки и озера Тюменской области: словарь-справочник. - Тюмень: Пеликан, 1995. – 300 с.
3. Лучшева А.А. Практическая гидрология. - Л.: Гидрометеиздат, 1976. – 439 с.