

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-147-149

## ЛЕДОВАЯ И ПЛАНКТОННАЯ ФЛОРА ОЗЕРА КИСЛО-СЛАДКОЕ, ЧАСТИЧНО ИЗОЛИРОВАННОГО ОТ БЕЛОГО МОРЯ, В МАРТЕ И АПРЕЛЕ 2019 Г.

### **Радченко Ирина Георгиевна**

кандидат биологических наук, доцент Московского государственного университета, г. Москва

### **Воронов Дмитрий Анатольевич**

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Московского государственного университета и Института проблем передачи информации РАН, г. Москва

### **Краснова Елена Дмитриевна**

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Московского государственного университета, г. Москва

**Аннотация.** В статье представлены данные по видовому составу и обилию ледовых водорослей и фитопланктона в стратифицированном, частично отделившемся от Белого моря, озере в весенний период после промывки.

**Ключевые слова:** Ледовые водоросли, фитопланктон, отделяющиеся от моря соленые озера, стратификация.

### **ICE AND PLANKTON FLORA IN KISLO-SLADKOE LAKE PARTIALLY SEPARATED FROM THE WHITE SEA IN MARCH AND APRIL 2019**

### **Radchenko Irina Georgievna**

PhD, Associate Professor of Lomonosov Moscow State University, Moscow

### **Voronov Dmitry Anatolyevich**

PhD, senior researcher of Lomonosov Moscow State University and Institute for Information Transmission Problems of Russian Academy of Sciences, Moscow

### **Krasnova Elena Dmitrievna**

PhD, senior researcher of Lomonosov Moscow State University, Moscow

**Abstract.** Paper examines ice algae and phytoplankton species composition and abundance in a stratified salt lake separated from the White Sea, in spring after a complete winter washing.

**Keywords:** ice algae, phytoplankton, isolated from the sea salt lakes, stratification.

На побережье Белого моря в результате постгляциального подъема берега многие заливы отделяются от моря и превращаются в меромиктические озера, в которых развивается уникальная биота. Один из таких водоемов – озеро Кисло-Сладкое (Полупресная лагуна) (66°32'54"N, 33°08'05"E), находится в начале изоляции: его уровень на 40 см поднят над уровнем моря, поэтому морская вода поступает в него только в сизигию, и не нарушает стратификацию [3]. Поздней осенью или в начале зимы из-за заброса большого количества холодной морской воды иногда происходит промывка водоема. За последние 10 лет в озере наблюдалась двухгодичная квазициклическая с сохранением стра-

тификации на протяжении двух лет и промывкой раз в два года. Данная работа нацелена на изучение сукцессии фитопланктона после последней промывки зимой 2018/19 гг. и представляет самое начало этого процесса.

Материалы и методы.

Отбор проб проводили на одной станции в Кисло-Сладком озере 17 марта и 01 апреля 2019 г. Для исследования ледовых водорослей (ЛВ) отбирали керны льда с помощью ледовой пилы. Нижние 10 см керна помещали в пластиковую емкость и растапливали при комнатной температуре. Пробу растаявшего льда (440-867 мл) фиксировали раствором формалина с конечной концентрацией 2%. Для исследования фитопланктона (ФП) пробы воды объемом 1,68-1,88 л отбирали с помощью погружного насоса Whale Premium Submersible Pump GP1352 (США) и фиксировали формалином с конечной концентрацией 2%. Одновременно на разной глубине измеряли температуру и соленость (кондуктометрами WTW Cond 3110 и YSI Pro), содержание растворенного кислорода (оксиметром YSI Pro ODO), окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) (Water-Liner WMM-73) и освещенность (бытовым люксметром AR813A, модифицированным для погружения под воду).

Пробы растопленного льда и воды концентрировали методом обратной фильтрации (диаметр пор 2 мкм). Концентрированные пробы просчитывали под микроскопом МИКМЕД-1 (ЛОМО, Россия) при увеличении  $\times 300$  и с водной иммерсией при увеличении  $\times 600$  в камере Нажотта (объем 0,05 мл). Просчитывали по 4 камеры для каждой пробы. Водоросли по возможности определяли до рода или вида. Неидентифицированных коккоидных и жгутиковых водорослей с максимальным линейным размером 3-8 мкм объединяли в группу НКЖ. Расчет биомассы в единицах углерода проводили по объемам клеток, используя зависимости [6].

Результаты

**Физико-химические условия.** Зимой 2018/2019 г. в оз. Кисло-Сладком произошла промывка в результате поступления в него из моря большого объема воды с необычно высокой для этого района соленостью. Соленость воды во всей толще озера превысила 28‰ (Рис. 1).

В апреле лед начал снизу подтаивать, что привело к уменьшению солености подледного слоя, и в нем увеличилось содержание кислорода. Температура воды и в марте, и в апреле, была отрицательной по всему столбу, с минимумом в зоне контакта воды со льдом. Вся толща воды была аэробной (начиная с 1 м – микроаэробной), а в апреле ниже 1 м сложились заморные условия с отрицательным ОВП.

**Видовой состав и обилие ЛВ и ФП.** Всего во льду и в планктоне обнаружено 59 таксонов водорослей, из них 26 – определены до рода или вида. Идентифицированные таксоны принадлежат к следующим систе-




Рис. 1. Физико-химические параметры в оз. Кисло-Сладком.

Таблица 1.

Суммарная биомасса (В) и доминирующие водоросли во льду и в толще воды.

Биотоп, глубина горизонта	В, мг С/м³	Доминирующие виды и группы видов, величина вклада в суммарную биомассу (%)
17.03.2019		
Лед	12,99	Гетеротрофные жгутиковые (56), <i>N.septentrionalis</i> (18)
Вода, 0,5 м	5,84	<i>Micracanthodinium claytonii</i> (43), <i>N. frigida</i> (14)
Вода, 2,5 м	1,08	НКЖ (47), spp. (Cryptophyta) (26)
Вода, 3,5 м	2,62	<i>Peridiniella danica</i> (29), spp. (Cryptophyta) (26), НКЖ (22)
01.04.2019		
Лед	791,49	<i>N. frigida</i> (68%), <i>N. septentrionalis</i> (18)
Вода, 0,5 м	73,26	<i>N. frigida</i> (36), <i>N. septentrionalis</i> (33), <i>Chaetoceros</i> sp. (25)
Вода, 2,5 м	5,92	<i>N. frigida</i> (52), <i>N. septentrionalis</i> (26)
Вода, 3,5 м	0,51	<i>N. frigida</i> (34), <i>N. septentrionalis</i> (33), НКЖ (25)

матическим группам: Bacillariophyta (19), Dinophyta (4), Chlorophyta (2), Cyanobacteria (1). Часть неидентифицированных видов были определены как гетеротрофные жгутиковые, криптофитовые (Cryptophyceae), цианобактерии (Cyanobacteria) и НКЖ. Наибольшая суммарная биомасса водорослей (В) отмечалась во льду (таблица 1), в подледном планктоне В была значительно ниже и уменьшалась с глубиной. В марте во льду доминировали гетеротрофные жгутиковые, и фототрофная пенистая диатомовая водоросль *Navicula septentrionalis*. К началу апреля (в течение 15 дней) В ЛВ выросла больше чем в 60 раз, а доминирующим наряду с высоким обилием *N. septentrionalis* стал ледовый вид *Nitzschia frigida*. Фототрофная пенистая диатомовая водоросль *N. frigida* присутствовала во льду и в марте, но высокого обилия не достигала.

В подледного ФП также увеличилась к апрелю, при этом изменился и состав доминирующих видов. Так, в середине марта преобладали гетеротрофные виды: динофлагелляты *M. claytonii*, *P. danica* и бесцветные криптофитовые водоросли; а также фототрофные НКЖ. В апреле основной вклад в В как ЛВ, так и ФП давали *N. frigida*, *N. septentrionalis* и *Chaetoceros* sp. НКЖ обильны были только в придонном слое.

#### Обсуждение результатов

Биомасса как ЛВ, так и подледного ФП возрастала с середины марта до начала апреля на фоне уменьшения

обилия гетеротрофных форм, что обусловлено улучшением световых условий для фототрофных водорослей. В марте и в апреле уровень радиации в нижних слоях льда при ясной погоде достигал 250-900 лкс, что было выше компенсационной интенсивности света [7]. Увеличение В фотосинтезирующего ФП подо льдом в апреле привело к увеличению в 0,5-метровом слое толщи воды кислорода и ОВП.

При подтаивании льда, очевидно, происходило вымывание ледовых водорослей *N. frigida* и *N. septentrionalis* в толщу воды и опускание их в придонные слои озера, что характерно для начала весеннего подледного цветения в арктических морях [7]. При этом в подледном слое воды развивалась планктонная водоросль *Chaetoceros* sp. Доминирование как во льду, так и в подледном планктоне Белого моря водоросли *N. frigida* характерно для весеннего периода [2, 4, 5]. *N. septentrionalis* ранее отмечалась, но не входила в число доминирующих видов [1]. В ЛВ и ФП была как близка, так и отличалась от значений, полученных ранее в близлежащих районах морской акватории [2, 3, 5]. Пространственно-временная изменчивость обилия ЛВ и подледного ФП характерна для арктических морей [7].

Таким образом, развитие ЛФ и ФП в Кисло-Сладком озере в марте-апреле происходило аналогично такому морской акватории, что соответствует начальной, морской стадии изоляционной сукцессии.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-05-00377).

**Список литературы:**

1. Житина Л.С., Федоров В.Д. Ледово-планктонные водоросли побережья Белого моря // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 16. Биология. – 2003. – № 1. – С. 24-31.
2. Ильяш Л. В., Житина Л. С., Кудрявцева В. А., Мельников И. А. Сезонная динамика видового состава и биомассы водорослей в прибрежных льдах Кандалакшского залива Белого моря // Журнал общей биологии. – 2012. – Т. 73, № 6. – С. 461–472.
3. Краснова Е.Д., Воронов Д.А., Демиденко Н.А., Кокрятская Н.М. и др. К инвентаризации реликтовых водоемов, отделяющихся от Белого моря // Комплексные исследования Бадьего моря, полуизолированной беломорской лагуны: геология, гидрология, биота – изменения на фоне трансгрессии берегов (Труды Беломорской биостанции МГУ т. 12). – М.: Изд-во КМК, 2016. – С. 211-241.
4. Кудрявцева В.А., Белевич Т.А., Житина Л.С. Видовой состав диатомовых водорослей во льду пролива Великая Салма Белого моря перед весенним цветением // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 16. Биология. – 2017. – Т. 72, № 2. – С. 63-69.
5. Ратькова Т.Н., Сажин А.Ф., Кособокова К.Н. Одноклеточное население беломорской пелагиали подо льдом в ранне-весенний период // Океанология. – 2004. – Т. 44, № 2. – С. 259-266.
6. Menden-Deuer S., Lessard E.J. Carbon to volume relationships for dinoflagellates, diatoms, and other protist plankton // Limnol. Oceanogr. – 2000. – Vol. 45, N 3. – P. 569–579.
7. Leu, E., Mundy C.J., Assmy P., Campbell K. et al. Arctic spring awakening – Steering principles behind the phenology of vernal ice algal blooms // Prog. Oceanogr. – 2015. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pcean.2015.07.012>.