

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-60-61

ОРНИТОФАУНА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Рахимов Ильгизар Ильясович

доктор биологических наук, профессор Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань

Уленгов Руслан Анатольевич

кандидат географических наук, доцент Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к оценке преобразованности территории с использованием современного состояния орнитофауны различных биотопов. Эта необходимая часть характеристики эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) территории. В качестве примера приведены данные по анализу орнитофауны г.Казани Республики Татарстан. Результаты основаны на материалах орнитологических исследований начиная тридцатых годов прошлого столетия. Учтены основные этапы освоения города Казани и антропогенной трансформации территории Татарстана.

Ключевые слова: преобразованность территории, эколого-хозяйственное состояние территории, орнитофауна.

AVIFAUNA AS AN INDICATOR OF TRANSFORMATION OF THE TERRITORY

Rakhimov Ilgizar Ilyasovich

Doctor of Biological Sciences, Professor of Kazan (Volga region) Federal University, Kazan

Ulenhof Ruslan Anatolyevich

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor of Kazan (Volga region) Federal University, Kazan

Abstract. The article considers approaches to assessing the transformation of the territory using the current state of the avifauna of various biotopes. This is a necessary part of the characteristics of the ecological and economic condition of the territory. As an example, data on the analysis of the avifauna of Kazan in the Republic of Tatarstan are given. The results are based on ornithological studies from the thirties. The main stages of development of the city of Kazan and man-made transformation of the territory of Tatarstan have been taken into account.

Keywords: transformation of the territory, ecological and economic condition of the territory, avifauna.

В поисках географических методов оценки антропогенной трансформации геосистем исследования обращены к геосистемам разной размерности (поле, карьер, пруд и др.). Они формируют пространственные ареалы и отличаются своими качественными характеристиками. Исследование и оценка степени их антропогенной трансформации, по Б.И. Кочурову [1], составляет одну из частей «экодиагностики» территории.

Экологическая ситуация каждого региона определяется общей устойчивостью природных комплексов и степенью воздействия на них антропогенных факторов. Одним из подходов изучения экологической ситуации является сопоставление уровня антропогенных нагрузок с существующим состоянием ландшафтов и их компонентов. Уровень антропогенных воздействий выражается системой оценочных баллов в показателях эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) территории. Оценка ЭХС территории включает определение всех видов и степени антропогенной преобразованности (АП), естественной защищенности (ЕЗ) территории и земель экологического фонда [2].

Республика Татарстан, отличается уникальностью своего географического положения на стыке Евроазиатской таежной, Европейской широколиственной и Евроазиатской степной областей, что накладывает отпечаток на биологическое разнообразие животного и растительного мира, являясь примером формирования на ее территории различных авифаунистических комплексов. Состояние орнитофауны может служить показателем преобразованности и использоваться при оценке эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) территории.

Для геоэкологической характеристики территории разработаны критерии на основе специфики орнитокомплексов: биотопическая приуроченность, видовое разнообразие, плотность населения птиц, участие или доминирование синантропных видов и др. характеристики фауны и населения птиц Республики Татарстан (РТ) и города Казани.

Анализ современного состояния природных ландшафтов республики с применением показателей напряженности эколого-хозяйственного состояния показал критически низкий уровни сохранности природных ландшафтов прежде всего Дрожжановского, Буинского, Атнинского, Сармановского, Апастовского, муниципальных районов РТ. Напряженность ЭХС сбалансирована по степени антропогенной преобразованности и потенциалу устойчивости природы только в Лаишевском районе. Приближаются к сбалансированности Нурлатский, Мамадышский, Мензелинский, Рыбно-Слободский, Агрызский районы. Выделены природно-территориальные комплексы с удовлетворительным (Восточное Предкамье), конфликтным (Приказанский, Западное Предкамье, Нижнекамский, Западное Закамье) и напряженным (Восточное Закамье, Свяжский) эколого-хозяйственным состоянием.

Прослеживается снижение общей плотности птиц и числа видов птиц в полевых местообитаниях Татарстана при продвижении с запада на восток и юго-восток, общая плотность населения птиц находится

Таблица 1.

Характеристика территориально-фаунистических комплексов г. Казани.

| ТФК | Количество видов птиц | Гнездящихся | Плотность (особ./км ²) | Индекс доминирования более 10% | Фоновые виды (1-10%) | Функциональное назначение территории |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|---|---|---|
| Полной синантропизации | до 20 видов | до 10 видов | до 150 | Домовой воробей, сизый голубь, черный стриж | Каменка, горихвостка-чернушка, галка | Многоэтажная застройка, промышл. зоны, стройка |
| Стабильной синантропизации | 20 – 40 видов | 10-20 видов | 150-550 | Домовой воробей, полевой, воробей, белая трясогузка, большая синица | Скворец, грач, мухоловкапеструшка, серая ворона | Сельская застройка, 2-5 этажная застройка, сады |
| Условной синантропизации | 40-90 видов | 20-40 видов | 550-1100 | Полевой воробей, большая синица, рябинник | Зяблик, скворец, грач, щегол, сойка, галка | Парки, кладбища |
| Потенциальной синантропизации | более 90 видов | более 40 видов | более 1100 | Зяблик, славка, черноголовка, пеночка-весничка, крачка, варакушка | Рябинник, мухоловка пеструшка, пеночка трещетка | Лесопарк, водоемы |

в прямой зависимости от мозаичности ландшафта, общей лесистости, распаханности территории. При сопоставлении данных по авифауне природно-территориальных комплексов Республики Татарстан и данных по напряженности ЭХС выявлена достоверная обратная корреляция между коэффициентом относительной напряженности и коэффициентом видового состава птиц. С уменьшением напряженности эколого-хозяйственного состояния территории (за счет увеличения площади земель с ресурсостабилизирующими функциями) происходит увеличения видового состава орнитофауны региона.

По степени освоенности территории птицами и характеру орнитокомплексов мы выделяем в пределах города Казани 4 территориально-фаунистических комплекса (ТФК), отражающих степень антропогенной трансформации урбанизированной геосистемы:

- ТФК потенциальной синантропизации;
- ТФК условной синантропизации;
- ТФК стабильной синантропизации;
- ТФК полной синантропизации;

В пределах ТФК объединены отдельные городские биотопы с характерной орнитофауной. Характеристика территориально-фаунистических комплексов г. Казань представлены в таблице 1.

При выделении тех или иных биотопов использованы биометрические методы, позволяющие сравнить некоторые показатели населения птиц отдельных участков. Оценка разности средних на достоверность по критерию Стьюдента

для числа видов в каждом биотопе, для числа гнездящихся видов и для плотности позволили считать правомочным выделение отдельных участков города в качестве самостоятельных биотопов и объединить их в территориально-фаунистические комплексы (ТФК), отражающих степень антропогенной трансформации урбанизированной геосистемы. Недостоверная разность хотя бы по одному показателю позволяет считать биотопы условно схожими.

Таким образом, в условиях республики Татарстан, антропогенно-трансформированные территории представлены разнообразными биотопами, создающими условия для обитания различных экологических групп птиц. Каждый из представленных биотопов характеризуется определенным видовым составом, пространственным размещением, плотностью населения птиц, своеобразием временного использования территории [3].

Биотопы испытывают различные формы антропогенного влияния, и могут быть представлены как ряд местообитаний, от слабо нарушенных до преобразованных. Их авифауна отражает степень изменений, происходящих под действием антропогенных факторов. Урбанизированный и агроландшафт представляют собой крайнюю степень антропогенной трансформации естественных природных экосистем.

Список литературы:

1. Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и ЭХ баланс территории. – Смоленск: СГУ, 1999. – 186 с.
2. Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие. – Москва-Смоленск: Маджента, 2003. – 381 с.
3. Рахимов И.И. Авифауна Среднего Поволжья в условиях антропогенной трансформации естественных природных ландшафтов – Казань: «Новое знание», 2002. – 270 с.