

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-166-169

РАЗНООБРАЗИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ ОЗЁРНЫХ КОТЛОВИН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Савченко Николай Владимирович

кандидат географических наук, доцент Новосибирского государственного аграрного университета, г. Новосибирск

Аннотация. На основе синхронных мониторинговых наблюдений за элементарно- геохимическим составом макро- и микроэлементов дана оценка современного геоэкологического состояния озёр региона, различных по генезису и морфологическим особенностям котловин.

Ключевые слова: озёра, функционально-динамическое состояние, мониторинг, химические элементы, устойчивость, зоопланктон, альгофлора, зообентос, деструкция, продукция.

DIVERSITY OF GENETIC TYPES AND GEOECOLOGICAL FEATURES OF LAKE BASINS IN THE NOVOSIBIRSK REGION

Savchenko Nikolay Vladimirovich,

PhD. Candidate of Geographic Sciences, Ass. Prof.,
Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russia

Abstract. On the of synchronous monitoring geochemical and hydrobiological observations, an assessment is made of the geoecological state of lakes, different in genesis and morphological features of the troughs.

Abstract. Keywords: lakes, functional and dynamic state, monitoring, chemical elements, stability, zooplankton, algaeflora, zoobenthos, destruction, products.

Новосибирская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины и является одним из самых заозёрных регионов России. Здесь сосредоточено более 6 тыс. озёр, что составляет 0,24% озёрного фонда и 0,09% водноозёрных акваторий материка Евразии. В зависимости от генезиса здесь выделяются следующие типы озёрных котловин:

1. Водно – эрозионный. К этому типу относятся котловины озёр, расположенные в пределах речных долин всей территории области. По особенностям происхождения, морфологии и морфометрии данный тип можно подразделить на пять подтипов: старичный, затонный, веерный, вторично-пойменный, межгрядный.

Котловины старичкового генезиса образуются в результате спрямления речного русла и отчленения меандры старого русла, которая проходит в своем развитии стадии протоки, старицы, курьи, пойменного озера. Форма их котловин различная: серповидная, подковообразная, причудливо-извилистая. Площадь озёр не превышает 1,5 км². Наибольшие глубины отмечаются в верхних концах котловин, а в поперечном профиле – в зонах наиболее мощных потоков прежних русловых течений.

Формирование затонных озёр происходит путем отчленения от реки части акватории затона гребнем берегового вала. Растительность, покрывающая вал, способствует аккумуляции на нем наносов и препятствует их поступлению в затон.

В процессе развития речной долины образуются веера блуждания русла (лайды). Они состоят из серии гряд (являющихся остатками древних береговых валов в пойме) и межгрядовых понижений. В-последних, при повышенном переносе донных фракций и незначительном пойменном аллювии, формируются веерные пойменные озера. Этот подтип один из самых многочисленных среди водно-эрозионных и самый разнообразный по очертаниям и глубинам котловин.

Котловины вторично – пойменных озёр представляют собой «окна», которые остаются в пойменном торфянике на месте участка торфяного массива, унесенного в половодье водой. При спаде половодья они остаются затопленными и образуют пойменные озера.

Озёра межгрядных понижений являются результатом комплекса водно-эрозионных и суффозионно-продачных процессов. Они имеют продолговатую форму, мелководные, с займищным типом тростниковой растительности.

2. Внутриболотный. К нему относится подавляющее число озёрных котловин, которые по происхождению могут быть как первичными, так и вторичными. Основным признаком первичных является врез котловины в минеральный грунт и минеральное дно в современных условиях. Образование вторичных связано с общим процессом развития болотных систем. Исходя из того, что в начальной фазе заболачивания территории торфонакопление шло лишь в пониженных частях рельефа, вначале появились изолированные болотные массивы. При дальнейшем процессе торфонакопления центральные части этих массивов, вследствие более быстрого в них прироста торфяной залежи, оказались приподнятыми над окраинами и прилегающими к ним минеральными не заболоченными участками. Сток с образовавшихся болотных массивов направлялся на нижерасположенные не заболоченные участки, которые, оказавшись окруженными приподнятыми над ними торфяными отложениями, становились местами скопления воды и образования озёр. Кроме того некоторые участки выпуклых торфяных поверхностей болотных массивов вследствие разрушения торфа (деструкции, выгорания и т. п.) также способствуют возникновению многочисленных озёрков.

Берега внутриболотных озёр, как правило, торфяные, обрывистые, высотой 1 – 2 м, реже низкие (сплавинные), высотой 0,2 – 0,6 м, которые из-за ветроволновой деятельности подмываются и разрушаются. Это приводит к увеличению акватории (иногда до 90 – 140 км²) и к

Таблица
Биопродуктивность озёр различного генезиса территории Новосибирской области по результатам
полурежимных наблюдений в период открытой воды (средние значения за VI-IX 1977 – 2021 г.г.).

Показатели продуктивности	Единица измерения	Генетические типы озёр []									
		Десоболотная зона (южная тайга и подтайга)					Десостепь и степь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Фитопланктон		(19) [238]	(11) [119]	(11) [234]	(21) [108]	44[560]	27[161]	138[652]	21[148]		
Число видов Количество Биомасса	штук тыс.кл/л мг/л	82 27011 1,34	46 4,18 <0,002	147 188,8 2,52	176 206,4 2,61	73 24705 14,38	20 2312 5,623	80 908005 21,5	63 243756 10,15		
Ф / Д	гО ₂ (м ² .сут) гО ₂ (м ² .сут) коэф-т	0,604 0,619 0,976	0,87 0,21 4,143	0,899 0,161 5,584	0,916 0,171 5,357	2,85 2,96 0,96	2,06 1,32 1,56	3,6 3,12 1,15	4,2 2,75 1,53		
Хлорофилл «а»	мг/м ³	13,21	3,06	20,6	21,18	6,18	3,22	5,78	6,02		
Зоопланктон		(19) [172]	(11) [107]	(11) [212]	(21) [104]	44[417]	27[158]	129[568]	49[490]		
Число видов Численность Биомасса	штук тыс.экз/м ³ г/м ³	10 78,22 3,811	11 9,12 0,928	13 26,15 3,387	20 21,34 4,811	36 164,72 6,37	8 22,82 0,817	35 250,1 9,23	14 40,38 3,69		
Зообентос		(16) [164]	(9) [92]	(9) [134]	(19) [98]	44[374]	22[144]	106[426]	49[448]		
Число видов Численность Биомасса	штук штук/м ² г/м ²	38 1116 6,4	16 347 0,017	32 1260 6,32	28 916 6,3	47 4363 9,9	12 226 0,414	68 1496 6,229	19 1255 2,99		

Примечание. В фигурных скобках – число исследованных озёр, в квадратных – число изученных проб.

весьма сложной форме озерного зеркала (вследствие слияния с другими близкорасположенными озерами и внутриболотными «окнами»).

Днище крупных внутриболотных озер (оз. Мирное), как правило, ровное со слабовыраженным понижением к центральной части и сложено преимущественно минеральными грунтами (песками, супесями, суглинками). Вблизи берегов имеются торфяные и торфяно-минеральные отложения. В малых озерах все основание котловины покрыто размытым торфом. Все водоемы внутриболотного типа мелководные. Максимальные глубины лишь изредка достигают 5 м, а средние варьируют в очень узких пределах (1,4 – 1,8 м).

3. Суффозионно – просадочный. К нему относится около 80% озерных котловин территории области. Основной причиной их возникновения являются суффозионные процессы, масштаб и интенсивность проявления которых здесь были усилены близким залеганием у поверхности сильно минерализованных неогеновых рыхлых отложений.

Такие водоемы отличаются малыми глубинами (0,5 – 3 м), имеют в плане овальную, округлую или близкую к ним форму. Берега низменные, ровные, изредка с невысокими обрывами (0,2 – 0,4 м), поперечный профиль котловины пологоконический.

4. Остаточный. Он объединяет наиболее крупные водоемы древне-озерных равнин – оз. Чаны, Сартлан, Убинское и др., которые во влажные эпохи четвертичного периода представляли собой большие озерные водоемы, а также многочисленные водоемы южных окраин провинции, расположенные в местах древних ложбин стока или древних дельт четвертичных прарек.

В настоящее время большинство котловин мелководные (0,5 – 1,2 м), имеют в плане вытянутую или сложную форму, берега низкие, реже слабо обрывистые.

5. Эоловый (сорово – дефляционный). Такие котловины

встречаются лишь в южных районах Прииртышья – в пределах сорово-дефляционных впадин. Основным фактором их возникновения А. Г. Поползин [3] считал эоловые процессы сухих межледниковых эпох и настоящего времени. Пухлый солончак, образованный в плоских впадинах, разрыхляется и развеивается при малейшем дуновении ветра. Рыхлый пылеватый аллювий впадин также легко поддается эоловым процессам и уносится за пределы впадины. Прекращение эоловой деятельности происходит лишь в том случае, если основание котловины приблизилось к уровню грунтовых вод и образовался мокрый солончак или когда вся впадина находится в области тектонического поднятия. Все котловины этого типа мелководные (0,2 – 0,8 м), а зачастую полностью безводные. В плане имеют овальную или очень сложную конфигурацию.

6. Антропогенный (техногенный). Происхождение котловин этих озер является либо прямым следствием современной хозяйственной деятельности человека (строительство водоаккумулятивных дамб в устьях крупных оврагов или небольших речных долин), либо косвенным (прокладка насыпных трасс авто- и железных дорог, массивированное использование тяжелого

гусеничного транспорта при нефтепоисковых работах, разработка карьеров с песчано-гравийными смесями, выбросы буровых растворов, порывы нефтепроводов, пожары торфяников и т.д.).

В результате действия антропогенных факторов происходит нарушение водофильтрационных процессов и термического режима мерзлых почво-грунтов, выгорают огромные торфяные массивы, скоротечно проявляются термо- и гидротермокарстовые явления. В конечном итоге появляется множество разнообразных по форме, размерам и глубине озер.

Сопоставление результатов геохимического и гидробиологического мониторинга, методология и результаты которых опубликованы ранее [1-2] с учётом разнообразия генетических типов котловин позволило выявить следующие их индикационно-геоэкологические особенности.

1. В лесоболотных ландшафтах региона современные внутриболотные озёра имеют крайне неустойчивые экосистемы, что сказывается на видовом разнообразии планктонных и бентосных сообществ. Оно значительно беднее, чем в крупных пойменных водоёмах. Так, фитопланктон в первых представлен 30 – 56 видами (среднее – 46) против 105 – 127(82), во-вторых, зоопланктон соответственно 5 – 8 и 19 – 36 видами, а простейшие соответственно 4 – 14 и 18 – 28 видами. Обе эти группы озёр различаются и по функциональным показателям гидробионтов, прежде всего по соотношению продукционно-деструкционных процессов. В бессточных внутриболотных, как правило, величина первичной продукции значительно превышает скорость деструкции органического вещества (ОВ), коэффициент отношения продукции вещества (Ф) к деструкции (Д) Ф/Д в абсолютном большинстве водоёмов близок к 1. Следовательно, эти озёра способны к быстрому накоплению в толще воды органического вещества (ОВ), создаваемом фитопланктоном, и более подвержены эвтрофированию при поступлении дополнительных биогенных элементов с водосборов. Напротив, крупные внутриболотные (оз. Мирное) и пойменные водоёмы обладают более сбалансированными экосистемами, так как в них доминируют деструкционные процессы над продукционными (Ф/Д всегда и намного меньше 1). Тем не менее, в лесоболотной зоне региона все генетические типы озёр в той или иной степени экологически неустойчивы не только по трофическим, но и по элементно-геохимическим показателям: внутриболотные – в большей степени (активно накапливают ОВ, Fe, N, P, Ca, Mo, Ti, Mg, Li, Mn; Коэффициент динамической напряжённости ($K_{дн}$)= 10,2), а пойменные – в меньшей (выносятся почти все элементы и ОВ; $K_{дн}$ = 0,002).

2. Высокой устойчивостью обладают экосистемы водоёмов суффозионно-просадочного происхождения проточно-сточного гидрологического типа, а также большинства озёр пойменного генезиса территорий южной тайги и северной лесостепи. Соотношение продукции и деструкции органического вещества в них не превышает 1,07, а показатели продуктивности их гидробионтов имеют максимальные значения для всей Новосибирской области. В озёрных компонентах активно

накапливаются As, S, F, Fe, Al, Ni, Zn, Ag и также активно выносятся Na, Li, Mg, K. В обоих процессах одновременно и активно участвуют N, V, Ca, B, Cu, Pb, Mo, иногда Hg и Cs.

3. В южной лесостепной и степной зоне устойчивость экосистем всех генетических типов озер достигает максимальных для Западной Сибири значений, что связано со спадом сельскохозяйственного производства и масштабов его химизации и мелиорации.

Список литературы:

1. Савченко Н. В. Биогеохимический мониторинг лимногеосистем Западной Сибири и его основные итоги // Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии. Т.3. – Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. – Барнаул, 20-24 августа 2012г. – с. 106 – 111.
2. Савченко Н. В. Влияние палеогеографических и геолого-геоморфологических факторов на геolimнологические особенности Западной Сибири // «Sciences of Europe» VOL 3, No 9 (9) (2016) Praha, Czech Republic. – С. 4 – 12.
3. Поползин А. Г. Озера юга Обь – Иртышского бассейна. – Новосибирск: Зап. Сиб. кн. изд., 1967. – 350с.