

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-245-246

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ ИНДЕКСОВ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Серегин Михаил Рафитович

студент института естествознания, физической культуры и туризма Уральского государственного педагогического университета, г. Екатеринбург

Лаптев Никита Андреевич

студент института естествознания, физической культуры и туризма Уральского государственного педагогического университета, г. Екатеринбург

Аннотация: В статье рассмотрена зависимость между температурами воздуха в приземном слое по городам Среднего Урала и индексами Североатлантического колебания. Статистически доказано, что Североатлантическое колебание оказывает влияние на температурный режим Среднего Урала в зимние и весенние месяцы.

Ключевые слова: температура воздуха в приземном слое, корреляция, Северо-Атлантическое колебание (САК).

CORRELATION BETWEEN THE INDICES OF THE NORTH ATLANTIC OSCILLATION AND AIR TEMPERATURE IN THE SURFACE LAYER IN THE TERRITORY OF THE MIDDLE URALS

Mikhail Seregin Rafitovich, Laptev Nikita Andreevich

students of the Institute of Natural Science, Physical Culture and Tourism, Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg

Abstract: The article considers the relationship between air temperatures in the surface layer for 15 cities in the Middle Urals and the indices of the North Atlantic Oscillation. It has been statistically proven that the North Atlantic Oscillation affects the temperature regime of the Middle Urals in the winter and spring months.

Key words: air temperature in the surface layer, correlation, North Atlantic Oscillation (NAO).

Циркуляция атмосферы в Северном полушарии оказывает важное влияние на термический режим. Западный перенос воздушных масс над Атлантикой и Европой связан с стационарными барическими системами. В северной Атлантике активная область низкого давления (Исландская депрессия), а над Азорскими островами и Южной Европой область высокого давления (Азорский или Северо-Атлантический максимум). В настоящее время актуальным вопросом становится связь между региональными климатическими условиями и глобальными циркуляционными системами.

Североатлантическое колебание (САК) относится к крупномасштабным системам циркуляции атмосферы, которое представляет собой перераспределение воздушных масс между Арктикой (Исландской депрессией)

и субтропической Атлантикой (Азорским максимумом). САК оказывает большое влияние на термический режим ЕТР [5]. Поскольку ЕТР граничит со Средним Уралом, вероятно связь с САК и на исследуемой территории. Средний Урал является самой низкогорной частью Уральских гор, этим он отличается в орографическом плане от других частей, т.к. абсолютные высоты хребтов составляют 500-600 м [2]. Территория расположена межгорном коридоре между Северным и Южным Уралом, который пропускает потоки воздушных масс с ЕТР.

Для оценки влияния циркуляционных факторов Северного полушария на территорию Среднего Урала были составлены корреляционные связи между среднемесячными температурами воздуха и индексом циркуляции Североатлантического колебания (САК) в 1951-2020 гг. Для корреляционного анализа с температурными показателями использованы индексы Северо-Атлантического колебания (САК) по данным сайта: cpc.ncep.noaa.gov (National weather service Climate Prediction Center) [7]. Температурные ряды среднемесячных температур были получены с сайта: <http://meteo.ru> (ВНИИГМИ-МЦД) и <https://pogodaklimat.ru> (Погода и климат) [2,6]

Расчетная работа производилась в программе Excel 2019. Коэффициенты корреляции Спирмена отражают связь между индексами САК и средними месячными температурами воздуха (табл. 1). Зимой доминируют максимальные значения, в основном которые приходятся на январь ($r=0.45$). В летний сезон эта связь наименьшая: минимальные значения приходятся на июль ($r=0,00$). Индекс САК демонстрирует месячную и межсезонную изменчивость, при этом выделяются положительные и отрицательные фазы. В таблице представлены уровни статической значимости при $p<0.05$. По высчитанным критериям Стьюдента, значения являются достоверными в следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, декабрь. Значение месячных показателей, которые имеют статический уровень достоверности, играют роль в изменчивости температурного режима. Можно заметить, что также наблюдается достоверная отрицательная корреляционная связь в апреле.

Наблюдается зависимость температуры воздуха от состояния Северной Атлантики, что подтверждается наличием положительной средней корреляционной связи между температурой воздуха и индексом САК зимой, весной. Однако сильными такие связи нельзя назвать, т.к. индексы частично описывают температурные особенности на территории Среднего Урала. В зимний период, когда значения индекса САК высоки, наблюдается усиление субтропического максимума давления и углубление Исландской депрессии, что приводит к большим градиентам между атмосферными образованиями. Происходит активный широтный перенос с Атлантики,

Таблица 1

Коэффициенты линейной корреляции среднемесячных температур воздуха и индекса САК* (1951-2020).

Город	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лысьва	0,39	0,29	0,38	-0,27	-0,06	0,00	0,06	0,06	0,15	-0,12	-0,03	0,35
Шамары	0,42	0,32	0,36	-0,32	-0,08	0,01	0,01	0,03	0,15	-0,14	-0,05	0,29
Кын	0,40	0,31	0,37	-0,29	-0,10	-0,02	0,03	0,05	0,15	-0,13	-0,06	0,30
Бисерть	0,44	0,28	0,32	-0,32	-0,14	-0,02	-0,04	0,05	0,13	-0,13	-0,03	0,29
Висим	0,44	0,32	0,38	-0,32	-0,15	-0,01	0,00	0,09	0,09	-0,15	-0,07	0,29
Кушва	0,45	0,32	0,39	-0,28	-0,11	-0,01	0,02	0,10	0,13	-0,16	-0,08	0,29
Нязепетровск	0,36	0,27	0,28	-0,33	-0,18	-0,04	-0,07	0,05	0,16	-0,12	-0,06	0,27
Ревда	0,44	0,31	0,33	-0,32	-0,22	-0,04	-0,05	0,07	0,13	-0,17	-0,08	0,28
Нижний Тагил	0,42	0,33	0,37	-0,28	-0,10	-0,02	0,02	0,07	0,12	-0,16	-0,09	0,30
Невьянск	0,45	0,32	0,38	-0,30	-0,08	0,00	-0,02	0,08	0,12	-0,16	-0,09	0,28
Верхний Уфалей	0,40	0,28	0,32	-0,32	-0,18	-0,06	-0,07	-0,04	0,19	-0,16	-0,08	0,25
Екатеринбург	0,44	0,32	0,36	-0,29	-0,16	-0,06	-0,06	0,01	0,15	-0,17	-0,08	0,27
Сысерть	0,45	0,31	0,31	-0,33	-0,20	-0,06	-0,03	0,06	0,14	-0,17	-0,09	0,27
Верхнее Дуброво	0,44	0,31	0,34	-0,31	-0,14	-0,02	-0,06	-0,01	0,16	-0,17	-0,09	0,26
Алапаевск	0,45	0,35	0,36	-0,28	-0,08	0,00	-0,01	0,11	0,14	-0,18	-0,11	0,28
Среднее	0,43	0,31	0,35	-0,30	-0,13	-0,02	-0,02	0,05	0,14	-0,15	-0,07	0,28
Значимость	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23

который характеризуется повышением температуры и обильным осадками.

В отрицательной фазе паттерна, которая в основном характерна для летнего сезона, зональный поток уменьшается, и преобладают меридиональные циркуляционные процессы, осложняющиеся «местными» факторами [5]. Влияние Атлантики ослабевает, наблюдается уменьшение вторжений адвекции тепла и влаги. Летом усиливаются «местные» факторы широтной дифференциации радиационного баланса и процессов, контраст свойств подстилающей поверхности, растительного покрова, орографии [3,4]. Для летнего периода характерны отрицательные и низкие коэффициенты корреляции.

Глобальный фактор (адвективно-циркуляционный) на территории Среднего Урала являются одним из ведущих, который оказывает влияние на погодные условия. Корреляционный анализ показал, что вклад крупномасштабных климатических систем в изменении приземной температуры воздуха в исследуемый временной промежуток наиболее четко прослеживается зимой и весной.

Список литературы:

1. Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – мировой центр данных. Специализированные массивы данных. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: <http://meteo.ru/> (дата обращения 13 сентября 2021).
2. Исаков Н.С., Анфимов А.Л. Рельеф Урала: морфоструктура и морфоскульптура. – Екатеринбург, Урал. гос. пед. ун-т, 1999 – 51 с.
3. Кислов А.В. Климат в прошлом, настоящем и будущем. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2001. – 351 с.
4. Логинов В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата: причины и следствия. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 494 с.
5. Нестеров Е.С. Североатлантическое колебание: атмосфера и океан. – М.: Триада, лтд, 2013. – 144 с.
6. Погода и климат – прогнозы погоды, новости погоды, климатические данные. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <https://pogodaklimat.ru/> (дата обращения 13 сентября 2021).
7. National weather service. Climate Prediction Center. Индексы САК. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <https://www.cpc.ncep.noaa.gov/> (дата обращения 13 сентября 2021).