

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-70-71

КАЛЬЦЕФИЛЬНАЯ ФЛОРА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ И ВОПРОСЫ ЕЕ ОХРАНЫ

Силаева Татьяна Борисовна

доктор биологических наук, профессор Мордовского государственного университета, г. Саранск

Попкова Екатерина Григорьевна

студент факультета биотехнологии и биологии Мордовского государственного университета, г. Саранск

Учеваткина Юлия Петровна

студент факультета биотехнологии и биологии Мордовского государственного университета, г. Саранск

Аннотация. Рассматривается видовой состав, соотношение жизненных форм и экологических групп по отношению к увлажнению кальцефильной флоры Республики Мордовия. Большинство из 29 облигатных кальцефилов расположено близ границ ареалов, многие внесены в региональную Красную книгу, но региональной охраной они не обеспечены.

Ключевые слова: кальцефильная флора, редкие виды, Красная книга, особо охраняемые территории.

CALCIPHILIOUS FLORA OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA AND ITS PROTECTION

Silaeva Tatyana Borisovna

doctor of biological Sciences, Professor of Mordovia state University, Saransk

Popkova Ekaterina Grigoryevna

student of the faculty of biotechnology and biology of Mordovia state University, Saransk

Uchevatkina Julia Petrovna

student of the faculty of biotechnology and biology of Mordovia state University, Saransk

Abstract. The article considers the species composition, the ratio of life forms and ecological groups in relation to the hydration of the calciphilic flora of the Republic of Mordovia. Most of the 29 obligate calcifites are located near the borders of their ranges, many are included in the regional Red book, but they are not protected by regional protection.

Keywords: calciphilous flora, rare species, Red data book, protected areas.

Выходы карбонатных пород в Среднем Поволжье – места обитания многих редких и эндемичных видов флоры. Республика Мордовия находится в бассейнах рек Суры и Мокши, на границе Приволжской возвышенности и Окско-Донской низменности. В Республике Мордовия выходы карбонатов расположены преимущественно в восточной половине региона, в бассейне р. Суры на склонах Приволжской возвышенности [1].

Во флоре Республики всего по нашим данным зарегистрировано 29 видов облигатных кальцефильных растений из 27 родов и 18 семейств, в том числе 5 видов из семейства Poaceae, 4 вида – из семейства Asteraceae, 3 вида – из семейства Lamiaceae. Остальные

15 семейств представлены 1–2 видами. Кальцефильные растения по-разному приспособлены к переживанию неблагоприятных условий. В этой группе доминируют разные группы травянистых поликарпиков, значительна доля полукустарничков (табл. 1).

Растения изученной группы обитают преимущественно на карбонатных обнажениях по крутым чаще южным склонам, поэтому среди них доминирует группа ксерофитов (табл. 2).

Большинство облигатных кальцефилов флоры Мордовии находятся на территории республики преимущественно на границах своего распространения (чаще северных), а некоторые представители имеют значительный отрыв от основных частей своих ареалов. Например, *Scutellaria supina* L. имеет одно местонахождение в Мордовии, а вне ее из 5 сопредельных регионов приводится только для Ульяновской области, причем без указания конкретного местонахождения [4].

Таблица 1.

Жизненные формы кальцефильных растений Республики Мордовия.

Жизненные формы	Число видов	Доля (%) от общего числа видов
Полукустарнички	6	21
Стержнекорневые травянистые поликарпики	10	35
Короткокорневищные травянистые поликарпики	7	25
Длиннокорневищные травянистые поликарпики	3	10
Паразитные травянистые поликарпики	1	3
Луковичные травянистые поликарпики	1	3
Однолетники	1	3
Всего	29	100

Всего по одному местонахождению имеют в республике еще 8 видов: *Festuca cretacea* T. Pop. et Proskorjakov, *Carex pediformis* C. A. Mey., *Allium cretaceum* N. Friesen & Seregin (*A. globosum* Bieb. ex Redoute), *Silene baschkirorum* Janisch., *Polygala cretacea* Kotov, *Euphorbia kaleniczenkii* Czern., *Helianthemum nummularium* (L.) Mill., *Scabiosa isetensis* L.

Таблица 2

Экологические группы кальцефильных растений Республики Мордовия по отношению к увлажнению.

№ п/п	Экологическая группа	Число видов	Доля (%) от общего числа видов
1	Ксерофиты	15	48
2	Мезоксерофиты	10	34
3	Ксеромезофиты	4	18
Всего		29	100

Генофонд пограничноареальных популяций часто отличается от генофонда вида в его основной части ареала. Это связано с наличием различных изоляционных барьеров, как ландшафтных, так и биологических, поэтому их сохранение особенно важно для обеспечения целостности генотипа вида.

В Красную книгу Республики Мордовия включены 20 видов кальцефильных растений, что составляет 12,2% всех сосудистых растений в ней. При этом 13 видов из этого списка имеют категорию 1 – «находящиеся под угрозой исчезновения» (20,6% видов этой категории), 7 – категорию 2 – «уязвимые (сокращающиеся в численности)» и 1 вид – категорию 3 – «редкий». Необходимо отметить, что большая часть из оставшихся 9 видов входят в так называемый дополнительный список, редких и уязвимых видов, не включенных в Красную книгу, но нуждающихся в постоянном мониторинге [2]. Особое место в этом списке занимают *Stipa pulcherrima* С. Koch и *Thymus cimicinus* Blum ex Ledeb., так как они входят в Красную книгу Российской Федерации [3]. *Koeleria spryginii* Tzvelev – эндемик Среднего Поволжья считается результатом интрогрессивной гибридизации *Koeleria sclerophylla* P.A. Smirn., входящего в Красную книгу Российской Федерации [2, 8]. Locus classicus этого вида расположен в Лямбирском районе Мордовии. *Festuca cretacea* T. Pop. et Proskorjakov – эндемик бассейнов Дона и Суры. Она известна в Мордовии лишь по сбору из Большеберезниковского района, процитированному Н.Н. Цвелевым: Пензен. губ., Саранский у., близ с. Гарт, 18.06.1912, М. Г. Попов (LE), причем на основании этого сбора описана особая разновидность этой овсяницы – var. *porovii* Tzvel. [5, 7].

Наиболее действенная охрана растений обеспечивается на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). К сожалению, в Республике Мордовия существует лишь два памятника природы, на которых встречаются популяции кальцефильных растений. Это «Известняковый склон» между селами

Гарт и Дегилевка (*Polygala sibirica* L., *Hypericum elegans* Steph. ex Willd., *Bupleurum falcatum* L., *Centaurea ruthenica* Lam.) и «Участок ковыльной степи» близ поселка Вейсэ (*Polygala sibirica* L., *Hypericum elegans* Steph. ex Willd., *Bupleurum falcatum* L., *Thymus cimicinus* Blum ex Ledeb., *Centaurea ruthenica* Lam.). Обе ООПТ находятся в Большеберезниковском районе [6]. В их границах зарегистрировано 6 видов кальцефильных растений Красной книги Республики Мордовия, остальные 13 видов находятся вне ООПТ.

Таким образом, кальцефильная флора Республики Мордовия насчитывает 29 видов облигатных кальцефилов, большая часть которых подлежит охране, но существующей сетью ООПТ охвачены немногие из них. Необходимы тщательное изучение состояния популяций этих растений и организация их охраны путем образования новых ООПТ.

Список литературы:

1. Географический атлас Республики Мордовия. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2012. – 204 с.
2. Красная книга Республики Мордовия. Т. 1. Редкие виды растений и грибов. Изд. 2-е, перераб. / науч. ред. и сост. Т.Б. Силаева. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2017. – 409 с.
3. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / гл. редкол.: Ю. П. Трутнев и др. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 885 с.
4. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Васюков В.М. Сосудистые растения Ульяновской области. – Тольятти: «Кассандра», 2014. – 295 с.
5. Сосудистые растения Республики Мордовия (конспект флоры): монография / Т.Б. Силаева, И.В. Кириухин, Г.Г. Чугунов, В.К. Лёвин, С.Р. Майоров, Е.В. Письмаркина, А.М. Агеева, Е.В. Варгот; под ред. Т.Б. Силаевой. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. – 352 с.
6. Территории особого природоохранного значения Республики Мордовия. Изумрудная книга Российской Федерации. Территории особого природоохранного значения Европейской России. Ч. 1. – М.: Институт географии РАН, 2011–2013. – С. 97–116.
7. Цвелев Н.Н. Злаки СССР. – Л.: «Наука», 1976. – 788 с.
8. Цвелев Н.Н. О роде Тонконог (*Koeleria* Pers., Poaceae) в России // Новости систематики высших растений. – СПб.: «Наука», 2011. – Т. 42. – С. 63–90.