

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-269-271

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСТАТКОВ ЭЛАСМОЗАВИД В ГОТЕРИВСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ УЛЬЯНОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Стеньшин Илья Михайлович

кандидат биологических наук, директор Ундоровского палеонтологического музея, г. Ульяновск

Благовещенский Иван Викторович

доктор биологических наук, профессор кафедры биологии, экологии и природопользования Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск

Шумилкин Игорь Анатольевич

палеонтолог, г. Ульяновск

Аннотация. В статье рассматриваются особенности стратиграфического распространения остатков эласмозаврид обнаруженных на территории Ульяновского Поволжья.

Ключевые слова: эласмозавриды, верхний готерив, Ульяновское Поволжье.

DISTRIBUTION OF ELASMOSAURID REMAINS IN THE HAUTERIVIAN DEPOSITS OF THE ULYANOVSK VOLGA REGION

Stenshin Ilya Mikhailovich

candidate of biological Sciences, Director of the Undory paleontological Museum, Ulyanovsk

Blagoveshchenskii Ivan Viktorovich

doctor of biological Sciences, Professor of the Department of biology, ecology and nature management of Ulyanovsk state University, Ulyanovsk

Shumilkin Igor Anatolyevich

paleontologist, Ulyanovsk

Abstract. The article discusses the stratigraphic distribution of elasmosaurid remains found on the territory of the Ulyanovsk Volga region.

Keywords: elasmosaurid, upper hauterivian, Ulyanovsk Volga region.

В 2007 году на берегу реки Волги к северу от Ульяновска, в окрестностях п. Поливно и п. Сланцевый Рудник были обнаружены остатки трех скелетов эласмозаврид разной полноты и сохранности. Костные остатки происходили из отложений верхнего готерива, однако более детальная привязка оказалась невозможной: все три фрагмента скелетов были найдены в оползневых телах на урзе воды, причем отдельные части скелетов вымывались и оказывались на поверхности не сразу. Данное обстоятельство затруднило возможность установления положения остальных частей скелета на момент обнаружения, а также определило невозможность проведения раскопок и осложнило непосредственно сбор костных остатков. С целью выяснения стратиграфического положения остатков эласмозаврид был проведен анализ состава гастропод

присутствующих как на костных остатках, так и во вмещающей остатки породе, а также диагностика уровней глинисто-карбонатных конкреций, вмещающих некоторые костные остатки.

Готеривские отложения в Ульяновском Поволжье представлены толщей темно-серых и серых слабо песчаных глин, с подчиненными прослоями и линзами глинистого алевролита. Общая мощность отложений достигает 50 м. Не смотря на длительную историю изучения этот интервал нижнего мела остается пока еще слабоизученным. До сих пор нет единого мнения по подразделению готеривских отложений. Согласно аммонитовому зональному стандарту бореального пояса [Барабошкин, 2004] готеривские отложения Ульяновского Поволжья относятся к верхнему подъярису и подразделяются на триаммонитовые зоны: зона *Speetonicerasperiscolor* с подзонами *Speetonicerasperiscolor*, *Simbirskitescoronatiformis*, *Speetonicerasinversum* и *Speetoniceraspavlovae*, зона *Milanowskiaspeetonensis* без подзонального расчленения и зона *Craspedodiscusdiscofalcatus* подзонами *Simbirskitespseudobarboti*, *Simbirskitesumbonatus* и *Craspedodiscusdiscofalcatus*. Ревизия ярусных и подъярусных границ, выполненная на основе не-палеонтологических данных в сопоставлении тетической бореальной шкалы нижнего мела [Барабошкин, Гужиков, 2018], вносит существенные изменения в представления о расчленении и объеме яруса. Согласно данным полученным методами био-, магнито-, и хемотратиграфии (стабильные изотопы) граница нижнего и верхнего готерива по палеомагнитным данным разрезов Среднего Поволжья должна проводиться внутри зоны *Speetonicerasperiscolor*, а кровля готерива должна проводиться в основании подзоны *Craspedodiscusdiscofalcatus* одноименной зоны, сама же подзона таким образом исключается из объема готерива и входит в состав нижнего баррема. Авторы настоящей статьи опираясь на многолетние послонные сборы и недостаточную изученность распределения аммонитов, придерживаются взглядов на подразделение верхнего готерива предложенное еще А.П. Павловым [Pavlow, 1892, 1901], в котором им были выделены две зоны - *Speetonicerasperiscolor* и *Simbirskitesdecheni*.

В толще готеривских глин имеется ряд выдержанных уровней глинисто-карбонатных конкреций величиной от 20-30 см до 1,5 м. Они образуют хорошо выраженные в пространстве горизонты, обладают специфическим внешним и внутренним строением, а также надежно привязываются к определенной части разреза. Данные горизонты конкреций используются как специфические маркеры - уровни, которые служат для корреляции разрезов и надежной привязки фауны, встречающейся в




Рис. 1. Распространение эласмозаврид в верхнем готериве Ульяновского Поволжья (карта-схема местонахождения скелетных остатков и строение опорного разреза): 1- глинистый алеврит, 2 – глины, 3- глинисто-карбонатные конкреции, 4 – конкреции пирита, 5 – фосфоритовые конкреции, 6 – раковистый детрит, 7 – поверхность мягкого дна, 8 – положение скелетных остатков эласмозаврид.

них. В глинах также присутствуют прослои темно-серых песчаных и алевритистых глин, их поверхности имеют обозначение уровней. Для удобства расчленения и корреляции готеривских отложений Ульяновского Поволжья, в основном представленных однообразными глинами, отложения расположенные между уровнями конкреций и поверхностями прослоев так же получили статус слоев [Благовещенский, Шумилкин, 2006 а,б].

Стратиграфическая привязка выявленных гастропод дает результаты разной степени точности, однако вместе с дополнением данных о морфологии и внутреннем строении конкреций, вмещающих костные остатки, позволяет сделать довольно точные выводы только о положении двух фрагментов скелетов, происходящих из окрестностей п. Поливно.

Экземпляр №1? представлен позвоночным столбом с фрагментами костей конечностей часть из которых заключена в конкрецию, содержит типичный комплекс гастропод так называемой «пресноводной фауны»: *Crispotrochushumilis* (Trautschold, 1865) (= *Turbohumilis*), *Hudlestoniellapusilla* (Tullberg 1881),

Tornatellaeakabanovi Blagovetshenskiy, 2017 (*Actaeonaff. frearsianus* по Глазуновой, 1973), а также многочисленных червей *Ditrupe*, что позволяет отнести экземпляр к интервалу от Г13 до Г15. Однако необходимо сделать несколько замечаний. *Hudlestoniellapusilla* (Tullberg 1881), *Tornatellaeakabanovi* Blagovetshenskiy, 2017 могут встречаться и в зоне *versicolor*, однако *Crispotrochushumilis* (Trautschold, 1865) встречается только в зоне *decheni*, причем тяготеет именно к указанному интервалу (несколько выходя за пределы горизонта «пресноводной фауны», встречается от Г11.1 до Г15), но такие массовые скопления фауны, как на фрагменте плезиозавра можно видеть только в интервале от Г13 до Г15. Морфология и внутреннее строение вмещающей костные остатки конкреции (структура породы на аншлифе, а также специфические кальцитовые жилы покрывающие внутренние полости конкреции) позволяют дать более точную привязку и отнести фрагмент скелета к уровню Г13 *Simbirskitesdecheni*.

Экземпляр №2 фрагментом скелета эласмозавра

находящийся в нескольких глинисто-карбонатных конкрециях. Имеет как сочлененные, так и несочлененные фрагменты позвоночного столба, ребра, отдельные кости поясов конечностей и их фрагменты. Беспозвоночной фауны на данном экземпляре обнаружено не было, однако специфические особенности самих конкреций, а также строение породы и структура кальцитовых жил заполняющих внутренние полости, позволяют с уверенностью отнести данный экземпляр к уровню Г11,1 зоны Simbirskitesdecheni.

Фрагмент скелета эласмозавриды происходящий из окрестностей п. Сланцевый Рудник (экземпляр №3) имеет специфическую сохранность характерную для зоны Speetonicerasversicolor – поверхность остатков покрыта пиритовыми образованиями, причем пирит во многом замещает и саму костную ткань. Это наиболее полный скелет в составе которого сохранилась значительная часть позвоночного столба фрагменты костей поясов конечностей, фрагменты плечевых костей, бедра и другие кости. На одном из фрагментов позвоночного столба присутствует *Khetellaglasunovi* Guzhov, 2004 (= *K. Trautscholdi* Blagovetshenskiy et Shumilkin, 2006). Этот вид массово встречается по всей толще верхнего готерива - и в зоне versicolor, и в зоне decheni. Однако особи из зоны versicolor заметно более крупные, что также подтверждает привязку с точностью до зоны, более детальная привязка скелетных остатков не возможна. Учитывая расположение места находки и общую закономерность простираения отложений, наиболее вероятно происхождение остатков из средней части зоны.

Учитывая стратиграфическое распространение перечисленных скелетных остатков (рис. 1), становится очевидным, что эласмозавриды присутствовали в Среднерусском море в пределах Ульяновского Поволжья на протяжении всего позднего готерива.

Список литературы:

1. Барабошкин Е.Ю. Нижнемеловой аммонитовый зональный стандарт Бореального пояса // Бюл. МОИП. Отд.геол. 2004. - Т.79. - Вып.3. - С.44-68.
2. Барабошкин Е.Ю., Гужиков А.Ю. Бореальный нижний мел России: ревизия ярусных границ на основе не-палеонтологических данных. / Мат. IX Всеросс. Сов. «Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии» / Под ред. Е.Ю. Барабошкина, Т.А. Липницкой, А.Ю. Гужикова. – Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2018. - С 47 - 53.
3. Благовещенский И.В., Шумилкин И.А. Брюхоногие моллюски из готеривских отложений Ульяновского Поволжья. 1. Семейство Aporrhaidae // Палеонтол. журн. 2006 а. - № 1. - С. 33-42.
4. Благовещенский И.В., Шумилкин И.А. Брюхоногие моллюски из готеривских отложений Ульяновского Поволжья. 2. Роды Khetella Beisel, 1977 и Cretadmetegen. nov. // Палеонтол. журн.- 2006 б.- № 2. - С. 29-33.
5. Глазунова А.Е. Палеонтологическое обоснование стратиграфического расчленения меловых отложений Поволжья. Нижний мел. - М.:Недра, 1973. - 324 с.
6. Pavlow A.P. In: A.P.Pavlow, G.W.Lamplugh, Argiles de Speeton et leurs equivalents, Bullutin de la Societe des Naturalistes de Moscou, nov. ser., 1892. - No.5. -p.181-276, 455-570.
7. Pavlow A.P. Le Cretaceinferieur de la Russieetsafaune. I. Apercu historique des recherches, suivid'indicarions sur la distribution des merset des terres aux differentesepoques. II. Cephalopodes du Neocomiensuperieur du type de Simbirsk. Nouveaux Memoires de la Societe des Naturalistes de Moscou, 1901. - t.XVI (21), - No.3, p.1-87.