

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-283-284

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ ГЕОПАРКА «УНДОРИЯ»**Стеньшин Илья Михайлович**

кандидат биологических наук, директор Ундоровского палеонтологического музея им. С.Е. Бирюкова, г. Ульяновск

Аннотация. В статье приведены ключевые особенности и обоснован статус геологических разрезов международного значения расположенных в пределах геопарка «Ундория».

Ключевые слова: геологические разрезы, геопарк «Ундория».

INTERNATIONAL SIGNIFICANCE OF THE GEOLOGICAL SECTIONS OF UNDORIA GEOPARK**Stenshin Ilya Mikhailovich**

candidate of Biological Sciences, Director of the Undorovsky Paleontological Museum. S.E. Biryukov, Ulyanovsk

Abstract. The article presents the key features and substantiates the status of geological sections of international importance located within the geopark "Undoria".

Keywords: geological sections, geopark "Undoria".

С целью сохранения выходов геологических пластов и содержащихся в них остатков ископаемой фауны в 1988 году было принято решение о создании на территории Ульяновской области Ульяновского государственного палеонтологического заказника, а в 2018 году – геопарка «Ундория». В 2020 году геопарк был утвержден в новых границах, и сейчас основная его территория располагается в междуречье Волги и Свияги (частично левобережье Свияги) к северу от Ульяновска и до границ с республикой Татарстан. Общая площадь территории 491,92 кв. км. На сегодняшний момент геопарк «Ундория» имеет региональный статус, однако имеет весь потенциал быть включённым в сеть Глобальных геопарков ЮНЕСКО (GGN).

Геологические разрезы геопарка «Ундория» имеют значительную протяженность, и их описание составлено по отдельным стенкам, наиболее полно характеризующим определенную часть разреза. Всего на территории геопарка «Ундория» 18 геологических разрезов: Дубки (2 разреза), Малые Ундоры (1 разрез), Погребенная долина (1 разрез), Городищи (3 разреза), Чертов гребень (1 разрез), Детский санаторий (4 разреза), Сланцевый рудник (5 разрезов) и Брехово болото (1 разрез). Вблизи южных границ геопарка находится опорный разрез Поливно, вскрывающий отложения верхней части верхнеготеривского подъяруса (описан в 3 разрезах).

Геологические разрезы международного значения:

Разрез Дубки Разрез 29(54°36'33.88" N; 48°26'20.79" E)

Разрез Дубки Разрез 31(54°37'20.89" N; 48°27'24.80" E)

Кимериджский ярус Европейской части России остается наименее изученным в верхней юре. В настоящее время наиболее полно исследованы интервалы вблизи нижней и верхней границ кимериджа, тогда как сведения об остальной части яруса в значительной степени отрывочны. Разрез 29 и Разрез 31 характеризуются весьма значительной мощностью, в отличие от разрезов других районов Европейской России, где отложения уничтожены размывами, сконденсированы или сохранились как реликты. Сведения о разрезах и их фауне можно найти в публикациях (Зонон, 1939, Даин, Кузнецова, 1976, Hantzpergue et al., 1998, Рогов, 2002а, 2002в, Rogov et al., 2006, Scherzinger et Mitta, 2006, Рогов, Щепетова, 2011, Щепетова, Рогов, 2013).

Разрез Малые Ундоры Разрез 1(54°35'46.64" N; 48°25'32.16" E)

Здесь был обнаружен голотип юрского ихтиозавра *Ophthalmosaurus undorensis* Efimov, 1991 (Ефимов, 1991).

Разрез Городищи Разрез 2А(54°34'55.20" N; 48°25'05.59" E)

Разрез Городищи Разрез 2Б(54°34'16.99" N; 48°24'59.82" E)

Разрез Городищи Разрез 6(54°33'54.73" N; 48°24'53.77" E)

Это обнажение, открытое ещё в конце XVIII века (Лепехин, 1771, с.307-310; Pallas, 1771, S.118-120), является одним из наиболее изученных разрезов юры Европейской части России. Во время двух Международных геологических конгрессов, проходивших в Российской империи и СССР (Санкт-Петербург, 1897; Москва, 1984) и Международного коллоквиума по границе юры и мела (Новосибирск, 1977) на этот разрез были организованы экскурсии. В 2010 г на данный разрез также была организована геологическая экскурсия ввремя работы совещания «Меловая система России» (Барабошкин, Благовещенский, 2010). В 1964-м году Постановлением расширенного заседания бюро Юрской комиссии МСК разрез Городищи был выбран в качестве лектостратотипа волжского яруса, а вскоре П.А. Герасимов и Н.П. Михайлов (1966) опубликовали описание этого разреза, составленное в соответствии с утвержденными МСК «Правилами изучения и описания стратотипов и опорных стратиграфических разрезов». В последние десятилетия из разреза Городищи были детально изучены аммониты (Михайлов, 1964; Месежников и др., 1977; Рогов, 2002, 2013; Rogov, 2010; Киселёв, Рогов, 2005, Kiselev, Rogov, 2018), белемниты (Густомесов, 1964), фораминиферы (Даин, Кузнецова, 1976), остракоды и известковый наннопланктон (Lord et al., 1986), а также радиолярии (Вишневецкая, Барабошкин, 2001), палинология (Riding et al., 1999; Smith, 1999; Smith, Harding, 2004; Harding et al., 2011) и остатки морских рептилий (Hua et al., 1996, Ефимов, 1998, 1999 а, б, Arkhangelsky et al., 2019, Zverkov, Prilepskaya, 2019).

Были получены данные по изотопному составу кислорода и углерода в рострах белемнитов и распределению глинистых минералов (Ruffel et al., 2002; Price, Rogov, 2009), а также петромагнитные (Гужиков и др., 1999; Rogov et al., 2006) и магнитостратиграфические (Baraboshkin et al., 2015) результаты. Этот разрез был предложен в качестве возможного кандидата для GSSP титонского яруса (Rogov, 2010) и точка вторичного стратотипа границы (Secondary Stratotype Section and Point, SSSP) волжского яруса (Захаров, 2003). Описание разреза составлено по трем геологическим колонкам (Разрез 2А, Разрез 2Б, Разрез 6).

Разрез Детский санаторий Разрез 3 (54°29'38.56" N; 48°24'16.78" E)

Здесь был обнаружен голотип юрского ихтиозавра *Otscheviapseudoscythica* Efimov, 1998 (ныне *Grendeliapseudoscythica* Efimov, 1998) (Efimov, 1998 и Zverkov et al., 2015).

Разрез Детский санаторий Разрез 4 (54°29'34.07" N; 48°24'20.13" E)

Здесь был обнаружен голотип юрского ихтиозавра *Yasykoviayasykovi* Efimov, 1999 (ныне *Nannopterygiusyasykovi* Efimov, 1999) (Efimov, 1999 и Zverkov, Jacobs, 2020) и голотип юрского ихтиозавра *Otscheviaalekseevi* Arkhangelsky, 2001 (ныне *Grendeliu salekseevi* Arkhangelsky, 2001) (Архангельский, 2001 и Zverkov et al., 2015).

Разрез Детский санаторий Разрез 7 (54°29'14.74" N; 48°24'16.14" E)

Здесь был обнаружен голотип мелового ихтиозавра *Plutonosaurus bedengensis* Efimov, 1997 (Efimov, 1997) и голотип мелового ихтиозавра *Sveltonectes insolitus* Fischer et al. 2011 (Fischer et al. 2011)

Разрез Детский санаторий Разрез 8 (54°29'00.03" N; 48°24'15.41" E)

Здесь был обнаружен голотип мелового плиоизавра *Luskhanitilensis* Fischer et al. 2017 (Fischer et al. 2017)

Разрез Сланцевый рудник Разрез 9 (54°27'01.92" N; 48°23'43.71" E)

Здесь был обнаружен голотип мелового плиоизавра *Makhairarossica* Fischer et al. 2015 (Fischer et al. 2015).

Разрез Сланцевый рудник Разрез 5А (54°26'45.13" N; 48°23'31.04" E)

Здесь был обнаружен голотип юрского *Undorosaurus nessovi* Efimov, 1999 (Efimov, 1999)

Разрез Сланцевый рудник Разрез 5Б (54°26'39.93" N; 48°23'29.05" E)

Разрез характеризует нижнюю часть верхнего готерива, валанжин, рязань (?) и верхневолжский подъярус. Сведения о готеривской части разреза, и его фауне можно найти в публикациях (Pavlov, 1892, 1901; Милановский, 1940а, б; Чернова, 1951; Сазонова, 1958; Глазунова, 1967, 1973; Мятлюк, 1984; Барабошкин, 2001, 2008; Guzhikov et al., 2003; Благовещенский, Шумилкин, 2006а, б, Барабошкин, Благовещенский, 2010).

Разрез Сланцевый рудник Разрез 10 (54°26'23.36" N; 48°23'19.49" E)

Здесь был обнаружен голотип мелового зауропода *Volgatitansimbirskiensis* Averianov et Efimov, 2018 (Efimov, 1997, Averianov, Efimov, 2018) и голотип мелового плезиозавра *Juchasqualea* Fischer et al. 2021 (Fischer et al. 2021).

Разрез Сланцевый рудник Разрез 11 (54°25'34.53" N; 48°23'10.54" E)

Разрез характеризует среднюю и верхнюю часть верхнего готерива. Сведения о разрезе, и его фауне можно найти в публикациях (Pavlov, 1892, 1901; Милановский, 1940а, б; Чернова, 1951; Сазонова, 1958; Глазунова, 1967, 1973; Мятлюк, 1984; Барабошкин, 2001, 2008; Guzhikov et al., 2003; Благовещенский, Шумилкин, 2006а, б, Барабошкин, Благовещенский, 2010).

Список литературы:

1. Барабошкин Е.Ю., Благовещенский И.В. Опорные разрезы верхней юры и нижнего мела района г. Ульяновска // Путеводитель экскурсий Пятого Всероссийского совещания «Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии» (27 и 28 августа 2010 г., г. Ульяновск). – Ульяновск: УлГУ, 2010. – 38 с.
2. Рогов М.А., Барабошкин Е.Ю., Гужиков А.Ю., Efimov В.М., Киселёв Д.Н., Мороз В.П., Гусев В.В. Граница юры и мела в Среднем Поволжье // Путеводитель экскурсии «Международная научная конференция по проблеме границы юрской и меловой систем». 7-13 сентября 2015 г., г. Самара (Россия). – Самара: ФГБУ СамГТУ, 2015. – 130 с.