

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-152-153

РАЗМЕРНО-ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА МАССОВЫХ ВИДОВ МОРСКИХ ОКУНЕЙ (SEBASTIDAE, PISCES) В ПРИКАМЧАТСКИХ ВОДАХ

Токранов Алексей Михайлович

доктор биологических наук, старший научный сотрудник, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский

Аннотация. Рассмотрен половой диморфизм в размерах у 4 видов морских окуней (Sebastidae) в прикамчатских водах. Показано, что, несмотря на разный характер размножения, для всех из них свойственен единый тип размерно-половой структуры.

Ключевые слова: морские окуни, половой диморфизм, размерно-половая структура.

SIZE-SEX STRUCTURE OF NUMEROUS SPECIES OF ROCKFISHES (SEBASTIDAE, PISCES) IN NEAR KAMCHATKA WATERS

Tokranov Alexey Mikhailovich

Doctor of Biological Sciences, Senior science, Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute of Far Eastern Branch of RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky

Annotation. Sex dimorphism at sizes of 4 species of the rockfishes (Sebastidae) in the near Kamchatka waters is considered. In spite of different character of the reproduction, all this rockfishes are possessed by the united type of size-sex structure.

Keywords: rockfishes, sex dimorphism, size-sex structure.

Морские окуни семейства Sebastidae - одна из наиболее разнообразных в систематическом отношении групп рыб северной части Тихого океана, представители которой обладают относительно высокой численностью, играют существенную роль в донных и придонных ихтиоценозах шельфа и верхней батиали, являясь ценными объектами промысла. По современным представлениям [1, 5 и др.], в Северной Пацифике обитает более 100 видов морских окуней, 37 из которых встречаются у азиатского побережья. Однако подавляющее большинство из них зарегистрировано у берегов Японии [5]. По мере продвижения на север происходит обеднение видового состава этих рыб, в связи с чем, в прикамчатских

водах встречается лишь 7 видов рода *Sebastes* и два представителя рода *Sebastolobus* [1, 5, 13].

До настоящего времени многие вопросы биологии морских окуней в северо-западной части Тихого океана, в том числе их размерно-половая структура, остаются изученными недостаточно [6, 9, 11 и др.]. Поскольку представители родов *Sebastolobus* и *Sebastes* различаются характером размножения (первые из них являются икромечущими видами с внутренним оплодотворением, вторые – живородящими с внутренним оплодотворением) [3 и др.], цель данной работы – на основании обобщения материалов (результаты биоанализов более 15 тыс. экз.), собранных в 1992-2003 гг. в прикамчатских водах, проанализировать особенности размерно-половой структуры 4 наиболее массовых в этом районе видов семейства Sebastidae - аляскинского *Sebastolobus alascanus* и длиннопёрого *S. macrochir* шипощёков, северного *Sebastes borealis* морского окуня и тихоокеанского клювача *S. alutus*.

Среди рассматриваемых видов максимальными размерами обладают северный окунь и аляскинский шипощёк (первый – 120 см и 23 кг, второй – 80 см и 9 кг соответственно) [3, 10-12]. Тихоокеанский клювач и длиннопёрый шипощёк значительно мельче: наибольшая длина первого из них достигает 53 см, а масса тела 2,15 кг [5, 8, 12], второго - 46 см и 1,5 кг [4, 7]. По нашим данным, в 1992-2003 гг. северный морской окунь в прикамчатских водах в уловах был представлен самцами длиной 12-98 см (масса – 0,1-14,0 кг) в возрасте 3-36 лет и самками длиной 13-116 см (масса – 0,1-23,0 кг) в возрасте 4-38 лет, а тихоокеанский клювач - самцами длиной 8-42 см (масса – 0,03-1,2 кг) в возрасте 3-19 лет и самками длиной 9-46 см (масса – 0,1-1,6 кг) в возрасте 3-24 лет. Размеры самцов аляскинского шипощёка в уловах колебались в пределах 19-69 см (масса – 0,1-5,5 кг), а возраст – 4-24 лет, самок – 18-80 см (масса – 0,1-8,6 кг) и 4-29 лет, тогда как самцов длиннопёрого шипощёка – 11-45 см (масса – 0,1-1,2 кг) в возрасте 3-27 лет, самок – соответственно 9-44 см (масса – 0,1-1,4 кг) и 3-25 лет (табл. 1).

Анализ имеющихся материалов свидетельствует, что, несмотря на различия в характере размножения,

Таблица 1.

Максимальные размерно-возрастные показатели самцов и самок исследуемых видов морских окуней в прикамчатских водах в 1992-2003 гг.

Вид	Длина, см		Масса, кг		Возраст, лет	
	самцы	самки	самцы	самки	самцы	самки
Северный морской окунь	98	116	14,0	23,0	36*	38*
Тихоокеанский клювач	42	46	1,2	1,6	19	24
Аляскинский шипощёк	69	80	5,5	8,6	24	29
Длиннопёрый шипощёк	44	45	1,2	1,4	27**	25**

Примечание. Значения получены - * для особей длиной 98-101 см, ** для особей длиной 39-40 см..




Рис. 1. Относительное число самок (%) в размерных группах северного морского окуня (А, n=6539) и тихоокеанского клывача (Б, n=1957) в прикамчатских водах.




Рис. 2. Относительное число самок (%) в размерных группах аляскинского (А, n=2545) и длиннопёрого (Б, n=4068) шипощёков в прикамчатских водах.

рассматриваемым видам морских окуней свойственен тип размерно-половых отношений близкий ко второму по Д.Ф. Замахаеву [2]. У представителей данного типа самцы мельче самок, созревают в более раннем возрасте (что ведёт к заметному увеличению их доли в нерестовой части популяции) и отличаются меньшей продолжительностью жизни. Особенно велика разница предельных размеров особей различных полов у северного морского окуня (табл. 1).

Среди крупных особей исследуемых представителей сем. Sebastidae относительное число самок резко увеличивается, достигая 100% среди рыб максимальных размеров – у северного морского окуня свыше 98, у тихоокеанского клывача – свыше 42 (рис. 1), а у аляскинского шипощёка – свыше 69 см (рис. 2). Они же несколько доминируют в популяциях этих видов в целом, составляя соответственно 54,0, 50,8 и 56,6%.

В отличие от них, хотя у длиннопёрого шипощёка по мере увеличения размеров относительное количество самок также начинает возрастать (рис. 2), достигая максимальных значений (до 80%) при длине свыше 40 см, даже среди самых крупных рыб отмечаются особи обоих полов (табл. 1). По всей видимости, это обусловлено тем, что размеры одновозрастных самцов и самок этого представителя морских окуней различаются незначительно, что обусловлено их сходным темпом роста. Однако, как и у трёх остальных исследуемых видов, в его популяции в целом преобладают самки (54,5%).

Таким образом, несмотря на различия в характере размножения (морские окуни рода *Sebastolobus* являются икромечущими, а рода *Sebastes* - живородящим

с внутренним оплодотворением), для трёх из четырёх исследованных видов этих рыб (северного морского окуня, тихоокеанского клывача и аляскинского шипощёка) характерен половой диморфизм в размерах половозрелых самцов и самок - первые мельче вторых, созревают в более раннем возрасте и отличаются меньшей продолжительностью жизни. Среди крупных особей доля самок резко увеличивается, достигая 100% в группах рыб максимальных размеров. Они же несколько доминируют в популяциях этих видов в целом. В отличие от них, у длиннопёрого шипощёка по мере увеличения размеров относительное количество самок, хотя и возрастает, однако даже среди самых крупных рыб отмечаются особи обоих полов, что, по-видимому, обусловлено их сходным темпом роста. Однако, как и у трёх остальных исследуемых видов, в его популяции в целом преобладают самки.

Список литературы:

1. Барсуков В.В. Аннотированный и иллюстрированный каталог морских окуней Мирового океана. - СПб.: ЗИН РАН, 2003 (Тр. ЗИН РАН. Т.295). - 319 с.
2. Замахаев Д.Ф. О типах размерно-половых соотношений у рыб // Тр. Моск. ин-та рыбн. пром-сти и хоз-ва. - 1959. - Вып.10. - С.183-209.
3. Новиков Н.П. Промысловые рыбы материкового склона северной части Тихого океана. - М.: Пищевая пром-сть, 1974. - 308 с.
4. Орлов А.М. Пространственное распределение и размерный состав наиболее массовых скорпеновых (*Scorpaenidae, Pisces*) мезобентали северных Курильских островов // Изв. ТИНРО-Центра. - 1996. - Т.119. - С.149-177.
5. Снытко В.А. Морские окуни северной части Тихого океана. - Владивосток: ТИНРО-Центр, 2001. - 468 с.
6. Токранов А.М. Размерно-половая структура и темп полового созревания северного морского окуня *Sebastes borealis* Barsukov

- (Scorpaenidae) в прикамчатских водах // Исслед. биол. и динамики числ. промысл. рыб камч. шельфа. - Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО, 1998. - Вып.IV. - С.39-42.
7. Токранов А.М. Размерно-возрастная структура морских окуней рода *Sebastolobus* в тихоокеанских водах юго-восточной Камчатки и северных Курильских островов в условиях ограниченного промысла // Вопр. рыболовства. - 2000. - Т.1. - №4. - С.58-73.
 8. Токранов А.М. Распределение и размерно-возрастной состав окуня клювача *Sebastes alutus* (Sebastidae) в тихоокеанских водах северных Курильских островов и юго-восточной Камчатки в конце XX – начале XXI веков // Исслед. водных биол. ресурсов Камчатки и северо-западной части Тихого океана. - Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО, 2004. - Вып.7. - С.207-214.
 9. Токранов А.М. Размерно-половая структура длинноперого шипоцека *Sebastolobus macrochir* Gunter (Sebastidae) прикамчатских вод // Исслед. водных биол. ресурсов Камчатки и северо-западной части Тихого океана. - Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО, 2004. - Вып.7. - С.218-223.
 10. Токранов А.М., Давыдов И.И. Некоторые вопросы биологии северного морского окуня *Sebastes borealis* (Scorpaenidae) в тихоокеанских водах Камчатки и западной части Берингова моря. 2. Размерно-возрастной состав // Вопр. ихтиологии. - 1998. - Т.38. - №1. - С.42-46.
 11. Токранов А.М., Новиков Р.Н. Распределение и размерно-возрастной состав аляскинского шипоцека *Sebastolobus alascanus* (Scorpaenidae) в тихоокеанских водах Камчатки и западной части Берингова моря // Вопр. ихтиологии. - 1997. - Т.37. - №3. - С.316-322.
 12. Фадеев Н.С. Справочник по биологии и промыслу рыб северной части Тихого океана. - Владивосток: ТИНРО-Центр, 2005. - 366 с.
 13. Шейко Б.А., Федоров В.В. Класс Cephalaspidomorphi - Миноги. Класс Chondrichthyes - Хрящевые Рыбы. Класс Holoccephali - Цельноголовые. Класс Osteichthyes - Костные Рыбы // Каталог позвоночных Камчатки и сопредельных морских акваторий. - Петропавловск-Камчатский: Камч. печатный двор, 2000. - С.7-69.