

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-174-175

СОСТАВ УДЕБНЫХ УЛОВОВ РЫБ В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ ПОСЛЕ ВРЕДНОСНОГО ЦВЕТЕНИЯ ВОДОРΟΣЛЕЙ ОСЕНЬЮ 2020 Г.

Токранов Алексей Михайлович

доктор биологических наук, старший научный сотрудник, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский

Аннотация. Приведены данные о составе и относительной численности рыб в удебных уловах в верхней сублиторали юго-восточной Камчатки в июле-августе 2021 г. Показано, что вредоносное цветение водорослей осенью 2020 г. практически не повлияло на численность и жизнедеятельность представителей ихтиофауны, способных избегать участков с неблагоприятными условиями.

Ключевые слова: прибрежные рыбы, видовой состав, удебные уловы, юго-восточная Камчатка, вредоносное цветение водорослей.

COMPOSITION OF THE HOOK CATCHES OF FISHES IN THE COASTAL WATERS OF THE SOUTH-EASTERN KAMCHATKA AFTER HARMFUL ALGAL BLOOM IN AUTUMN 2020

Tokranov Alexey Mikhailovich

Doctor of Biological Sciences, Senior science, Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute of Far Eastern Branch of RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky

Abstract. The data on the composition of the fishes and its relative quantity in the hook catches in the upper sublittoral zones of the South-Eastern Kamchatka in July-August 2021 are provided. The obtained results are allowed to make conclusion that unfavourable ecological conditions in autumn 2020 in the coastal waters of the South-Eastern Kamchatka practically had no influence on the quantity and mode of life of the representatives of ichthyofauna which were able to leave temporarily the coastal waters with harmful algal bloom areas.

Keywords: coastal fishes, hook catches, species

composition, South-Eastern Kamchatka, harmful algal bloom.

Осенью 2020 г. в прибрежных водах Южной Камчатки сложилась неблагоприятная экологическая обстановка, вызвавшая массовую гибель донных морских организмов. Специалисты различных российских исследовательских центров и природоохранных организаций провели совместно с камчатскими учёными довольно обстоятельное обследование прибрежной акватории, после чего пришли к заключению, что причина возникшей неблагоприятной экологической обстановки - природное явление, называемое «красным приливом» или вредоносным цветением водорослей (ВЦВ), вызванное бурным развитием токсичных одноклеточных водорослей. Подобные случаи массовой гибели гидробионтов в зоне верхней сублиторали Южной Камчатки отмечали и ранее [1, 2]. Однако в 2020 г. это природное явление проявилось более заметно и вызвало общественный резонанс, в связи с чем, возникла необходимость оценки степени его воздействия на представителей различных групп флоры и фауны, в том числе рыб, обитающих в прибрежной зоне. Цель данной работы – на основании анализа результатов выполненных в июле-августе 2021 г. трёх удебных обловов рыб в зоне верхней сублиторали Юго-Восточной Камчатки (глубины 2-25 м) получить представление об их видовом составе, относительной численности здесь отдельных представителей ихтиофауны в настоящее время и оценить степень негативного воздействия на них возникшего осенью 2020 г. ВЦВ.

В результате исследований, выполненных в июле-августе 2021 г., в прибрежье Юго-Восточной Камчатки на глубинах 2-25 м в удебных уловах зарегистрировано 13 видов рыб из 6 семейств (табл. 1). Однако их основу по числу видов формировали представители только трёх из них – рогатковые

Cottidae, терпуговые Hexagrammidae и камбаловые

Таблица 1

Состав удебных уловов в прибрежной зоне различных районов Юго-Восточной Камчатки в июле-августе 2021 г.

Вид	Доля в уловах, в % по численности			
	бухта Безымянная, 8 июля 2021 г.	Прибрежье острова Старичков, 23 июля 2021 г.	бухта Вилючинская, 16 августа 2021 г.	В целом
<i>Gadus chalcogrammus</i>	-	2,9	-	0,8
<i>Sebastes glaucus</i>	33,3	2,9	-	8,8
<i>Hexagrammos lagocephalus</i>	20,0	47,2	30,7	32,5
<i>H. stelleri</i>	-	-	50,0	24,6
<i>Pleurogrammus monopterigyus</i>	-	2,9	-	0,8
<i>Enophrys diceraus</i>	-	2,9	-	0,8
<i>Hemilepidotus giberti</i>	6,7	5,9	4,8	5,5
<i>H. jordani</i>	-	-	1,6	0,8
<i>Myoxocephalus polyacanthcephalus</i>	3,3	2,9	-	1,6
<i>M. stelleri</i>	3,3	5,9	1,6	3,2
<i>Bathymaster signatus</i>	3,3	-	-	0,8
<i>Lepidopsetta polyxystra</i>	23,4	23,6	9,7	16,6
<i>Platichthys stellatus</i>	6,7	2,9	1,6	3,2
Всего, экз.	30	34	62	126

Таблица 2

Состав удебных уловов в прибрежной зоне о-ва Старичков в различные годы

Вид	Доля в уловах, в % по численности			
	24.06.1998 г.*	31.08.2004 г.*	13.10.2020 г.**	23.07.2021 г.
<i>Gadus chalcogrammus</i>	-	-	-	2,9
<i>Sebastes glaucus</i>	-	-	16,1	2,9
<i>Hexagrammos lagocephalus</i>	47,2	31,6	58,1	47,2
<i>Pleurogrammus monopterygius</i>	2,8	-	9,7	2,9
<i>Enophrys diceraus</i>	1,4	21,0	-	2,9
<i>Hemilepidotus jordani</i>	1,4	-	-	-
<i>H. giberti</i>	9,7	-	16,1	5,9
<i>Myoxocephalus polyacanthcephalus</i>	12,5	47,4	-	2,9
<i>M. stelleri</i>	23,6	-	-	5,9
<i>Lepidopsetta polyxystra</i>	1,4	-	-	23,6
<i>Platichthys stellatus</i>	-	-	-	2,9
Всего, экз.	72	19	31	34

*По: [3]; **Данные из экспедиционного отчёта судна «Анисифор Крупенин», 2020 г.

вые Pleuronectidae (соответственно 5, 3 и 2), тогда как остальные 3 семейства были представлены лишь одним видом каждое. По численности в удебных уловах доминировали терпуги, доля которых составляла 57,9% от общего числа пойманных рыб. Сопоставление полученных результатов с имеющимися в литературе данными о составе ихтиофауны в прибрежной зоне о-ва Старичков [3] в 1998-2006 гг. (т.е., в период, предшествующий неблагоприятной экологической обстановке, сложившейся осенью 2020 г.), наглядно свидетельствует о том, что как общее количество зарегистрированных здесь видов рыб, так и их принадлежность к отдельным семействам были сходны более чем на 73%.

Имеющаяся информация за прошлые годы позволяет сравнить состав удебных уловов и относительную численность отдельных видов рыб в прибрежье о-ва Старичков до и после воздействия на них неблагоприятной экологической обстановки, вызванной ВЦВ (табл. 2).

Как наглядно свидетельствуют приведённые в таблице данные, в период с 1998 г. и до настоящего времени доминирующим видом здесь в летне-осенние месяцы в удебных уловах постоянно являлся преимущественно зайцеголовый терпуг *Hexagrammos lagocephalus* (лишь в 2004 г. его относительное значение было несколько меньше, чем у многоиглого керчака *Myoxocephalus polyacanthocephalus*, что, возможно, обусловлено небольшим объёмом выборки), доля которого в различные годы варьировала от 31,6 (2004 г.) до 58,1 (2020 г.) % от численности всех выловленных рыб. Причём, согласно данным экспедиционного отчёта о результатах обследования на судне «Анисифор Крупенин» верхней сублиторали Юго-Восточной Камчатки, каких-либо внешних повреждений и изменений окраски у особей зайцеголового терпуга, широколобого морского окуня *Sebastes glaucus* и пёстрого получешуйника *Hemilepidotus gilberti*, пойманных у о-ва Старичков 13 октября 2020 г. во время интенсивного развития ВЦВ не выявлено, а их пищевая активность была достаточно высока.

В результате исследований, выполненных в июле-августе 2021 г., в удебных уловах в прибрежье Юго-Восточной Камчатки (на глубинах 2-25 м) зарегистрировано 13 видов рыб из 6 семейств, основу которых (около 77%) формировали представители 3 семейств донных и придонных рыб – рогатковых Cottidae (5 ви-

дов), терпуговых Hexagrammidae (3 вида) и камбаловых Pleuronectidae (2 вида). Среди них в этот период по численности доминировали половозрелые особи зайцеголового и пятнистого *Hexagrammos stelleri* терпугов, суммарная доля которых составляла около 58% от численности всех пойманных рыб.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что неблагоприятные экологические условия, возникшие осенью 2020 г. в прибрежье Юго-Восточной Камчатки, практически не повлияли на численность и жизнедеятельность представителей прибрежной ихтиофауны (в первую очередь, таких типичных и массовых в летние месяцы в верхней сублиторали на глубинах от 2 до 25 м видов рыб, как зайцеголовый и пятнистый терпуги, пёстрый получешуйник, мраморный керчак *Myoxocephalus stelleri* и широколобый морской окунь), способных избегать участков прибрежной акватории, на которых происходило бурное развитие токсичных одноклеточных водорослей. Как свидетельствуют результаты контрольных удебных обловов, относительная численность этих видов рыб на обследованных участках верхней сублиторали юго-восточной Камчатки в июле-августе 2021 г. находилась на том же уровне, что и в предыдущие годы исследований, их пищевая активность являлась достаточно высокой, а какие-либо внешние повреждения и изменения окраски отсутствовали. У обоих видов терпугов в августе проходил массовый нерест, о чём можно было судить по наличию в уловах готовых к вымету икры самок.

Список литературы:

1. Сидоров К.С., Акимов С.Е. Полигонные работы по мониторингу прибрежных сообществ в Командоро-Камчатском районе за 1987 г. // Тез. докл. III Всесоюз. конф. по морск. биол. - Киев: АН УССР, 1988. - Ч. I. - С. 288 – 289.
2. Сидоров К.С., Бурдин А.М. Исследование кормовых ресурсов камчатской популяции калана // Научно-исслед. работы по морск. млекопитающим сев. части Тихого океана в 1984/85 г. - М.: ВНИРО, 1986. - С. 107–116.
3. Токранов А.М., Шейко Б.А. К познанию ихтиофауны прибрежных вод острова Старичков // Биота острова Старичков и прилегающей к нему акватории Авачинского залива. Тр. КФ ТИГ ДВО РАН. - Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2009. - Вып. VIII. - С. 250–262.