

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-79-82

АВИФАУНА ДЕПРЕССИОННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮЖНОЙ МОНГОЛИИ

Намсрайжав Цэгмид

кандидат биологических наук, старший преподаватель Монгольского сельскохозяйственного университета, г. Улаанбаатар

Маловичко Любовь Васильевна

доктор биологических наук, профессор Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва

Сонинбаатар Хилийнчулуун

Магистрант агроэкологического факультета Монгольского сельскохозяйственного университета, г. Улаанбаатар

Аннотация. В статье рассматривается специфика авифауны депрессионных солончаковых ландшафтов Южной Монголии.

Ключевые слова: депрессия, биологическое разнообразие, Багахангай, Айраг, Цээл, Хуувер.

AVIFAUNA OF DEPRESSION LANDSCAPES OF SOUTH MONGOLIA

Namsrajav Tsegmid

Candidate of Biological Sciences, Senior Lecturer, Mongolian Agricultural University, Ulaanbaatar

Malovichko Lyubov Vasilievna

Doctor of Biological Sciences, Professor, Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, Moscow

Soninbaatar Hilinchulun

Master student of the Agroecological Faculty of Mongolian Agricultural University, Ulaanbaatar

Abstract. Paper examines the specifics of the avifauna in depression wetland areas of the Southern Mongolia.

Keywords: depression, biological diversity, Bagakhangai, Airag, Tseel, Khuuber.

В орнитологическом отношении депрессионные ландшафты с солончаковыми озерами в южной части Монголии ещё недостаточно полно изучены [4, 5, 6, 7, 8].

На юге страны, в Долине Озер, сосредоточены наиболее крупные озера Монголии: Бооне-Цагаан-Нуур, Орог-Нуур, Улаан-Нуур и др. [2, 3].

Наблюдения пространственного распределения водоплавающих птиц соленых (содовых) озер в гнездовой и миграционной периоды проведены на территории Южной Монголии.

В настоящей работе представлены материалы, собранные с 8 июня по 11 июня 2017 г., и с 3 июня по 5 июня 2018 г. В Долине Гобийских озер (сомоны Мандал-Овоо, Южно-Гобийский и Богд Увэрхангайского аймака) и с 30 мая по 2 июня 2019 г. В Среднегорье на юге и востоке от Хэнтэйского хребта и Северной Гоби (Центральный и

Восточно-Гобийский аймаки); протяженность маршрутов составила более 2500 км (рис. 1).

В работе представлены данные по гнездовому периоду, а также весеннему пролету северных видов птиц. Основными методами работы были наблюдения на пеших и автомобильных маршрутах [2]. Маршрут в большей своей части пролегал по Восточно-Гобийской депрессии по 3 подрайонам.

Подрайон Среднегорья находится на юге и востоке от Хэнтэйского хребта. По мере удаления от Хэнтэя, его многочисленные отроги постепенно теряют свою высоту, межгорные долины расширяются, и рельеф приобретает мягкие, сглаженные формы. Горы становятся более сухими, болота здесь практически исчезают. На периферии среднегорья переходят в остепненные холмы [1].

Северная Гоби – обширная территория, лежащая к югу от Равнин Восточной Монголии. Здесь преобладают волнистые, увалистые и холмистые равнины с обширными котловинами, на днищах которых обычны такыры, солончаки, иногда встречаются небольшие озера и песчаные массивы с близким залеганием грунтовых вод. Почвы на большей части территории плотные глинистые и щебнистые. Растительный покров разреженный, представлен злаками и кустарниками. Преобладающие абсолютные высоты составляют от 900 до 1600 м над у. м [1].

Долина Гобийских озер вытянута в широтном направлении - длинная впадина между Южно-Хангайским плато и северными склонами Гобийского Алтая. Долина представляет собой пересеченные сайрами наклонные в сторону центральной части опустыненные равнины, в основном щебнистые и галечниковые, местами песчаные; здесь нередки солончаки, такыры. Рельеф (особенно в восточной части) осложняется сглаженными грядами, холмами, небольшими останцами, сайрами. Самые крупные озера Долины – Боон-Цагаан (главное питание получает от р. Байдраг и никогда не пересыхает), Орог (питается р. Туйн), Улаан (впадает р. Онги, часто пересыхающая в низовьях и не доносящая свои воды до озера) и Таацын-Цагаан (впадает р. Таацын). Большинство озер минерализованные, мелководные, с периодическими колебаниями уровня воды, вплоть до полного высыхания в длительные засушливые периоды [1].

В начале июня авифауна исследованного нами региона представлена 70 видами птиц, относящихся к 9 отрядам, 21 семейству и 40 родам. По характеру пребывания отмечено 9 оседлых видов и 61 мигрант (табл.1). Из числа мигрантов 50 видов гнездятся в целом в Монголии: из них 3 вида достоверно гнездящиеся в подрайоне Долины Гобийских озер: огарь, ходулочник и малый зуек, 6 видов - залётные случайные, 5 видов пролетные.

Распределение авифауны по отрядам выглядит следующим образом: поганкообразные – 1, аистообразные – 2, гусеобразные – 13, соколообразные – 2, журавлеобразные – 2, ржанкообразные – 25, голубеобразные – 2, стрижеобразные – 1, воробьинообразные – 22 вида (табл.1).

Птицы исследуемой территории представлены широко распространенными видами средних широт: сибирский тип фауны – 17, евро-сибирский – 12, монгольский – 11, палеарктический – 10, китайский – 8, монголо-средиземноморский – 6, арктический – 3, европейский – 1, неясного происхождения – 1 и средиземноморский – 1 вид (табл. 1).




Рис. 1. Физико-географическое районирование Монголии. 3.9 – Среднегорья на юге и востоке от Хэнтэйского хребта; 5.4. – Северная Гоби; 5.1. – Долина Гобийских озер.

Доминирующей экологической группой в орнитофауне Среднегорья, Северной Гобии Долины Гобийских озер (Цээл, Хуувер) на водно-болотных участках являются лимнофилы – 46 видов (65,8%). В открытых местообитаниях (степи, пустыни) отмечено 9 видов птиц кампофилов – (12,8%), 8 видов нуждаются для гнездования в скальных обнажениях – склерофилы (11,4%) и древесно-кустарниковые птицы – дендрофилы составляют 7 видов (10%).

В Среднегорье, Северной Гоби и Долине Гобийских озер встречаются редкие и нуждающиеся в специальной охране птицы. В том числе здесь отмечено пребывание серого журавля, занесенного в Красную книгу Монголии (1997; 2013) [4].

В конце мая на исследуемой территории активно идет миграция ржанкообразных, где в Среднегорье 30 мая 2019 г. встречены 9 видов (малый зуек, шилоклювка, щеголь, перевозчик, белохвостый песочник, озерная чайка, монгольская чайка, белокрылая крачка и речная крачка), из них наиболее многочисленными являются монгольская чайка и белокрылая крачка; 2 июня 2019 г. отмечены 7 видов утиных (серый гусь, огарь, пеганка, кряква, серая утка, шилохвость и красноголовый нырок), из них многочисленной оказалась пеганка. Такие трансзиатские мигранты, как малый зуек, шилоклювка, щеголь, перевозчик, белохвостый песочник, озерная чайка, монгольская чайка, белокрылая крачка, речная крачка, черношейная поганка, серый гусь, огарь, пеганка, кряква, серая утка, шилохвость и красноголовый нырок делают на данной территории остановки для отдыха, водопоя.

Как показали результаты исследований, состав, структура и показатели численности (табл. 2)

солончакового озера в разных подрайонах Южных частей Монголии существенно зависят от географического расположения региона в целом и самого водного объекта, его площади, глубины. По абсолютным количественным значениям наиболее разнообразна авифауна солончакового озера Среднегорья – 46 видов с наибольшим обилием – 2,83 ос./км². Наименьшее число видов и плотности населения птиц характерны для Долины Гобийских озер (Хуувер) – 7 видов; 0,24 ос./км². Сложность структуры, количественная представленность видов (H') в солончаковом озере Южной Монголии (табл. 1) снижается в ряду: Среднегорье ($H' = 3,19$); Долина Гобийских озер – Цээл в 2017 г. ($H' = 2,64$) и 2018 г. ($H' = 2,50$); Долина Гобийских озер – Хуувер в 2018 г. ($H' = 1,82$) и 2017 г. ($H' = 1,79$); Северной Гоби ($H' = 1,51$). Видовое богатство орнитофауны, выраженное индексом Маргалефа (Dmg), наибольшее в Среднегорье ($Dmg=7,97$) и Долине Гобийских озер – Цээл в 2017 г. ($Dmg=4,85$), наименьшее – в Северном Гобийском подрайоне ($Dmg=1,27$). Наиболее сбалансирован орнитокомплекс солончаковых озер Среднегорья ($E = 0,83$; $D = 0,07$). Также, высокая выравненность характерна для рассматриваемых солончаковых озер в еще двух подрайонах: Долине Гобийских озер – Хуувер в 2018 г. ($E = 0,94$; $D = 0,14$); и Долине Гобийских озер – Цээл в 2018 г. ($E = 0,86$; $D = 0,10$). Несмотря на то, что гидрологический режим озер Южной Монголии нестабильной, многие реки пересыхают, они представляют большую ценность для жизнедеятельности фауны региона, сохранения многих видов птиц, использующих водные объекты в качестве мест гнездования, кормежки, отдыха и водопоя [4].

Таким образом, депрессионные ландшафты Монголии, в которых сосредоточены солончаковые озера, богатые кормом, привлекают пролетных птиц. Состав, структура и показатели численности птиц на солончаковых озерах в разных подрайонах Южных частей Монголии существенно зависят от географического расположения региона в целом, а также самих озер, их площади и глубины.

Список литературы:

1. Звонов Б. М. Букреев С. А., Болдбаатар Ш. Птицы Монголии. – Москва, 2016. – С. 14-29.
2. Намсрайжав Ц., Маловичко Л. В. Анализ авифауны Северной Гоби // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – Чебоксары, 2015. – С. 17-29.
3. Национальный атлас МНР. – М.: «Наука», 1990. – С. 84-92.
4. Цэгмид Н. Состав, распределение и охрана орнитокомплексов Центральной и Южной Монголии: дис. канд.биол.наук: 03.02.14. – Москва, 2017. – 257 с.
5. Фомин В.Е., Болд А., 1991. Каталог птиц Монгольской Народной Республики. –М.: «Наука». – 128 с.
6. Bold, A. Dictionary of Mongolian bird names in ten languages / A. Bold // Bulletin of State Nomenclature Council. – № 1 (150). – Ulaanbaatar, 2007. – 158 p.
7. Gombobaatar, S. Mongolian Red List of Birds / S. Gombobaatar, E.M. Monks. – Ulaanbaatar, 2009. – 1036 p.
8. Gombobaatar, S. Birds of Mongolia / Gombobaatar Sundev & Christopher Leahy. – HELM, London, 2019. – 280 p.

Таблица 1.
Населения птиц солончаковых озер Южной части Монголии (2017-2019 гг.).

№	Виды	В целом Монголии			Территория/обилие, ос/км ²					
		Характер пребывания	Экологические группы	Тип фауны	Среднегорья на юг и восток от Хэнгайского хребта (Багахангай)	Северная Гоби(Айраг)	Долина Гобийских озер			
							Оз. Цээл		Лужа. Хуувер	
							2017	2018	2017	2018
2019	2019	2017	2018	2017	2018					
1	Черношейная поганка	Г	Л	НП	0,01					
2	Белокрылая цапля	С	Л	Кит				0,01		
3	Серая цапля	Г	Л	Е,Сиб		0,02	0,04			
4	Серый гусь	Г	Л	ПА	0,01					
5	Малый лебедь	П	Л	Арк			0,01			
6	Огарь	Г	Л	МсЗ	0,32	0,21	0,36	0,04		0,04
7	Пеганка	Г	Л	МсЗ	0,16	0,36		0,2	0,04	
8	Кряква	Г	Л	Кит	0,08	0,07				
9	Чёрная кряква	Г	Л	Кит			0,04			
10	Касатка	Г	Л	Сиб				0,02		
11	Серая утка	Г	Л	ПА	0,02		0,02	0,02		
12	Свизь	Г	Л	Сиб	0,03		0,04			
13	Шилохвость	Г	Л	Сиб	0,02					
14	Широконоска	Г	Л	ПА	0,02		0,11	0,04		
15	Красноголовый нырок	Г	Л	ПА	0,01	0,06				
16	Большой крохаль	Г	Л	Е,Сиб				0,02		
17	Черный коршун	Г	Д	Е,Сиб	0,02		0,01			
18	Мохноногий курганник	О	Ос	Мон			0,01			
19	Серый журавль	Г	Л	Сиб					0,01	
20	Журавль-красавка	Г	Ос	МсЗ	0,02		0,02	0,06		
21	Малый зуек	Г	Л	Е,Сиб	0,08	0,02			0,02	0,02
22	Толстоклювый зуек	Г	Л	Мон					0,02	
23	Монгольский зуек	Г	Л	Мон					0,02	
24	Морской зуек	Г	Л	МсЗ					0,12	
25	Чибис	Г	Л	Е,Сиб			0,08			
26	Ходулочник	Г	Л	МсЗ			0,18	0,28		
27	Шилоклювка	Г	Л	МсЗ	0,08	0,4	0,1			
28	Фифи	Г	Л	Е,Сиб			0,02			
29	Большой улит	С	Л	Сиб			0,02			
30	Травник	Г	Л	Е,Сиб			0,02	0,1		
31	Щеголь	С	Л	Сиб	0,01					
32	Перевозчик	Г	Л	Е,Сиб	0,04					
33	Песочник красношейка	С	Л	Е,Сиб	0,01					
34	Длиннопалый песочник	П	Л	Арк	0,01					
35	Белохвостый песочник	С	Л	ПА	0,04					
36	Острохвостый песочник	С	Л	ПА	0,01					
37	Песчанка	П	Л	Арк	0,06					
38	Грязовик	П	Л	Сиб	0,14					
39	Обыкновенный бекас	Г	Л	Е,Сиб			0,02	0,2		
40	Азиатский бекас	П	Л	Сиб			0,02			

41	Большой веретенник	Г	Л	Сиб			0,04	0,06		
42	Озёрная чайка	Г	Л	ПА	0,04					
43	Монгольская чайка	Г	Л	Мон	0,57					
44	Белокрылая крачка	Г	Л	Кит	0,15		0,02			
45	Речная крачка	Г	Л	Е,Сиб	0,02					
46	Саджа	О	Оп	Мон			0,22	0,04	0,16	0,06
47	Сизый голубь	О	С	СзМ	0,04		0,25	0,1		
48	Черный стриж	Г	С	Ев	0,12					0,02
49	Скалистая ласточка	Г	С	Мон	0,03					
50	Деревенская ласточка	Г	С	Сиб	0,04			0,04		
51	Монгольский жаворонок	О	Ос	Мон	0,02					
52	Рогатый жаворонок	О	Ос	Мон					0,02	0,06
53	Степной конек	Г	Ос	Мон			0,02			
54	Жёлтая трясогузка	Г	Л	Сиб	0,02		0,02	0,06		
55	Жёлтоголовая трясогузка	Г	Д	Сиб	0,1		0,02	0,02		
56	Горная трясогузка	Г	Л	Е,Сиб	0,07					
57	Белая трясогузка	Г	Л	Сиб	0,02					
58	Клушица	О	С	Мон,Т	0,02					
59	Пеночка-зарничка	Г	Д	Сиб	0,02					
60	Корольковая пеночка	Г	Д	Сиб	0,02					
61	Буряя пеночка	Г	Д	Сиб	0,01					0,02
62	Каменка-плясунья	Г	Ос	Мон	0,04					
63	Пустынная каменка	Г	Оп	Кит						0,02
64	Домовый воробей	О	С	ПА	0,06					
65	Полевой воробей	О	С	ПА	0,06					
66	Обыкновенная чечевица	Г	Д	Кит					0,12	
67	Обыкновенный дубонос	О	Д	Кит	0,1					
68	Тростниковая овсянка	Г	Ол	ПА	0,02					
69	Овсянка-крошка	Г	Ос	Сиб	0,02					
70	Седоголовая овсянка	Г	С	Кит	0,02					

Обозначения: Тип фауны: ПА - Транспалеарктический, Мон - Монгольский, Сиб - Сибирский, Е. Сиб - Европейско-сибирский, Кит - Китайский, МсЗ - Монголо-средиземноморский, СзМ - Средиземноморский, Ев - Европейский, Мон - Монгольский, Арк - Арктический.
 Экологические группировки: Д - древесно-кустарниковые птицы (дендрофилы); О - птицы открытых пространств (кампоофилы), в том числе: Ос - степные, Оп - пустынные, Ол - луговые виды; Л - водно-болотные птицы (лимпофилы); П - (петрофилы) С - птицы скальных обнажений (склерофилы);
 Характер пребывания: О - оседлые, Г - перелётные гнездящиеся; П - пролётные (встречаются только во время пролёта); С - залётные (случайные) виды..

Таблица 2.

Структурная организация солончакового озера Южных частей Монголии (2017-2019 гг.).

Показатели	Подрайоны*					
	СЮВХ-Багахангай, 2019 г.	СГ Айраг, 2019 г.	ДГО-Цээл		ДГО-Хуувер	
			2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
Общее количество видов	46	7	26	18	9	7
Общая плотность населения, ос./км ²	2,83	1,14	1,73	1,35	0,53	0,24
Индекс видового разнообразия Шеннона (H')	3,19	1,51	2,64	2,50	1,79	1,82
Индекс видового богатства Маргалефа (Dmg)	7,97	1,27	4,85	3,47	2,01	1,89
Индекс выравненности Пиелу (Е)	0,83	0,78	0,81	0,86	0,82	0,94
Индекс доминирования Симпсона (D)	0,07	0,26	0,10	0,10	0,19	0,14

Примечание. *Подрайоны: СЮВХ - Среднегорья на юге и востоке от Хэнтэйского хребта, СГ - Северной Гоби, ДГ - Долина Гобийских озер.