

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-75-78

НЕКОТОРЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ В РЕГИОНЕ ДЖАРГАЛАНТА В ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ

Оюунчимэг Түгжжав

кандидат географических наук, доцент Монгольского сельскохозяйственного университета, г. Улаанбаатар

Уянга Мөнхжаргал

аспирант Монгольского сельскохозяйственного университета, г. Улаанбаатар

Мөнхнасан Сарантуяа

аспирант Монгольского сельскохозяйственного университета, г. Улаанбаатар

Аннотация. В статье рассматривается выяснение закономерностей распространения и основных характеристик главных типов почв, выявление геохимической структуры почв аридной территории в центральной части Котловины Больших Озер например региона хребта Джаргалант на основе фундаментальных теоретических основ мировой почвенной географии и геохимии почв. Установление на этой основе особенностей структур в пределах высокогорного, низкогорного ландшафтов и ландшафтов приозерной равнины.

Ключевые слова: геохимической структуры почв, барьер, ландшафт

Abstract. The article examines the patterns of distribution and basic characteristics of the main soil types, reveals the geochemical structure of soils of the arid territory in the central part of the Great Lakes Basin, for example, the region of the Djarjalant mountain based on the fundamental theoretical foundations of world soil geography and soil geochemistry. The establishment on this basis of the features of structures within the high mountain, low mountain landscapes and landscapes of the lakeside plain.

Keywords: soil geochemical structure, barrier, landscape

Почва представляет собой комплекс, сосредотачивающий в себе взаимодействие веществ и энергии, составляющих природную среду и потому она становится самой важной информационной частью природного ландшафта. Наряду с закономерным изменением природы, почва впитывает в себе влияние человеческой деятельности. Поэтому изучение почв имеет важное значение как для охраны природы, так и для удовлетворения потребности общества. В нашей стране с её ограниченными ресурсами плодородных почв, особенно в нынешних условиях перехода к рыночным экономическим отношениям, когда большой размах приобретает горнодобывающая и другие отрасли промышленности, весьма актуально детальное изучение закономерностей жизни почв, факторов, влияющих на них, методов предотвращения негативных изменений, улучшения их плодородия, оценка почвенных ресурсов страны.

Нашей задачей являлось выявление геохимической структуры почв аридной территории в центральной

части Котловины Больших Озер, а именно: выяснение закономерностей распространения и основных характеристик главных типов почв, имеющих место на территории, охваченной нашими исследованиями; изучение основных закономерностей латерального и радиального распределения химических элементов в почвах. Установление на этой основе особенностей структур в пределах высокогорного, низкогорного ландшафтов и ландшафтов приозерной равнины.

Объектом исследования выбраны котловина озера Хар-Ус и прилегающие к ней склоны гор Суул Хайрхан и Джаргалант в центральной части Котловины Больших Озер. Местность охваченная исследованием, находится в центральной части Котловины Больших Озер, образовалась в результате очень сложных процессов, так что распространены разновозрастные скопления и породы. Монгольского Алтая и является геоморфологическим элементом пустынно-полевого ландшафта, ставшего под влиянием сухо жаркого климата Котловины Больших Озер. Территория обследованная нами имеет, резко континентальный климат. Центра антициклона, Центральной Азии размещается на северной части Котловины Больших Озер, так что зимой давление достигает до 1054.7 мб, средняя температура в января $-20-30^{\circ}$, иногда достигает до -48° . Летом воздушное давление снижает до 1019 мб, средняя температура в июле $+19+28^{\circ}$, абсолютная теплота достигает $+35^{\circ}$, колебание температуры выше $+40^{\circ}$, коэффициент континентальности по формулам З.И. Иванова 280-350. Осадков мало, в среднем в год выпадает 28,1-76.3 мм, 80-90% осадков отводится только теплым сезонам. Число дней, имеющих ниже 30% осадков 35-80 дней, объем солнечных лучей 1300-1500 квт.час/м². Эти данные показывают континентальность климата. В глубь Котловины Больших Озер размещены высокие горы Монгольского Алтая, как Джаргалант Хайрхан, Бумбат Хайрхан и Хасагт Хайрхан, что повесили на растительный покров и расположение, сделали совсем своеобразными. В частности равнинные степи, пустынные степи, типы пустынной растительности размещено согласно закономерности замещения природных поясов на низких гипсометрических уровнях. А для высоких гор находящихся в котловине, вдоль вертикального пояса, проявляются закономерные типы растительности, распространенной поочередно [1].

Наши исследования проводились за 1993-1998, 2018 г, собраны более 500 образцов из почв, горных пород. Аналитические работы выполнены в лаборатории ядерного исследования МонГУ, центральной геологической лаборатории г. Кызыл Республики Тувы РФ, определены элементы Ca, Mn, Ti, Zn, Sr, V, B, Se, Mo, Ni, Sn, K, Co, Fe, P, Si, Pb. Кроме того выполнены аналитические работы в лабораториях почвоведения Института Геоэкологии Академии Наук Монголии, определены содержа-

ние гумуса почвы (по методу И.В. Тюрина), реакция почв (по РН метр), содержание карбонатных соединений (по кальциметру), механических фракций (по Качинскому). Лабораторным исследованием охвачено всего 4758 единиц данных. В разработке данных лабораторного анализа использованы геохимические коэффициенты для определения перемещения химических элементов, интенсивности миграции и накопления. При обработке аналитических данных этих материалов использованы сравнительно-географический, ландшафтно-геохимический, экспериментально-аналитический методы исследования. Проведенные нами экспериментальные исследования опирались на теоретико-методологических разработках Б.Б. Плынова (1923, 1934, 1956), А.П. Виноградова (1957, 1962), В.А. Вернадского (1952), А.Е. Ферсмана (1934, 1956), М.А. Глазовской (1975, 1989), А.И. Перельмана (1975, 1989), В.А. Снытко (1972, 1976, 1978), Н.С. Касимова (1977, 1978).

Рассматриваемые в наших исследованиях химические элементы в отдельности и в ассоциациях выражают определенную закономерность распределения по почвенному профилю, что говорит о том, что там формируется определенные геохимические системы, которые представляют собой гетерогенные структуры. А эти структурные системы в свою очередь состоят из множества отдельных и отличных в геохимическом отношении подсистем, структурных частей.

Почвы высокогорных ландшафтов подчиняются, как указывалось выше режиму высотной зональности и таким образом морфологические, биологические, химические и геохимические черты почв определяются высокозональными закономерностями (Доржготов Д., 1994, Панкова Е.И., 1992, Ногина Н.А., 1988). Эти черты конкретно установлены в ходе наших исследований и находят свое отражение в режиме распределения, переноса и накопления веществ и химических элементов в почвах. Нашими исследованиями установлено, что геохимический характер высокогорно-степных почв гор Джаргалант подчиняются почвенно-географической закономерности режиму высотной почвенной зональности. Множество фактов свидетельствуют о том, что реальное существование высотной зональной дифференциации почв определяет картину распределения химических элементов, режим их миграции и концентрации а также обусловленные ими отдельные типы да и их виды геохимического барьера, катенарную дифференциацию гранулометрического состава отложений. На распространение и распределение химических элементов в высокогорных ландшафтах и на их геохимические процессы заметное влияние оказывают кроме высотного фактора, формы рельефа, их протяженность, экспозиция склонов и другие мезо, микро особенности орографии, а также местный климат. Поэтому инсолируемые и теневые склоны гор Джаргалант образуют сравнительно самостоятельные в геохимическом отношении системы и подсистемы.

Вдоль инсолируемого юго-западного склона гор Джаргалант образуются следующие отдельные геохимические системы.

Карбонатно-кальциево-натриевая (Ca-Na-HCO_3) система, охватывающая высокогорно-степные каштановые и степные светло-каштановые, бурые пустынно-степные почвы. Она подразделяется на подсистемы, а именно: в высокогорно-степных каштановых (разрез-20) и горных каштановых (разрез-10) почвах, распространенных по инсолируемым склонам гор Джаргалант, образуется зона щелочного геохимического барьера вида Д3, в растворе этих почв доминируют K^+Na^+ , SO_4^{2-} , а в почвах образуются значительные накопления элементов как Fe, Mn, Co, Cr, V, Ni, Pb.

Существует зона щелочного типа барьера Д3, Д4 видов, охватывающая сухостепные светлокаштановые (разрез-14) и бурые пустынно степные почвы, где накапливаются такие элементы, как Sr, B, Cr, K, V, Co, Zn, Se. В этой системе почвенная реакция щелочная, в почвах происходит интенсивный направленный вверх процесс испарения. Установлено, что интенсивность зоны щелочного барьера неравномерна в зависимости от степени подверженности почв, распространенных вдоль подножья гор, влиянию миграции влаги, различиям микроклимата, действию подземных вод. Эта неравномерность ясно видна из результатов исследования содержания и режима солей, их совокупности, реакции почв, распространенных вдоль склонов, оно дает возможность выделить зоны щелочного барьера Д3, Д4 видов. В частности бурые пустынно-степные почвы в подножной части гор относятся к виду Д4, а сухостепные светлокаштановые почвы к виде Д3. Хотя химические элементы на определенных площадях барьера данного типа образуют типичного характера накопления, но содержание таких катионогенных элементов и элементов промежуточной группы, как Sr, K, Zn, Co показывают сравнительно повышенное накопление на площади барьера Д4 вида, а анионогенные элементы B, Cr, V на площади Д3 вида. Эта особенность определяется неодинаковым характером и активностью накопления анионогенных и катионогенных элементов в зоне щелочного барьера (Перельман А. И., 1981, 1989, Глазовская М. А., 1988, Ковда В. А., 1988, Снытко В. Д., 1972, 1976, Гончигсумлаа Ч, 1994, 1997).

Вдоль теневого северо-восточного склона гор Джаргалант выявляется карбонатно-кальциевая система (Ca-HCO_3), охватывающая высокогорно-степные каштановые, горно-каштановые, и лесные луговые почвы с подсистемами, различающимися по миграции и концентрации элементов. На геохимические процессы в высокогорно-степных каштановых /разрез 13, 16/ и горно-каштановых /разрез 19/ почвах, сформировавшихся в элювиальных и транс-элювиальных условиях гор Джаргалант оказывают влияние в основном внутрисочвенный и поверхностный стоки. Поэтому, как мы установили на этой части, доминирует в основном режим миграции элементов. Реакция этих почв от слабощелочной до нейтральной, а в почвенном растворе преобладают ионы кальция и гидрокарбонатов.

В лугово-лесных почвах (р-29) сформировавшихся в трансаккумулятивных условиях, элементы кальциевой группы, отличающиеся высокой интенсивностью миграции, в связи с особенностями рельефа, переносятся из верхних элементов склона, накапливаясь в нижних частях образует в почве таким образом нейтраль-

но-щелочную среду. Хорошая увлажненность почвы способствует тому, что в результате процессов испарения легко растворимые соли и некоторые химические элементы поднимаются вверх по почвенным капиллярам, создавая условие для значительной щелочности горизонта А и образуя испарительный геохимический барьер типа F. Наряду с этим в связи с повышенным количеством почвенного гумуса (6.8-15.4%) происходит органогенное накопление таких элементов, как Mn, Si, Fe, Ba, Zn. И так в данном ландшафте и образуется почвенно-геохимическая система объединяющая комплекс O-F-D подсистем барьеров.

В ландшафтах низкогорья существует карбонат-кальций-натриевая система (Ca-Na-HCO₃), охватывающая горно-каштановые; горные светло-каштановые, бурые пустынно-степные почвы низкогорных ландшафтов. Эта система также подразделяется на определенные подсистемы. В растворе горно-каштановых почв, сформировавшихся в элювиальных условиях гор Суул Хайрхан (разрез-70), преобладают ионы Ca²⁺, HCO₃⁻ и в них накапливаются Zn, K, Co, Ni, V. В связи с тем, что почвообразующие породы составляют щелочные базальты, а в некоторых местах сланцы, алевролиты, и аргеллиты, реакция почв становится щелочной и в почвах образуется щелочной барьер. В горных светло-каштановых почвах (разрез-71), сформировавшихся в транс-элювиальных условиях гор Суул Хайрхан, содержание легко растворимых солей и некоторых химических элементов (Co, Sr, V, Ni, Ca, K) увеличиваются в нижних горизонтах, реакция гюч становится щелочной образуется щелочной барьер ДЗ вида. В бурых пустынно-степных почвах (разрез-72) сформировавшихся в трансэлювиально-аккумулятивных условиях подножных частей гор Суул Хайрхан при накоплении элементов, перенесенных с верхних фаций, увеличивается щелочность почв, создается щелочной барьер Д4 вида и образуются накопление таких элементов, как P, K, B, Co, Ba, Sr.

В ландшафтах приозерных равнин: в светло-бурых остепненных пустынных почвах (разрез 73) и залегающих около западного побережья озера Хар-Ус, в следствие их сухости господствует щелочная среда реакции, увеличивается влияние испарения и щелочеобразования на геохимические процессы в этих почвах. Здесь образуется щелочной барьер ДЗ вида и накапливаются элементы: Ca, Zn, Ba, P, Ni, Ti. В условиях восточной части озера Хар-Ус (разрез 3) с улучшенной обеспеченностью влагой, высоким восстановительным потенциалом, элементы Fe, Cu, Co, Mn переходят в нижнюю валентность, становятся геохимически более активными, увеличивается их способность интегрироваться с гумусовыми кислотами, в почвах образуются органогенные накопления. Поэтому в пойменно-луговых почвах накапливаются элементы группы Fe, V, Ti, Mn, Co, Ni. В солончаково-солонцовых почвах (разрез 7), распространенных по побережью озера Хар-Ус, в связи с особенностью режима влажности и испарения происходит накопление в поверхностных горизонтах почв легко растворимых солей, среда реакции где становится щелочной, создавая в почве щелочной барьер Д4 вида и испарительный барьер

РЗ вида. Кроме того, в связи с почвенным гумусом /2.2-7.03%/ возникают органогенные накопления в почвах элементов Fe, Zn, Sr, Si, Mo, P, B, Co, Ni, V, Pb. Их коэффициент миграции колеблется здесь на 2-4.5. Таким образом, в пойменных солончаковых почвах возникла подсистема, объединяющая барьеры O-F-D типов. На равнине Хурэн тал находящейся между озером Хар нуур и горами Джаргалант, в сухостепных светлокаштановых почвах (разрез 28) возник щелочной барьер, где происходит накопление таких элементов, как Sr, Mo, Si, Ni, B, V, Sr, Ba, K и в почвенном растворе доминируют ионы K⁺ Na⁺, HCO₃⁻, Ca²⁺. В бурых пустынно-степных почвах распространенных по побережью озера Хар внесено солевое накопление в Bk, Ck горизонты и она имеет щелочную среду реакции. В этих почвах возник щелочной барьер Д4 вида и происходит накопление элементов Fe, Se, Sr, V, Zn, Cu, Mo, B, Ni. В чешуйчато-листовом покрове мощностью около 1-1.5 см в верхней части светло-бурых с степенно-пустынных почв такие элементы, как Zn, Fe, Mo, V. Sr образуют слабую испарительную концентрацию.

Выводы:

1. Сложный характер рельефа территории охваченной нашим исследованием, обуславливает подразделение почв на серию геохимических систем и комплекс под систем, связанных геохимической сопряженностью.
2. В почвах исследованной территории химические элементы в отдельности или по группам выражают определенную закономерность распределения почвенном пространстве, что свидетельствует о том, что почвы здесь находятся в установлении геохимического режима. Латеральная дифференциация химических элементов по каскадным ландшафтными системам имеет следующий вид: группа элементов содержание которых последовательно снижается от элювиальных условий ландшафта к аккумулятивным - Fe, Mn, Co, Ti, P, Sr, Sr; группа элементов, содержание которых направленно увеличивается от элювиальных фаций ландшафта к аккумулятивным - Ca, K, Zn, Cu, Ni, Ba, Mo, B.
3. Почвы территории, охваченной нашим исследованием, относятся к кальциево-натриевым-карбонатным системам, которые по различиям геохимических процессов подразделяются на отдельные подсистемы. Радиальная дифференциация химических элементов на исследуемой территории образует отличное в геохимическом отношении множество определенных геохимических систем и подсистем.
4. Активность химических элементов зависит как от внутренних химико-физических факторов, так и от кларка содержания. Поэтому сравнение химических элементов, в местных почвах с мировым почвенным кларном показывает, что содержание таких элементов, как Cu, Ba, B, P, Se, Mo выше кларковых, содержание Ni, V, Ti ниже кларковых, а содержание Pb, Co, Sr в пределах кларковых.
5. Содержание селена в почвах данной территории выше мирового почвенного кларка, он не выявляет определенной закономерности распределения, имеет пятнистое распределение по различным типам почв.
6. Содержание химических элементов в почвообразующих породах исследуемой территории с клар-

ком элементов, как Pb, Cu, Mo, B, Se, Ca выше мирового кларка, содержание элементов Ni, Ba, Ti ниже мирового кларка, а содержание V, Mn, Sn, P, Zn в пределах мирового кларка.

7. Объем поглощения, содержание гумуса, самое главное, геохимическое сопряжение в каштановых и бурых пустынно-степных почвах, распространенных в котловине Больших Озер, отличны от таковых каштановых почв Центральной Монголии, что свидетельствует о неодинокимости условий почвообразования, литологии в этих районах и обуславливает своеобразные черты и направления миграции, переноса и накопления химических элементов.

8. Установленные нами закономерности и особенности пространственного распределения в ландшафтных условиях аридных территории таких элементов и ионов, как Ca, K, Na, Cl, SO₄, Sr, HCO₃, Mn, Mo, Ti, V, Zn, Fe, а также Se послужат правильному, комплексному установлению тенденции развития территории, разработке научных основ охраны природной среды.

Список литературы:

1. Буянорших Х., Ботаническая география Котловины Больших Озер. - Улаанбаатар, 1993. - С. 32-33.
2. Глаковская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных ландшафтов. - М.: Изд. Московского университета, 1964. - 227с.
3. Гончигсумлаа Ч. Геохимические и топологические исследования почв Центральной Монголии. - УБ, 1997.
4. Доржготов. Д. Основные черты географии почв Северной Монголии. автореферат диссертации на соискание ученой кандидата биологических наук. - М., 1982.
5. Доржготов. Д. Почва Монголии. - УБ., 1986.
6. Касимов А.С. Геохимия степных и пустынных ландшафтов. - М., 1988.
7. Ковда В.А. Биологические циклы движения и накопления солей. // Почвоведения. - 1944. - №4. - С. 144-158.
8. Польшов Б.Б. Кора выветривание. - М., 1934.
9. Польшов Б.Б. Геохимические ландшафты в географических работах. - М., 1926.
10. Польшов Б.Б. Географические работы, география. - М., 1954.
11. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. - М., 1966, 1975.
12. Снытко В.А. и др. Геохимические исследования для целей оптимального исследования ландшафта. В сбор. «Режимы ландшафтно-геохимических процессов в геосистемах». - Иркутск. - С. 25-34.