

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-285-286

ЛИТОФАЦИИ КОСТЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ФАУНОЙ *PLATYOPOSAURUS* (AMPHIBIA, TEMNOSPONDYLI) СРЕДНЕЙ ПЕРМИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Ульяхин Антон Васильевич

аспирант геологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва
младший научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, г. Москва

Аннотация. В статье рассматриваются литолого-фациальные особенности на основании макро- и микролитологического описания костеносных отложений местонахождений Восточной Европы с фауной темноспондильных амфибий рода *Platyoposaurus*. Делаются выводы о типах палеобиотопов для представителей рассматриваемого рода.

Ключевые слова: Temnospondyli, *Platyoposaurus*, пермь, литофация, Восточно-Европейская платформа.

LITHOFACIES OF A BONE DEPOSITS WITH *PLATYOPOSAURUS* (AMPHIBIA, TEMNOSPONDYLI) FAUNA OF THE MIDDLE PERMIAN OF EASTERN EUROPE

Uliakhin Anton Vasilevich

PhD Student, Faculty of Geology Lomonosov Moscow State University, Moscow
Junior researcher, Borissiak Paleontological Institute of RAS, Moscow

Abstract. The article discusses the lithofacies characteristics based upon the macro- and microlithological description of the bone deposits of the localities of Eastern Europe with temnospondyl amphibians of the genus *Platyoposaurus*. Conclusions are drawn about the types of paleobiotopes for representatives of the genus under consideration.

Keywords: Temnospondyli, *Platyoposaurus*, Permian, lithofacies, East European Platform.

На территории Восточно-Европейской платформы отложения средней перми с фауной четырех видов длинномордых темноспондильных амфибий рода *Platyoposaurus* (*P. stuckenbergi*, *P. watsoni*, *P. rickardi*, *P. vjuschkovi*) известны из 18 местонахождений: Божьюдор республики Коми, Акбатьровский Рудник, Медный Рудник, Большой Китяк-1, Большой Китяк-2, Шихово-Чирки Кировской области, Белебей республики Башкортостан, Аксаково Самарской области, Чарли, Камские Поляны, Сентяк республики Татарстан, Голюшерма республики Удмуртия, Каргалинские рудники (Рождественский Рудник, Федоровский Рудник), Сурошный Овраг, Старосейка, Малая Кинель Оренбургской области. Точная географическая привязка местонахождения «Семигорье» в настоящее время затруднительна.

Для установления литолого-фациальных особенностей костеносных отложений проводилось их подроб-

ное литологическое описание с учетом уже имеющихся литературных данных, а также установленных макро- и микролитологических особенностей по образцам, полученным непосредственно с костных остатков из коллекций Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН (ПИН РАН) и Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) с изготовлением их литографических шлифов.

По результатам исследования выяснилось, что остатки *P. stuckenbergi* из местонахождений Белебей, Акбатьровский Рудник, Медный Рудник, Большой Китяк-1, 2, Камские Поляны происходят как из отложений речного (среднезернистый зеленовато-серый и буровато-малиновый известковистые песчаники, серый глинистый алевролит), так и из отложений озерного (темно-серый и зеленовато-серый мергели) генезиса. Костеносные мергели формировались в наиболее глубоководной части закрытых озер. Многочисленные остатки *P. watsoni* из местонахождения Шихово-Чирки приурочены к пелитоморфному комковато-сгустковому известняку с интракластами (вакстоун, дисмикрит) лагунного генезиса. Судя по составу сопутствующей фауны неморских двустворок, лагуна была опресненной в период связи водоема с речной системой. Похожая на *P. watsoni* форма из местонахождений Сурошный Овраг Божьюдор происходит из серого мелкозернистого алевролита речного генезиса. Остатки *P. rickardi* из местонахождения Рождественский Рудник происходят из серого оруденелого мергеля озерного генезиса. Остатки *P. vjuschkovi* из местонахождения Малая Кинель (Оренбургская обл.) приурочены к зеленовато-серому глинистому, сильно известковистому песчанику речного генезиса. Остатки неопределенных до вида *Platyoposaurus* sp. из местонахождений Аксаково, Чарли, Сентяк, Голюшерма, Федоровский Рудник, Старосейка и «Семигорье» известны из серых мергелей озерного генезиса, серого и зеленовато-серого мелко- и среднезернистых песчаников и конгломерата речного генезиса.

По данным тафономии (тип сохранности, характер залегания в костеносных отложениях, соотношение элементов скелета по типу и таксономической принадлежности) удалось выяснить, что по всех местонахождениях остатки *Platyoposaurus* имеют характер залегания, указывающий либо на смещение элементов скелета на месте гибели с нарушением посмертного положения, либо на незначительный перенос исключительно в пределах палеобиотопа, но не за его пределы.

Обобщая полученные данные по литологии костеносных пород (табл. 1), можно утверждать, что остатки представителей рассматриваемого рода примерно в равной степени характерны для песчано-гравийных литофаций рек и глинисто-карбонатных литофаций опресненных озерных водоемов и лагун [1]. Исходя из этого, с

Таблица 1

Палеобиотопы *Platyoposaurus*, реконструированные на основе литолого-фациального анализа костеносных отложений.

Тип палеобиотопа	<i>P. stuckenbergi</i>	<i>P. vjuschkovi</i>	<i>P. rickardi</i>	<i>P. watsoni</i>
Речной				
Озерный (опресненные закрытые озера)				?
Лагунный (солонатоводная лагуна)				

учетом тафономического фактора и прямой связи палеобиотопов с ориктоценозами, для *Platyoposaurus* была характерна высокая экологическая пластичность и возможность вести образ жизни в пределах различных биотопов [2].

Список литературы:

1. Уляхин А. В., Скучас П. П., Сабуров П. Г. Возрастная изменчивость в гистологическом строении посткраниальных элементов *Platyoposaurus stuckenbergi* (Temnospondyli, Archegosauridae) из средней перми Восточной Европы // Палеонтологический журнал. – 2021. – №3. – С. 70–82.
2. Уляхин А.В. Об образе жизни платиопозавра // Природа. – 2022. – №1. – С. 39–50.