

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-253-254

О НОВЫХ НАХОДКАХ КОСТНЫХ ОСТАТКОВ ИХТИОЗАВРОВ РОДОВ ARTHROPTERYGIUS И GRENDELIUS НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Зенина Юлия Владимировна

Член Самарского палеонтологического общества, г. Самара

Гунчин Роман Александрович

Член Самарского палеонтологического общества, г. Самара

Аннотация. На территории Ульяновской области авторами найдены костные остатки ихтиозавров родов *Arthropterygius* и *Grendelius*.

Ключевые слова: *Arthropterygius*, *Grendelius*, Ульяновская область, ихтиозавры.

ON NEW FINDINGS OF BONE REMAINS OF ICHTHYOSAURS OF ARTHROPTERYGIUS AND GRENDELIUS GENERA IN THE ULYANOVSK REGION

Zenina Yuliya Vladimirovna

Member of the Samara Paleontological Society, Samara

Gunchin Roman Aleksandrovich

Member of the Samara Paleontological Society, Samara

Abstract. The authors found bone remains of ichthyosaurs of *Arthropterygius* and *Grendelius* genera on the territory of the Ulyanovsk region.

Keywords: *Arthropterygius*, *Grendelius*, Ulyanovsk region, ichthyosaurs.

Из всех морских рептилий наиболее полно приспособились к обитанию в воде ихтиозавры, или рыбообразцы, названные так за обтекаемую рыбообразную форму тела. Эта группа рептилий появилась в конце раннего триаса, достигла своего расцвета в ранней юре и исчезла в начале поздне меловой эпохи, просуществовав примерно 150 млн. лет.

Впервые в нашей стране остатки ихтиозавров были найдены П.М. Языковым в 1829 году в верхнеюрских (волжских) отложениях окрестностей Симбирска [5].

На протяжении двух столетий палеонтологи находят костные остатки ихтиозавров на территории России. Ульяновскую область можно заслуженно назвать ключевым российским регионом для изучения ихтиозавров, здесь было найдено больше скелетов и описано больше родов и видов этих морских рептилий, чем в каком-либо другом регионе нашей страны [2].

Большой вклад в изучение ихтиозавров Ульяновского Поволжья внесли В.М. Ефимов, М.С. Архангельский, Валентин Фишер, Н.Г. Зверьков.

В последнее время некоторые устоявшиеся представления об ихтиозаврах подвергаются пересмотру во многом благодаря новым находкам. В этом плане территория России необыкновенно перспективна для поисков представителей группы. В европейской части

нашей страны имеются весьма интересные и еще не до конца изученные местонахождения с остатками ихтиозавров в Ульяновской, Саратовской, Московской, Курской и Белгородской областях. Российские материалы, несомненно, расширят научные знания об ихтиозаврах [4].

В ходе исследований Городищенского разреза в мае 2019 года, авторами были найдены костные остатки ихтиозавров. Городищенский разрез расположен на правом берегу р. Волга в 25 км к северу от г. Ульяновска, в окрестностях д. Городищи. Протяженность разреза от устья Городищенского оврага на юг составляет около двух километров. Здесь вскрываются отложения верхнего кимериджа, всех трех подъярусов волжского яруса, местами верхнего берриаса, нижнего валанжина и готерива [1]. Костные остатки морских рептилий здесь встречаются довольно часто. Как заметил К.А. Кабанов в своей работе 1959 года, из отдельных частей скелета чаще всего встречаются позвонки, другие кости встречаются реже. Кости ихтиозавров в количественном отношении преобладают над костями других пресмыкающихся [3]. Наши исследования подтверждают это наблюдение.

Наиболее интересный из найденных экземпляров - плечевая кость ихтиозавра вида *Arthropterygius lundi* (Рис. 1).



Рис. 1. Левая плечевая кость *Arthropterygius lundi*.

Данная плечевая кость отнесена к роду *Arthropterygius* на основании характерных очертаний дистального конца с заметным пережимом между фасетками для лучевой и локтевой костей [8]. Её отнесение к виду *Arthropterygius lundi* основано на изометричной форме проксимального конца, сильной уплощенности дистального конца и субтреугольных очертаниях фасетки для проксиального дополнительного элемента [8].

Это третья находка представителя данного вида в России и первая в Ульяновской области. Костные остатки ихтиозавров рода *Arthropterygius*, известны из позднеюрских отложений Арктики (Арктической Канады, Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа). В Ульяновской области ранее были найдены остатки видов *Arthropterygius chrisorum* и *A. Hoybergeti* [8].

Кроме этого, были найдены две кости основания черепа, базисфеноиды, ихтиозавров рода *Arthropterygius* (Рис.2) и *Grendelius* (Рис.3).




Рис. 2. Базисфеноид *Arthropterygius* sp.

Типовой вид ихтиозавров рода *Grendelius* был описан из верхних кимериджских глин Англии в 1976 г. К. МакГованом. Род ревизован Н.Г. Зверьковым и др. в 2015 г., при этом к нему отнесен выделенный В.М. Ефимовым род *Otschevia*. В составе рода рассматриваются следующие виды: *Grendelius mordax* (типовой вид, известен только из Англии), остальные виды известны только из Поволжья: *Grendelius pseudoscythicus*, *Grendelius zhuravlevi*, *Grendelius alekseevi* [2]. Находки базисфеноидов довольно редки и представляют научную ценность, так как несут важные диагностические признаки.

Базисфеноид, отнесенный к роду *Arthropterygius*, характеризуется редуцированными базиптеригиодными отростками и характерно сдвинутым к заднему концу отверстием для внутренних сонных артерий, что является диагностическим признаком рода [8]. Базисфеноид, отнесенный к роду *Grendelius*, напротив, несет хорошо развитые и широко расставленные базиптеригиодные отростки, отверстие для внутренних сонных артерий на нем расположено близко к заднему краю, но открывается на вентральную сторону, что характерно для представителей данного рода [6, 7].



Рис. 3. Базисфеноид *Grendelius* sp.

Данные находки переданы в Ундоровский палеонтологический музей.

Авторы выражают благодарность Н.Г. Зверькову за определение и описание образцов, а также за помощь в работе над статьёй.

Список литературы

1. Барабошкин Е.Ю., Благовещенский И.В. Опорные разрезы верхней юры и нижнего мела района г. Ульяновска. Путеводитель экскурсий Пятого Всероссийского совещания «Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии» (27 и 28 августа 2010 г., г. Ульяновск). - Ульяновск: УлГУ, 2010. - С. 38.
2. Зверьков Н.Г. (2019) Ульяновская область - ключевой регион России для изучения ихтиозавров // Трешниковские чтения – 2019: Современная географическая картина мира и технологии географического образования. Мат-лы всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием // Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019. – С. 276-279.
3. Кабанов К.А. Захоронения юрских и меловых пресмыкающихся в районе Ульяновска // Изв. Казанск. филиала АН СССР. Сер. геол. - 1959. - № 7. - С. 211-214.
4. Первушов Е.М., Архангельский М.С., Иванов А.В. Каталог местонахождений остатков морских рептилий в юрских и меловых отложениях Нижнего Поволжья. - Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 1999. - 230 с.
5. Языков П. Об открытии ископаемых остатков ихтиозавра близ города Симбирска // Горный журн. - 1832. - № 4. - С. 183.
6. McGowan C. 1976. The description and phenetic relationships of a new ichthyosaur genus from the Upper Jurassic of England. Canadian Journal of Earth Sciences. - 13(5):668-683
7. Zverkov N. G., Arkhangelsky M. S., Stenshin I. M. A review of russian upper jurassic ichthyosaurs with an intermedium/humeral contact. reassessing grendelius mcgowan, 1976 // Труды Зоологического института Российской академии наук. - 2015. - Vol. 319, no. 4. - P. 558–588
8. Zverkov N. G., Prilepskaya N. E. A prevalence of *Arthropterygius* (Ichthyosauria: Ophthalmosauridae) in the Late Jurassic – earliest Cretaceous of the Boreal Realm. PeerJ. - 2019.- 7:e6799.